



Kapitel B


Appendix: Temperatur




Figur B.1: Tidslig og vertikal dækning af temperatur og saltholdighed (uden stabilitetskrav) markeret med h.h.v. rød og blå




Figur B.2: Tidslig og vertikal dækning af temperatur og saltholdighed (uden stabilitetskrav) markeret med h.h.v. rød og blå



Figur B.3: Tidslig og vertikal dækning af temperatur og saltholdighed (uden stabilitetskrav) markeret med h.h.v. rød og blå



Figur B.4: Tidslig og vertikal dækning af temperatur og saltholdighed (uden stabilitetskrav) markeret med h.h.v. rød og blå



Figur B.5: Tidslig og vertikal dækning af temperatur og saltholdighed (uden stabilitetskrav) markeret med h.h.v. rød og blå

Tabel B.1: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Århus Bugt

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
4.0 m	27137	10.0	6.1	0	10.0	6.1	1	10.0	6.1
9.0 m	27137	8.9	5.4	0	8.9	5.4	1	8.9	5.4
14.0 m	27139	8.0	4.0	0	8.0	4.0	0	8.0	4.0
Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
4.0 m	0	0.0	0.0	0	10.0	6.1	0	10.0	6.1
9.0 m	0	0.0	0.0	0	8.9	5.4	0	8.9	5.4
14.0 m	0	0.0	0.0	0	8.0	4.0	0	8.0	4.0
Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
4.0 m	0	0.0	0.0	13592	10.0	6.1	0	10.0	6.1
9.0 m	0	0.0	0.0	13591	8.9	5.4	0	8.9	5.4
14.0 m	0	0.0	0.0	13591	8.0	4.0	0	8.0	4.0

Tabel B.2: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Darss Sill

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.0 m	23971	8.0	6.4	1403	8.9	5.5	29	8.9	5.5
5.0 m	21916	8.9	7.3	1038	9.9	5.7	32	9.9	5.7
7.0 m	25711	8.7	5.1	4	8.7	5.1	2	8.7	5.1
12.0 m	25810	8.0	4.6	0	8.0	4.6	10	8.0	4.6
17.0 m	25359	7.6	4.1	1	7.6	4.1	10	7.6	4.1
19.0 m	25207	7.7	4.1	1	7.7	4.0	3	7.7	4.0
Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.0 m	1605	9.0	5.6	0	9.0	5.6	5	9.0	5.6
5.0 m	607	9.6	5.4	0	9.6	5.4	7	9.6	5.4
7.0 m	1	8.7	5.1	0	8.7	5.1	6	8.7	5.1
12.0 m	1	8.0	4.6	0	8.0	4.6	1	8.0	4.6
17.0 m	1	7.7	4.1	0	7.7	4.1	2	7.7	4.1
19.0 m	1	7.7	4.0	0	7.7	4.0	4	7.7	4.0
Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.0 m	11	9.0	5.6	20901	9.0	5.6	0	9.0	5.6
5.0 m	8	9.6	5.4	20207	9.6	5.4	85	9.5	5.4
7.0 m	10	8.7	5.1	25669	8.7	5.1	0	8.7	5.1
12.0 m	5	8.0	4.6	25678	8.0	4.6	1	8.0	4.6
17.0 m	0	7.7	4.1	25230	7.7	4.1	0	7.7	4.1
19.0 m	7	7.7	4.0	25169	7.7	4.0	0	7.7	4.0

Tabel B.3: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Deutsche Bucht

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	34294	10.8	4.9	10	10.8	4.9	0	10.8	4.9
6.0 m	36074	10.7	4.9	9	10.7	4.9	5	10.7	4.9
10.0 m	35149	10.5	4.8	9	10.5	4.8	12	10.5	4.8
15.0 m	35301	10.4	4.7	2	10.4	4.7	0	10.4	4.7
20.0 m	35699	10.4	4.7	5	10.4	4.7	0	10.4	4.7
25.0 m	35955	10.3	4.7	85	10.4	4.7	0	10.4	4.7
30.0 m	35575	10.3	4.6	53	10.3	4.6	0	10.3	4.6

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	90	10.8	4.9	0	10.8	4.9	0	10.8	4.9
6.0 m	537	10.8	4.9	0	10.8	4.9	0	10.8	4.9
10.0 m	484	10.6	4.8	0	10.6	4.8	0	10.6	4.8
15.0 m	452	10.4	4.7	0	10.4	4.7	0	10.4	4.7
20.0 m	521	10.4	4.7	0	10.4	4.7	0	10.4	4.7
25.0 m	533	10.4	4.7	0	10.4	4.7	0	10.4	4.7
30.0 m	553	10.4	4.6	0	10.4	4.6	0	10.4	4.6

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	5	10.8	4.9	34170	10.8	4.9	0	10.8	4.9
6.0 m	4	10.8	4.9	35503	10.8	4.9	0	10.8	4.9
10.0 m	1	10.6	4.8	34642	10.6	4.8	0	10.6	4.8
15.0 m	2	10.4	4.7	34829	10.4	4.7	0	10.4	4.7
20.0 m	5	10.4	4.7	35152	10.4	4.7	0	10.4	4.7
25.0 m	2	10.4	4.7	35319	10.4	4.7	0	10.4	4.7
30.0 m	1	10.4	4.6	34952	10.4	4.6	0	10.4	4.6

Tabel B.4: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Drogden

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.0 m	50396	9.2	5.4	17	9.2	5.4	1	9.2	5.4
4.0 m	49449	9.1	5.5	5	9.1	5.5	2	9.1	5.5
6.0 m	52075	9.2	5.3	1	9.2	5.3	1	9.2	5.3
8.0 m	51948	9.2	5.2	6	9.2	5.2	0	9.2	5.2
10.0 m	50909	9.3	5.1	0	9.3	5.1	0	9.3	5.1

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.0 m	0	0.0	0.0	0	9.2	5.4	0	9.2	5.4
4.0 m	0	0.0	0.0	0	9.1	5.5	0	9.1	5.5
6.0 m	0	0.0	0.0	0	9.2	5.3	0	9.2	5.3
8.0 m	0	0.0	0.0	0	9.2	5.2	0	9.2	5.2
10.0 m	0	0.0	0.0	0	9.3	5.1	0	9.3	5.1

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.0 m	2	9.2	5.4	25834	9.2	5.4	0	9.2	5.4
4.0 m	12	9.1	5.5	25125	9.1	5.5	0	9.1	5.5
6.0 m	10	9.2	5.3	26468	9.2	5.3	0	9.2	5.3
8.0 m	5	9.2	5.2	26421	9.2	5.2	0	9.2	5.2
10.0 m	15	9.3	5.1	26333	9.2	5.1	0	9.2	5.1

Tabel B.5: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Elbe

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	18913	11.3	5.1	0	11.3	5.1	0	11.3	5.1
6.0 m	18888	11.2	5.1	0	11.2	5.1	0	11.2	5.1
10.0 m	18928	11.1	5.0	0	11.1	5.0	0	11.1	5.0
15.0 m	18857	11.1	5.0	1	11.1	5.0	0	11.1	5.0
20.0 m	18840	11.1	5.0	0	11.1	5.0	0	11.1	5.0
Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	0	0.0	0.0	0	11.3	5.1	0	11.3	5.1
6.0 m	0	0.0	0.0	0	11.2	5.1	1	11.2	5.1
10.0 m	0	0.0	0.0	0	11.1	5.0	1	11.1	5.0
15.0 m	0	0.0	0.0	0	11.1	5.0	0	11.1	5.0
20.0 m	0	0.0	0.0	0	11.1	5.0	1	11.1	5.0
Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	3	11.3	5.1	18886	11.3	5.1	0	11.3	5.1
6.0 m	0	11.2	5.1	18862	11.2	5.1	0	11.2	5.1
10.0 m	2	11.1	5.0	18900	11.1	5.0	0	11.1	5.0
15.0 m	1	11.1	5.0	18829	11.1	5.0	0	11.1	5.0
20.0 m	0	11.1	5.0	18813	11.1	5.0	0	11.1	5.0

Tabel B.6: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station EMS

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	30591	11.1	4.5	26	11.1	4.5	2	11.1	4.5
6.0 m	28257	11.7	4.3	83	11.7	4.2	1	11.7	4.2
10.0 m	31949	11.0	4.4	1	11.0	4.4	4	11.0	4.4
15.0 m	30019	11.0	4.3	3	11.0	4.3	1	11.0	4.3
20.0 m	30341	11.0	4.4	241	11.1	4.3	11	11.1	4.3
25.0 m	31489	10.9	4.3	10	10.9	4.3	7	10.9	4.3
30.0 m	29604	11.2	4.3	16	11.2	4.3	3	11.2	4.3

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	36	11.1	4.5	3	11.1	4.5	2	11.1	4.5
6.0 m	325	11.8	4.2	2	11.8	4.2	0	11.8	4.2
10.0 m	0	11.0	4.4	2	11.0	4.4	2	11.0	4.4
15.0 m	0	11.0	4.3	2	11.0	4.3	3	11.0	4.3
20.0 m	709	11.1	4.4	4	11.1	4.4	0	11.1	4.4
25.0 m	854	10.9	4.4	3	10.9	4.4	0	10.9	4.4
30.0 m	0	11.2	4.3	4	11.2	4.3	1	11.2	4.3

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	2	11.1	4.5	30498	11.1	4.5	0	11.1	4.5
6.0 m	1	11.8	4.2	27829	11.8	4.2	0	11.8	4.2
10.0 m	5	11.0	4.4	31919	11.0	4.4	0	11.0	4.4
15.0 m	3	11.0	4.3	29990	11.0	4.3	0	11.0	4.3
20.0 m	4	11.1	4.4	29372	11.1	4.4	0	11.1	4.4
25.0 m	2	10.9	4.4	30613	10.9	4.4	0	10.9	4.4
30.0 m	4	11.2	4.3	29557	11.2	4.3	0	11.2	4.3

Tabel B.7: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Farø

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.8 m	22499	8.4	5.1	0	8.4	5.1	0	8.4	5.1
5.5 m	22011	8.3	5.1	2	8.3	5.1	0	8.3	5.1
8.5 m	21538	8.4	5.0	3	8.4	5.0	0	8.4	5.0
11.5 m	21073	8.4	5.1	2	8.4	5.1	0	8.4	5.1
14.5 m	20684	8.0	5.0	2	8.0	5.0	0	8.0	5.0
21.0 m	19581	8.6	5.0	8	8.6	5.0	41	8.6	5.0

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.8 m	0	0.0	0.0	0	8.4	5.1	0	8.4	5.1
5.5 m	0	0.0	0.0	0	8.3	5.1	0	8.3	5.1
8.5 m	0	0.0	0.0	0	8.4	5.0	0	8.4	5.0
11.5 m	0	0.0	0.0	0	8.4	5.1	0	8.4	5.1
14.5 m	0	0.0	0.0	0	8.0	5.0	0	8.0	5.0
21.0 m	410	8.7	5.0	0	8.7	5.0	2	8.7	5.0

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.8 m	0	8.4	5.1	11306	8.4	5.1	0	8.4	5.1
5.5 m	0	8.3	5.1	11280	8.3	5.1	0	8.3	5.1
8.5 m	0	8.4	5.0	11248	8.4	5.0	0	8.4	5.0
11.5 m	0	8.4	5.1	11207	8.3	5.1	0	8.3	5.1
14.5 m	0	8.0	5.0	11170	8.0	5.0	0	8.0	5.0
21.0 m	0	8.7	5.0	10495	8.7	5.0	0	8.7	5.0

Tabel B.8: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station "Early"Flinten

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
1.5 m	33267	10.9	5.7	0	10.9	5.7	0	10.9	5.7
7.5 m	5437	14.0	1.2	0	14.0	1.2	0	14.0	1.2

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
1.5 m	0	0.0	0.0	0	10.9	5.7	0	10.9	5.7
7.5 m	0	0.0	0.0	0	14.0	1.2	0	14.0	1.2

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
1.5 m	2	10.9	5.7	11088	10.9	5.7	0	10.9	5.7
7.5 m	0	14.0	1.2	1806	14.0	1.2	0	14.0	1.2

Tabel B.9: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Flinten

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	97831	8.7	5.8	0	8.7	5.8	4	8.7	5.8
4.5 m	98227	8.7	5.6	0	8.7	5.6	0	8.7	5.6
6.0 m	97988	8.7	5.5	0	8.7	5.5	0	8.7	5.5
7.5 m	98090	8.7	5.4	0	8.7	5.4	0	8.7	5.4
9.1 m	96474	8.7	5.5	0	8.7	5.5	0	8.7	5.5

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	0	0.0	0.0	1	8.7	5.8	0	8.7	5.8
4.5 m	0	0.0	0.0	0	8.7	5.6	0	8.7	5.6
6.0 m	0	0.0	0.0	0	8.7	5.5	0	8.7	5.5
7.5 m	0	0.0	0.0	0	8.7	5.4	0	8.7	5.4
9.1 m	0	0.0	0.0	0	8.7	5.5	0	8.7	5.5

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	0	0.0	0.0	50069	8.8	5.8	0	8.8	5.8
4.5 m	0	0.0	0.0	50222	8.8	5.6	0	8.8	5.6
6.0 m	0	0.0	0.0	50208	8.7	5.5	0	8.7	5.5
7.5 m	0	0.0	0.0	50169	8.8	5.4	0	8.8	5.4
9.1 m	0	0.0	0.0	49348	8.8	5.5	0	8.8	5.5

Tabel B.10: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Gamle Bro

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
5.0 m	71631	9.3	5.4	0	9.3	5.4	1	9.3	5.4
10.0 m	71391	9.1	5.2	0	9.1	5.2	14	9.1	5.2
15.0 m	71664	9.0	5.1	0	9.0	5.1	14	9.0	5.1
20.0 m	66179	8.5	5.1	0	8.5	5.1	6	8.5	5.1
22.5 m	56270	7.7	4.9	0	7.7	4.9	4	7.7	4.9

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
5.0 m	0	0.0	0.0	0	9.3	5.4	0	9.3	5.4
10.0 m	0	0.0	0.0	0	9.1	5.2	0	9.1	5.2
15.0 m	0	0.0	0.0	0	9.0	5.1	0	9.0	5.1
20.0 m	0	0.0	0.0	0	8.5	5.1	0	8.5	5.1
22.5 m	0	0.0	0.0	0	7.7	4.9	0	7.7	4.9

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
5.0 m	0	0.0	0.0	36786	9.3	5.4	0	9.3	5.4
10.0 m	0	0.0	0.0	36638	9.1	5.3	0	9.1	5.3
15.0 m	0	0.0	0.0	36763	8.9	5.1	0	8.9	5.1
20.0 m	0	0.0	0.0	33886	8.5	5.1	0	8.5	5.1
22.5 m	0	0.0	0.0	28755	7.7	4.9	0	7.7	4.9

Tabel B.11: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Hjelm Bugt

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
6.7 m	56150	9.0	5.9	0	9.0	5.9	0	9.0	5.9
10.2 m	56112	8.7	5.6	0	8.7	5.6	4	8.7	5.6
15.4 m	56150	8.2	5.0	0	8.2	5.0	1	8.2	5.0
21.5 m	56043	7.5	4.0	0	7.5	4.0	0	7.5	4.0
Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
6.7 m	0	0.0	0.0	0	9.0	5.9	0	9.0	5.9
10.2 m	0	0.0	0.0	0	8.7	5.6	0	8.7	5.6
15.4 m	0	0.0	0.0	0	8.2	5.0	0	8.2	5.0
21.5 m	0	0.0	0.0	0	7.5	4.0	0	7.5	4.0
Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
6.7 m	0	0.0	0.0	28111	9.0	5.9	0	9.0	5.9
10.2 m	0	0.0	0.0	28104	8.7	5.6	11	8.7	5.6
15.4 m	0	0.0	0.0	28110	8.2	5.0	6	8.2	5.0
21.5 m	0	0.0	0.0	28088	7.5	4.0	0	7.5	4.0

Tabel B.12: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Kiel

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
0.0 m	41331	9.5	5.7	0	9.5	5.7	0	9.5	5.7
1.0 m	41339	9.5	5.7	0	9.5	5.7	0	9.5	5.7
2.0 m	37278	9.9	5.7	0	9.9	5.7	0	9.9	5.7
4.0 m	36371	9.8	5.8	0	9.8	5.8	1	9.8	5.8
8.0 m	41300	9.1	5.3	0	9.1	5.3	0	9.1	5.3
13.0 m	37126	8.1	4.3	0	8.1	4.3	2	8.1	4.3

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
0.0 m	0	0.0	0.0	0	9.5	5.7	0	9.5	5.7
1.0 m	0	0.0	0.0	0	9.5	5.7	0	9.5	5.7
2.0 m	0	0.0	0.0	0	9.9	5.7	0	9.9	5.7
4.0 m	0	0.0	0.0	0	9.8	5.8	0	9.8	5.8
8.0 m	0	0.0	0.0	0	9.1	5.3	2	9.1	5.3
13.0 m	0	0.0	0.0	0	8.1	4.3	1	8.1	4.3

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
0.0 m	6	9.5	5.7	41304	9.5	5.7	0	9.5	5.7
1.0 m	2	9.5	5.7	41316	9.5	5.7	0	9.5	5.7
2.0 m	1	9.9	5.7	37261	9.9	5.7	150	9.9	5.7
4.0 m	1	9.8	5.8	36346	9.8	5.8	0	9.8	5.8
8.0 m	3	9.1	5.3	41275	9.1	5.3	0	9.1	5.3
13.0 m	3	8.1	4.3	37106	8.1	4.3	0	8.1	4.3

Tabel B.13: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Læsø Rende

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
6.2 m	25110	9.7	5.0	0	9.7	5.0	18	9.7	5.0
10.5 m	25087	9.0	4.2	0	9.0	4.2	4	9.0	4.2
15.8 m	25130	8.7	3.9	0	8.7	3.9	0	8.7	3.9
21.1 m	16005	8.1	3.8	0	8.1	3.8	0	8.1	3.8
Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
6.2 m	0	0.0	0.0	0	9.7	5.0	1	9.7	5.0
10.5 m	0	0.0	0.0	0	9.0	4.2	0	9.0	4.2
15.8 m	0	0.0	0.0	0	8.7	3.9	0	8.7	3.9
21.1 m	0	0.0	0.0	0	8.1	3.8	0	8.1	3.8
Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
6.2 m	0	0.0	0.0	15670	9.7	5.0	0	9.7	5.0
10.5 m	0	0.0	0.0	15661	9.0	4.3	0	9.0	4.3
15.8 m	0	0.0	0.0	15696	8.8	3.9	0	8.8	3.9
21.1 m	0	0.0	0.0	11482	8.3	3.9	0	8.3	3.9

Tabel B.14: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station "Early"Ndr. Røse

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.5 m	42692	10.1	5.5	0	10.1	5.5	2	10.1	5.5
7.0 m	17426	9.2	5.0	0	9.2	5.0	2	9.2	5.0
Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.5 m	16	10.1	5.5	0	10.1	5.5	0	10.1	5.5
7.0 m	69	9.2	5.0	0	9.2	5.0	0	9.2	5.0
Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.5 m	15	10.1	5.5	13888	10.1	5.5	0	10.1	5.5
7.0 m	17	9.2	5.0	5787	9.2	5.0	0	9.2	5.0

Tabel B.15: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Ndr. Røse

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.9 m	105983	8.9	5.7	0	8.9	5.7	0	8.9	5.7
4.4 m	104512	8.9	5.6	0	8.9	5.6	2	8.9	5.6
5.9 m	105907	8.8	5.5	0	8.8	5.5	4	8.8	5.5
7.4 m	105890	8.8	5.2	0	8.8	5.2	0	8.8	5.2
9.0 m	105603	8.6	5.0	0	8.6	5.0	3	8.6	5.0
10.6 m	105753	8.5	4.6	0	8.5	4.6	4	8.5	4.6

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.9 m	0	0.0	0.0	0	8.9	5.7	0	8.9	5.7
4.4 m	0	0.0	0.0	0	8.9	5.6	0	8.9	5.6
5.9 m	0	0.0	0.0	0	8.8	5.5	0	8.8	5.5
7.4 m	0	0.0	0.0	0	8.8	5.2	0	8.8	5.2
9.0 m	0	0.0	0.0	0	8.6	5.0	0	8.6	5.0
10.6 m	0	0.0	0.0	0	8.5	4.6	1	8.5	4.6

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.9 m	0	0.0	0.0	53142	8.9	5.7	0	8.9	5.7
4.4 m	0	0.0	0.0	52479	8.9	5.6	0	8.9	5.6
5.9 m	0	0.0	0.0	53139	8.8	5.5	0	8.8	5.5
7.4 m	0	0.0	0.0	53097	8.8	5.2	0	8.8	5.2
9.0 m	0	0.0	0.0	52951	8.6	5.0	0	8.6	5.0
10.6 m	0	0.0	0.0	53198	8.5	4.6	0	8.5	4.6

Tabel B.16: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station North Sea

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	9497	11.3	4.8	6	11.3	4.8	0	11.3	4.8
12.0 m	15904	11.5	4.6	16	11.6	4.6	2	11.6	4.6
15.0 m	14249	11.8	4.5	17	11.8	4.5	2	11.8	4.5
20.0 m	15719	10.9	4.3	15	10.9	4.2	15	10.9	4.2
25.0 m	14638	10.3	4.0	17	10.3	4.0	1	10.3	4.0
30.0 m	15908	10.3	4.0	76	10.3	3.9	0	10.3	3.9

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	9	11.3	4.8	1	11.3	4.8	0	11.3	4.8
12.0 m	146	11.6	4.6	0	11.6	4.6	1	11.6	4.6
15.0 m	146	11.8	4.5	0	11.8	4.5	1	11.8	4.5
20.0 m	148	10.9	4.3	0	10.9	4.3	0	10.9	4.3
25.0 m	147	10.3	4.0	2	10.3	4.0	0	10.3	4.0
30.0 m	148	10.3	3.9	0	10.3	3.9	0	10.3	3.9

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	0	11.3	4.8	9473	11.3	4.8	0	11.3	4.8
12.0 m	1	11.6	4.6	15727	11.6	4.6	0	11.6	4.6
15.0 m	0	11.8	4.5	14076	11.8	4.5	0	11.8	4.5
20.0 m	6	10.9	4.3	15525	10.9	4.3	0	10.9	4.3
25.0 m	5	10.3	4.0	14451	10.3	4.0	0	10.3	4.0
30.0 m	4	10.3	3.9	15670	10.3	3.9	0	10.3	3.9

Tabel B.17: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Oder

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	27271	10.8	6.4	91	10.9	6.4	0	10.9	6.4
12.0 m	28399	10.5	5.6	0	10.5	5.6	0	10.5	5.6
Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	13	10.9	6.4	0	10.9	6.4	2	10.9	6.4
12.0 m	4	10.5	5.6	0	10.5	5.6	0	10.5	5.6
Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.0 m	3	10.9	6.4	27149	10.9	6.4	0	10.9	6.4
12.0 m	1	10.5	5.6	28387	10.5	5.6	0	10.5	5.6

Tabel B.18: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Østerrenden Nord

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.3 m	34402	10.0	6.2	0	10.0	6.2	0	10.0	6.2
5.8 m	34318	10.0	6.1	0	10.0	6.1	0	10.0	6.1
9.8 m	34386	9.6	5.7	0	9.6	5.7	3	9.6	5.7
14.9 m	34090	8.7	4.7	0	8.7	4.7	22	8.7	4.7
Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.3 m	0	0.0	0.0	0	10.0	6.2	0	10.0	6.2
5.8 m	0	0.0	0.0	0	10.0	6.1	0	10.0	6.1
9.8 m	0	0.0	0.0	0	9.6	5.7	0	9.6	5.7
14.9 m	0	0.0	0.0	0	8.7	4.7	0	8.7	4.7
Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.3 m	0	0.0	0.0	17303	9.9	6.2	0	9.9	6.2
5.8 m	0	0.0	0.0	17298	10.0	6.1	0	10.0	6.1
9.8 m	0	0.0	0.0	17304	9.5	5.7	0	9.5	5.7
14.9 m	0	0.0	0.0	17179	8.7	4.7	0	8.7	4.7

Tabel B.19: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Romsø Tue Fyr

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
7.0 m	19837	11.2	4.7	0	11.2	4.7	0	11.2	4.7
10.0 m	19693	10.7	4.3	0	10.7	4.3	1	10.7	4.3
12.0 m	17302	10.9	3.7	0	10.9	3.7	0	10.9	3.7
14.0 m	19773	9.6	3.7	0	9.6	3.7	0	9.6	3.7
16.0 m	19717	9.3	3.4	0	9.3	3.4	1	9.3	3.4
19.0 m	19884	9.0	3.1	0	9.0	3.1	1	9.0	3.1

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
7.0 m	0	0.0	0.0	0	11.2	4.7	0	11.2	4.7
10.0 m	0	0.0	0.0	0	10.7	4.3	1	10.7	4.3
12.0 m	0	0.0	0.0	0	10.9	3.7	0	10.9	3.7
14.0 m	0	0.0	0.0	0	9.6	3.7	0	9.6	3.7
16.0 m	0	0.0	0.0	0	9.3	3.4	0	9.3	3.4
19.0 m	0	0.0	0.0	0	9.0	3.1	0	9.0	3.1

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
7.0 m	13	11.2	4.7	10353	11.3	4.7	0	11.3	4.7
10.0 m	8	10.7	4.3	10275	10.8	4.3	0	10.8	4.3
12.0 m	5	10.9	3.7	9076	11.0	3.7	0	11.0	3.7
14.0 m	0	9.6	3.7	10314	9.7	3.6	0	9.7	3.6
16.0 m	1	9.3	3.4	10282	9.4	3.4	0	9.4	3.4
19.0 m	4	9.0	3.1	10367	9.0	3.1	0	9.0	3.1

Tabel B.20: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Vesterrenden

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
6.5 m	86926	9.4	5.8	772	9.4	5.0	4	9.4	5.0
9.6 m	76325	9.0	4.7	0	9.0	4.7	0	9.0	4.7
11.6 m	75950	8.7	4.3	0	8.7	4.3	1	8.7	4.3
13.6 m	71660	8.7	4.1	0	8.7	4.1	0	8.7	4.1
15.6 m	76190	8.2	3.8	0	8.2	3.8	0	8.2	3.8
18.5 m	81092	8.2	3.6	0	8.2	3.6	0	8.2	3.6

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
6.5 m	124	9.4	4.9	0	9.4	4.9	0	9.4	4.9
9.6 m	0	0.0	0.0	0	9.0	4.7	0	9.0	4.7
11.6 m	0	0.0	0.0	0	8.7	4.3	0	8.7	4.3
13.6 m	0	0.0	0.0	0	8.7	4.1	0	8.7	4.1
15.6 m	0	0.0	0.0	0	8.2	3.8	0	8.2	3.8
18.5 m	0	0.0	0.0	0	8.2	3.6	0	8.2	3.6

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
6.5 m	23	9.4	4.9	43186	9.4	4.9	0	9.4	4.9
9.6 m	36	9.0	4.7	38365	9.0	4.7	0	9.0	4.7
11.6 m	27	8.7	4.3	38131	8.7	4.3	0	8.7	4.3
13.6 m	17	8.7	4.1	35982	8.7	4.1	0	8.7	4.1
15.6 m	15	8.2	3.8	38300	8.2	3.8	0	8.2	3.8
18.5 m	20	8.2	3.6	40703	8.2	3.6	0	8.2	3.6

Tabel B.21: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Østerrenden

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
7.0 m	22277	11.3	5.0	0	11.3	5.0	0	11.3	5.0
10.0 m	27841	9.8	5.1	0	9.8	5.1	3	9.8	5.1
12.0 m	27840	9.6	4.8	0	9.6	4.8	4	9.6	4.8
14.0 m	27306	9.3	4.5	0	9.3	4.5	3	9.3	4.5
16.0 m	27840	9.0	4.2	0	9.0	4.2	2	9.0	4.2
19.0 m	27791	8.7	3.9	0	8.7	3.9	0	8.7	3.9

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
7.0 m	0	0.0	0.0	0	11.3	5.0	0	11.3	5.0
10.0 m	0	0.0	0.0	0	9.8	5.1	0	9.8	5.1
12.0 m	0	0.0	0.0	0	9.6	4.8	0	9.6	4.8
14.0 m	0	0.0	0.0	0	9.3	4.5	0	9.3	4.5
16.0 m	0	0.0	0.0	0	9.0	4.2	0	9.0	4.2
19.0 m	0	0.0	0.0	0	8.7	3.9	0	8.7	3.9

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
7.0 m	0	11.3	5.0	11246	11.4	4.9	0	11.4	4.9
10.0 m	8	9.8	5.1	14018	9.9	5.1	0	9.9	5.1
12.0 m	0	9.6	4.8	14020	9.6	4.8	0	9.6	4.8
14.0 m	0	9.3	4.5	13751	9.3	4.5	0	9.3	4.5
16.0 m	17	9.0	4.2	14015	9.0	4.2	0	9.0	4.2
19.0 m	4	8.7	3.9	13995	8.7	3.9	0	8.7	3.9

Tabel B.22: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Langelandsbælt

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
7.6 m	18217	11.7	4.5	0	11.7	4.5	0	11.7	4.5
10.6 m	18267	11.1	4.3	0	11.1	4.3	0	11.1	4.3
12.6 m	17478	10.8	4.2	0	10.8	4.2	0	10.8	4.2
14.6 m	18280	10.4	3.9	0	10.4	3.9	0	10.4	3.9
16.6 m	18285	9.9	3.7	0	9.9	3.7	0	9.9	3.7
19.6 m	17177	9.0	3.5	0	9.0	3.5	0	9.0	3.5

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
7.6 m	0	0.0	0.0	0	11.7	4.5	0	11.7	4.5
10.6 m	0	0.0	0.0	0	11.1	4.3	0	11.1	4.3
12.6 m	1045	11.3	3.9	0	11.3	3.9	0	11.3	3.9
14.6 m	0	0.0	0.0	0	10.4	3.9	0	10.4	3.9
16.6 m	0	0.0	0.0	0	9.9	3.7	0	9.9	3.7
19.6 m	0	0.0	0.0	0	9.0	3.5	0	9.0	3.5

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
7.6 m	2	11.7	4.5	9465	11.7	4.5	0	11.7	4.5
10.6 m	0	11.1	4.3	9473	11.2	4.3	0	11.2	4.3
12.6 m	2	11.3	3.9	8603	11.4	3.8	0	11.4	3.8
14.6 m	13	10.4	3.9	9473	10.4	3.9	0	10.4	3.9
16.6 m	7	9.9	3.7	9472	9.9	3.7	0	9.9	3.7
19.6 m	6	9.0	3.5	8917	9.0	3.5	0	9.0	3.5

Tabel B.23: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Saltholm North

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.5 m	16046	10.1	5.8	0	10.1	5.8	0	10.1	5.8
5.5 m	16046	10.2	5.8	0	10.2	5.8	0	10.2	5.8
7.5 m	16045	10.1	5.7	0	10.1	5.7	0	10.1	5.7
9.5 m	16045	10.1	5.6	0	10.1	5.6	0	10.1	5.6
11.5 m	16043	9.7	5.2	0	9.7	5.2	3	9.7	5.2
13.5 m	16043	9.2	4.5	0	9.2	4.5	4	9.2	4.5
14.2 m	16042	8.7	4.3	0	8.7	4.3	4	8.7	4.3

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.5 m	0	0.0	0.0	0	10.1	5.8	0	10.1	5.8
5.5 m	0	0.0	0.0	0	10.2	5.8	0	10.2	5.8
7.5 m	0	0.0	0.0	0	10.1	5.7	0	10.1	5.7
9.5 m	0	0.0	0.0	0	10.1	5.6	0	10.1	5.6
11.5 m	0	0.0	0.0	0	9.7	5.2	0	9.7	5.2
13.5 m	0	0.0	0.0	0	9.2	4.5	0	9.2	4.5
14.2 m	5	8.7	4.3	0	8.7	4.3	0	8.7	4.3

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
3.5 m	0	10.1	5.8	8006	10.1	5.8	0	10.1	5.8
5.5 m	3	10.2	5.8	8006	10.2	5.8	0	10.2	5.8
7.5 m	1	10.1	5.7	8005	10.1	5.7	0	10.1	5.7
9.5 m	4	10.1	5.6	8005	10.1	5.6	0	10.1	5.6
11.5 m	7	9.7	5.2	8000	9.7	5.2	0	9.7	5.2
13.5 m	2	9.2	4.5	8003	9.2	4.5	0	9.2	4.5
14.2 m	4	8.7	4.3	8000	8.7	4.3	0	8.7	4.3

Tabel B.24: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Svinbådan

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.7 m	17106	10.4	5.7	0	10.4	5.7	1	10.4	5.7
6.0 m	162	5.7	0.8	0	5.7	0.8	0	5.7	0.8
7.7 m	17158	10.2	5.0	0	10.2	5.0	6	10.2	5.0
12.9 m	16395	9.3	3.7	0	9.3	3.7	7	9.3	3.7
21.0 m	9593	8.5	2.3	0	8.5	2.3	1	8.5	2.3

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.7 m	0	0.0	0.0	0	10.4	5.7	0	10.4	5.7
6.0 m	0	0.0	0.0	0	5.7	0.8	0	5.7	0.8
7.7 m	0	0.0	0.0	0	10.2	5.0	0	10.2	5.0
12.9 m	0	0.0	0.0	0	9.3	3.7	0	9.3	3.7
21.0 m	0	0.0	0.0	0	8.5	2.3	0	8.5	2.3

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.7 m	0	0.0	0.0	8591	10.4	5.7	0	10.4	5.7
6.0 m	0	0.0	0.0	81	5.7	0.7	0	5.7	0.7
7.7 m	0	0.0	0.0	8598	10.2	5.0	0	10.2	5.0
12.9 m	0	0.0	0.0	8257	9.4	3.7	0	9.4	3.7
21.0 m	0	0.0	0.0	4805	8.5	2.3	0	8.5	2.3

Tabel B.25: Kvalitetskontrol af temperaturdata for station Valgrundet

Dybde	Observationer			Min/max-filter			Spikes i tid		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.7 m	21421	8.6	5.9	0	8.6	5.9	0	8.6	5.9
4.7 m	21423	8.7	5.7	0	8.7	5.7	0	8.7	5.7
6.8 m	21426	8.6	5.5	0	8.6	5.5	2	8.6	5.5
8.8 m	18134	8.8	5.4	0	8.8	5.4	2	8.8	5.4
10.9 m	18436	7.5	4.0	0	7.5	4.0	1	7.5	4.0

Dybde	Manuelt			Enkelt pkt.			Spikes i tid 2		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.7 m	0	0.0	0.0	0	8.6	5.9	0	8.6	5.9
4.7 m	0	0.0	0.0	0	8.7	5.7	0	8.7	5.7
6.8 m	0	0.0	0.0	0	8.6	5.5	0	8.6	5.5
8.8 m	0	0.0	0.0	0	8.8	5.4	0	8.8	5.4
10.9 m	0	0.0	0.0	0	7.5	4.0	0	7.5	4.0

Dybde	Glidende gns. og std.			Timeværdier			Spikes i dybden		
	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.	antal	gns.	std.
2.7 m	0	0.0	0.0	10749	8.6	5.9	0	8.6	5.9
4.7 m	0	0.0	0.0	10750	8.7	5.7	0	8.7	5.7
6.8 m	0	0.0	0.0	10751	8.6	5.5	0	8.6	5.5
8.8 m	0	0.0	0.0	9110	8.8	5.4	0	8.8	5.4
10.9 m	0	0.0	0.0	9242	7.5	4.0	0	7.5	4.0

Tabel B.26: Information om manglende temperaturdata for station Århus Bugt

Dybder (m)	4.0	9.0	14.0
Længste hul (d.)	11.0	11.0	11.0
Huller ialt (d.)	15.3	15.3	15.3
Huller i %	2.6	2.6	2.6
Periode u. huller > 2 d. (d.)	270.0	270.0	270.0
Obs. længde (d.)	581.6	581.6	581.6

Tabel B.27: Information om manglende temperaturdata for station Darss Sill

Dybder (m)	2.0	5.0	7.0	12.0	17.0	19.0
Længste hul (d.)	601.8	601.8	415.0	415.0	415.0	415.0
Huller ialt (d.)	1101.1	1133.6	902.5	902.1	920.8	923.3
Huller i %	55.8	57.5	45.8	45.7	46.7	46.8
Periode u. huller > 2 d. (d.)	160.7	160.7	160.7	193.2	193.2	193.3
Obs. længde (d.)	1972.0	1972.0	1972.0	1972.0	1972.0	1972.0

Tabel B.28: Information om manglende temperaturdata for station Deutsche Bucht

Dybder (m)	3.0	6.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0
Længste hul (d.)	110.2	110.2	110.2	110.2	110.2	110.2	110.2
Huller ialt (d.)	548.3	492.8	490.9	520.8	507.4	500.4	515.7
Huller i %	27.8	25.0	25.4	26.4	25.7	25.4	26.2
Periode u. huller > 2 d. (d.)	345.2	345.2	345.2	345.2	345.2	345.2	345.2
Obs. længde (d.)	1972.0	1972.0	1934.3	1972.0	1972.0	1972.0	1972.0

Tabel B.29: Information om manglende temperaturdata for station Drogden

Dybder (m)	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
Længste hul (d.)	19.3	60.0	19.3	19.3	19.3
Huller ialt (d.)	119.0	148.6	92.6	94.6	98.2
Huller i %	10.0	12.4	7.7	7.9	8.2
Periode u. huller > 2 d. (d.)	487.1	487.1	487.1	487.1	487.1
Obs. længde (d.)	1195.5	1195.5	1195.5	1195.5	1195.5

Tabel B.30: Information om manglende temperaturdata for station Elbe

Dybder (m)	3.0	6.0	10.0	15.0	20.0
Længste hul (d.)	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0
Huller ialt (d.)	248.1	249.1	247.5	250.5	251.2
Huller i %	24.0	24.1	23.9	24.2	24.3
Periode u. huller > 2 d. (d.)	286.2	286.2	286.2	286.2	286.2
Obs. længde (d.)	1035.0	1035.0	1035.0	1035.0	1035.0

Tabel B.31: Information om manglende temperaturdata for station EMS

Dybder (m)	3.0	6.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0
Længste hul (d.)	151.0	162.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0
Huller ialt (d.)	701.3	812.5	642.1	722.5	625.2	642.5	740.4
Huller i %	35.6	41.2	32.6	36.6	33.8	33.5	37.5
Periode u. huller > 2 d. (d.)	203.5	141.4	203.5	141.4	203.5	203.5	141.3
Obs. længde (d.)	1972.0	1972.0	1972.0	1972.0	1849.0	1918.0	1972.0

Tabel B.32: Information om manglende temperaturdata for station Farø

Dybder (m)	2.8	5.5	8.5	11.5	14.5	21.0
Længste hul (d.)	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
Huller ialt (d.)	16.0	17.0	18.4	20.1	21.6	22.6
Huller i %	3.3	3.5	3.8	4.1	4.4	4.9
Periode u. huller > 2 d. (d.)	254.3	254.3	254.3	254.3	254.3	254.3
Obs. længde (d.)	487.0	487.0	487.0	487.0	487.0	459.9

Tabel B.33: Information om manglende temperaturdata for station "Early"Flinten

Dybder (m)	1.5	7.5
Længste hul (d.)	43.0	0.2
Huller ialt (d.)	72.5	0.2
Huller i %	13.6	0.3
Periode u. huller > 2 d. (d.)	192.0	75.4
Obs. længde (d.)	534.5	75.5

Tabel B.34: Information om manglende temperaturdata for station Flinten

Dybder (m)	3.0	4.5	6.0	7.5	9.1
Længste hul (d.)	101.2	101.2	101.2	101.2	101.2
Huller ialt (d.)	365.3	358.9	359.5	361.1	395.3
Huller i %	14.9	14.6	14.7	14.7	16.1
Periode u. huller > 2 d. (d.)	488.9	488.9	488.9	488.9	488.9
Obs. længde (d.)	2451.5	2451.5	2451.5	2451.5	2451.5

Tabel B.35: Information om manglende temperaturdata for station Gamle Bro

Dybder (m)	5.0	10.0	15.0	20.0	22.5
Længste hul (d.)	179.2	155.1	179.2	179.2	320.4
Huller ialt (d.)	450.3	280.8	451.2	571.1	784.9
Huller i %	22.7	15.5	22.8	28.8	39.6
Periode u. huller > 2 d. (d.)	856.8	856.8	856.8	523.8	283.0
Obs. længde (d.)	1983.0	1807.4	1983.0	1983.0	1983.0

Tabel B.36: Information om manglende temperaturdata for station Hjelm Bugt

Dybder (m)	6.7	10.2	15.4	21.5
Længste hul (d.)	9.6	9.6	9.6	9.6
Huller ialt (d.)	41.0	41.8	41.3	42.0
Huller i %	3.4	3.4	3.4	3.5
Periode u. huller > 2 d. (d.)	684.7	684.7	684.7	684.7
Obs. længde (d.)	1212.3	1212.3	1212.3	1212.3

Tabel B.37: Information om manglende temperaturdata for station Kiel

Dybder (m)	1.0	2.0	4.0	8.0	13.0
Længste hul (d.)	56.1	56.1	56.1	56.1	56.0
Huller ialt (d.)	252.0	251.5	245.2	458.6	253.2
Huller i %	12.8	12.7	13.7	23.2	12.8
Periode u. huller > 2 d. (d.)	406.4	406.4	406.4	372.5	406.4
Obs. længde (d.)	1973.0	1973.0	1791.5	1973.0	1791.6

Tabel B.38: Information om manglende temperaturdata for station Læsø Rende

Dybder (m)	6.2	10.5	15.8	21.1
Længste hul (d.)	105.2	105.2	105.2	105.2
Huller ialt (d.)	139.6	140.0	138.5	129.6
Huller i %	17.6	17.7	17.5	21.3
Periode u. huller > 2 d. (d.)	185.0	185.0	185.0	185.0
Obs. længde (d.)	792.5	792.5	792.5	608.0

Tabel B.39: Information om manglende temperaturdata for station "Early"Ndr. Røse

Dybder (m)	2.5	7.0
Længste hul (d.)	43.0	299.9
Huller ialt (d.)	53.8	345.8
Huller i %	8.5	58.9
Periode u. huller > 2 d. (d.)	420.4	118.5
Obs. længde (d.)	632.4	587.0

Tabel B.40: Information om manglende temperaturdata for station Ndr. Røse

Dybder (m)	2.9	4.4	5.9	7.4	9.0	10.6
Længste hul (d.)	36.7	36.7	36.7	29.0	36.7	50.8
Huller ialt (d.)	263.7	291.3	263.8	265.6	271.7	261.4
Huller i %	10.6	11.8	10.6	10.7	11.0	10.5
Periode u. huller > 2 d. (d.)	312.4	312.4	312.4	312.3	312.4	287.5
Obs. længde (d.)	2478.0	2478.0	2478.0	2478.0	2478.0	2478.0

Tabel B.41: Information om manglende temperaturdata for station North Sea

Dybder (m)	3.0	12.0	15.0	20.0	25.0	30.0
Længste hul (d.)	714.1	705.7	705.7	705.7	705.7	705.7
Huller ialt (d.)	1557.7	1297.1	1365.9	1305.5	1350.3	1299.5
Huller i %	79.8	66.4	70.0	66.9	69.2	66.6
Periode u. huller > 2 d. (d.)	189.7	305.7	156.8	178.1	305.8	305.8
Obs. længde (d.)	1952.4	1952.4	1952.4	1952.4	1952.4	1952.4

Tabel B.42: Information om manglende temperaturdata for station Oder

Dybder (m)	3.0	12.0
Længste hul (d.)	103.4	103.4
Huller ialt (d.)	542.2	490.7
Huller i %	32.4	29.3
Periode u. huller > 2 d. (d.)	186.1	280.4
Obs. længde (d.)	1673.5	1673.5

Tabel B.43: Information om manglende temperaturdata for station Østerrenden Nord

Dybder (m)	3.3	5.8	9.8	14.9
Længste hul (d.)	2.4	2.4	2.4	2.4
Huller ialt (d.)	8.1	8.3	8.0	13.2
Huller i %	1.1	1.1	1.1	1.8
Periode u. huller > 2 d. (d.)	681.5	681.5	681.5	681.5
Obs. længde (d.)	729.0	729.0	729.0	729.0

Tabel B.44: Information om manglende temperaturdata for station Romsø Tue Fyr

Dybder (m)	7.0	10.0	12.0	14.0	16.0	19.0
Længste hul (d.)	8.4	8.4	53.6	8.4	8.4	8.4
Huller ialt (d.)	85.9	89.1	139.1	87.5	88.8	85.3
Huller i %	16.6	17.2	26.9	16.9	17.2	16.5
Periode u. huller > 2 d. (d.)	218.6	218.6	116.3	218.6	218.6	218.6
Obs. længde (d.)	517.2	517.2	517.2	517.2	517.2	517.2

Tabel B.45: Information om manglende temperaturdata for station Vesterrenden

Dybder (m)	6.5	9.6	11.6	13.6	15.6	18.5
Længste hul (d.)	46.8	43.1	43.0	109.3	43.1	105.2
Huller ialt (d.)	223.1	142.6	152.3	241.9	145.3	326.5
Huller i %	11.0	8.2	8.7	13.9	8.3	16.1
Periode u. huller > 2 d. (d.)	685.8	715.0	715.0	568.0	715.0	563.0
Obs. længde (d.)	2022.5	1741.1	1741.1	1741.1	1741.1	2022.5

Tabel B.46: Information om manglende temperaturdata for station Østerrenden

Dybder (m)	7.0	10.0	12.0	14.0	16.0	19.0
Længste hul (d.)	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3
Huller ialt (d.)	152.7	149.4	149.3	160.5	149.5	150.3
Huller i %	24.6	20.4	20.4	21.9	20.4	20.5
Periode u. huller > 2 d. (d.)	196.9	361.4	361.4	361.4	361.4	361.4
Obs. længde (d.)	621.2	733.5	733.5	733.5	733.5	733.5

Tabel B.47: Information om manglende temperaturdata for station Langelandsbælt

Dybder (m)	7.6	10.6	12.6	14.6	16.6	19.6
Længste hul (d.)	18.3	18.3	42.0	18.3	18.3	18.7
Huller ialt (d.)	116.1	115.8	152.0	115.8	115.8	138.9
Huller i %	22.7	22.7	29.8	22.7	22.7	27.2
Periode u. huller > 2 d. (d.)	208.5	208.5	197.6	208.5	208.5	136.4
Obs. længde (d.)	510.5	510.5	510.5	510.5	510.5	510.5

Tabel B.48: Information om manglende temperaturdata for station Saltholm North

Dybder (m)	3.5	5.5	7.5	9.5	11.5	13.5	14.2
Længste hul (d.)	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
Huller ialt (d.)	68.8	68.8	68.8	68.8	69.0	68.9	69.0
Huller i %	17.1	17.1	17.1	17.1	17.2	17.1	17.2
Periode u. huller > 2 d. (d.)	94.8	94.8	94.8	94.8	94.7	94.7	94.7
Obs. længde (d.)	402.4	402.4	402.4	402.4	402.4	402.4	402.4

Tabel B.49: Information om manglende temperaturdata for station Svinbådan

Dybder (m)	2.7	6.0	7.7	12.9	21.0
Længste hul (d.)	99.7		99.7	104.7	65.6
Huller ialt (d.)	111.7		111.4	125.6	68.8
Huller i %	23.8		23.7	26.7	25.6
Periode u. huller > 2 d. (d.)	272.4	3.3	272.4	132.8	173.6
Obs. længde (d.)	469.6	3.4	469.6	469.6	269.0

Tabel B.50: Information om manglende temperaturdata for station Valgrundet

Dybder (m)	2.7	4.7	6.8	8.8	10.9
Længste hul (d.)	5.0	5.0	5.0	5.0	66.1
Huller ialt (d.)	24.5	24.5	24.5	24.3	87.4
Huller i %	5.2	5.2	5.2	6.0	18.5
Periode u. huller > 2 d. (d.)	355.0	355.0	355.0	355.0	184.6
Obs. længde (d.)	472.4	472.5	472.5	403.9	472.5

Tabel B.51: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Århus Bugt i 4.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	803	1	2.67	2.68	0.60	1.17	5.22
feb	1365	2	2.26	2.56	0.71	-0.03	3.66
mar	1485	2	2.66	2.64	1.18	0.07	5.04
apr	1437	2	6.51	6.12	1.73	3.94	10.34
maj	1468	2	10.42	10.55	1.23	6.26	14.55
jun	1439	2	14.27	14.30	1.17	10.68	18.15
jul	1426	2	16.86	16.79	1.33	12.84	21.03
aug	1486	2	19.17	19.05	2.02	15.98	22.82
sep	745	1	15.87	16.19	0.47	13.80	16.67
oct	608	1	11.81	12.51	1.76	8.37	14.21
nov	589	1	7.82	7.73	0.47	7.03	9.12
dec	741	1	6.97	6.99	0.93	5.08	9.03

Tabel B.52: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Århus Bugt i 9.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	803	1	2.76	2.69	0.61	1.42	5.26
feb	1365	2	2.59	2.70	0.60	0.92	4.53
mar	1485	2	2.91	2.95	1.19	0.07	4.67
apr	1437	2	5.76	5.37	1.39	4.04	10.34
maj	1468	2	7.36	6.90	1.13	5.13	11.55
jun	1439	2	10.76	10.96	1.73	6.58	14.72
jul	1425	2	15.13	14.82	1.87	10.89	21.16
aug	1486	2	17.06	17.03	1.69	12.83	21.25
sep	745	1	15.89	16.08	0.43	12.54	16.69
oct	608	1	12.56	12.88	1.82	8.75	15.54
nov	533	1	8.00	7.88	0.62	7.02	10.50
dec	741	1	7.09	7.04	1.03	5.15	10.32

Tabel B.53: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Århus Bugt i 14.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	803	1	3.49	3.33	0.99	1.75	6.62
feb	1365	2	3.74	4.30	0.71	1.58	6.12
mar	1485	2	3.90	4.20	0.95	1.38	5.39
apr	1437	2	5.22	4.97	0.59	4.41	8.23
maj	1468	2	5.71	5.50	0.62	4.82	9.05
jun	1439	2	8.08	7.87	1.34	6.07	12.18
jul	1425	2	11.14	11.12	1.23	8.87	15.87
aug	1486	2	13.40	13.20	0.95	11.39	16.38
sep	745	1	14.92	14.77	0.38	12.16	16.26
oct	608	1	13.51	14.11	2.11	9.37	15.56
nov	589	1	10.58	11.16	1.59	7.09	12.68
dec	741	1	8.33	7.29	2.02	5.54	11.60

Tabel B.54: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Darss Sill i 2.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1791	3	2.88	2.99	0.63	-0.18	5.92
feb	1718	3	2.24	2.22	0.25	0.00	4.72
mar	1969	3	3.42	3.67	0.30	2.04	5.10
apr	1635	3	5.07	4.86	0.84	3.69	7.67
maj	1665	3	8.73	8.37	1.81	5.03	13.77
jun	1377	2	13.55	13.55	1.05	10.05	16.69
jul	1952	3	16.21	15.98	1.49	9.43	23.10
aug	1790	4	17.98	17.01	1.45	10.17	23.33
sep	1613	3	15.29	15.66	1.43	9.75	21.52
oct	1502	3	11.58	11.56	0.59	9.16	14.02
nov	1889	3	8.87	8.60	1.31	5.06	12.76
dec	2000	3	4.76	4.81	0.71	2.22	8.01

Tabel B.55: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Darss Sill i 5.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1433	2	2.93	3.05	0.23	2.20	8.84
feb	1185	2	2.90	2.69	0.31	1.55	5.19
mar	1348	2	3.17	3.28	0.24	2.07	4.58
apr	1571	3	5.03	4.85	0.80	3.69	7.42
maj	1830	3	8.64	8.38	1.40	5.06	13.79
jun	1960	3	13.02	13.28	1.46	8.85	16.68
jul	1991	3	16.04	15.72	1.41	9.45	21.99
aug	1742	4	17.77	17.02	1.65	9.55	25.00
sep	1625	4	16.03	15.59	1.43	9.77	20.93
oct	1512	3	11.54	11.62	0.71	9.21	14.62
nov	1927	3	8.42	8.51	1.10	5.12	12.28
dec	1998	3	4.77	4.84	0.72	2.28	7.99

Tabel B.56: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Darss Sill i 7.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1763	2	2.84	3.06	0.32	1.60	4.89
feb	1998	3	2.92	3.00	0.27	1.55	4.16
mar	2415	4	2.96	2.93	0.25	2.05	4.27
apr	2213	4	4.75	4.70	0.65	2.69	7.27
maj	3134	5	8.17	7.67	1.62	5.01	13.55
jun	2494	4	12.58	13.01	1.68	6.67	16.54
jul	2366	4	15.26	15.30	2.19	6.89	20.86
aug	1759	4	16.90	16.58	1.65	7.97	22.57
sep	1932	3	13.97	14.34	1.81	7.60	20.75
oct	1697	3	11.51	11.70	0.72	8.71	14.75
nov	1935	3	8.44	8.47	1.16	5.18	12.19
dec	1963	3	4.70	4.78	0.70	2.59	7.68

Tabel B.57: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Darss Sill i 12.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1655	2	2.82	3.06	0.35	1.59	5.68
feb	1970	3	2.97	3.03	0.38	1.57	5.17
mar	2866	5	3.07	3.11	0.27	2.01	4.23
apr	2672	5	4.60	4.46	0.61	2.70	6.90
maj	3122	5	7.68	7.22	1.53	4.52	12.57
jun	2446	4	11.24	11.36	1.85	6.60	15.42
jul	2340	4	13.40	13.46	2.34	6.55	18.54
aug	1699	4	15.59	15.82	2.04	8.72	20.60
sep	1712	3	13.34	13.65	1.50	7.65	20.69
oct	1448	3	11.63	12.06	0.72	8.71	14.90
nov	1887	3	8.75	8.58	1.19	5.41	12.20
dec	1861	3	4.82	4.87	0.74	2.57	7.71

Tabel B.58: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Darss Sill i 17.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1578	2	3.09	3.30	0.43	1.96	6.30
feb	1939	3	3.20	3.13	0.39	1.35	5.57
mar	2845	5	3.08	3.09	0.25	2.07	4.22
apr	2460	5	4.34	4.38	0.47	2.62	5.97
maj	3097	5	6.69	6.54	1.25	4.54	10.54
jun	2296	4	10.11	9.92	1.49	6.75	14.71
jul	2374	4	11.67	11.19	1.90	6.74	17.98
aug	1572	4	13.69	13.89	1.88	7.49	17.59
sep	1792	3	13.09	13.66	1.75	6.83	19.83
oct	1613	3	11.81	12.21	0.79	8.71	14.66
nov	1850	3	9.31	9.05	1.01	6.04	12.21
dec	1810	3	5.30	5.33	0.98	2.57	8.42

Tabel B.59: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Darss Sill i 19.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1482	2	3.05	3.30	0.32	1.96	6.30
feb	2023	3	3.26	3.14	0.41	1.35	5.84
mar	2960	5	3.10	3.13	0.26	2.07	4.23
apr	2501	5	4.31	4.38	0.46	2.62	5.87
maj	3132	5	6.40	6.11	1.14	4.53	10.01
jun	2193	4	9.38	9.59	1.22	6.43	13.81
jul	2114	4	11.65	11.11	1.70	7.75	17.93
aug	1729	4	13.24	13.09	1.64	9.13	17.43
sep	1909	4	13.80	13.50	1.62	6.73	20.12
oct	1700	3	11.87	12.38	0.76	8.71	14.12
nov	1888	3	9.47	9.19	0.97	5.56	12.21
dec	1538	3	5.87	6.06	0.94	3.02	8.56

Tabel B.60: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Deutsche Bucht i 3.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3358	6	5.44	5.64	0.42	2.34	6.93
feb	3084	5	4.75	4.82	0.25	2.74	6.32
mar	2944	4	5.34	5.53	0.33	3.07	7.52
apr	2328	4	6.91	7.14	0.50	4.29	9.57
maj	2583	5	10.48	10.46	1.05	6.88	14.13
jun	2953	5	13.36	13.29	1.09	10.42	16.58
jul	2764	4	16.36	16.41	1.10	13.31	19.94
aug	2914	5	17.96	17.59	0.64	15.77	21.50
sep	2653	5	17.37	17.43	0.41	15.44	19.35
oct	2717	5	14.68	14.55	0.90	10.58	17.02
nov	3177	5	11.03	10.98	1.14	7.45	14.35
dec	2695	4	7.77	7.36	0.70	5.47	10.77

Tabel B.61: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Deutsche Bucht i 6.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3708	6	5.51	5.66	0.37	2.20	6.92
feb	3080	5	4.76	4.83	0.24	2.74	6.32
mar	2959	4	5.32	5.51	0.31	3.07	7.25
apr	2385	5	6.46	7.08	0.45	4.28	9.14
maj	2618	5	10.18	10.08	1.00	6.88	13.92
jun	2956	5	13.09	13.16	1.01	9.78	16.42
jul	2753	4	15.99	16.08	1.01	13.09	19.36
aug	2983	5	17.77	17.52	0.58	15.68	21.34
sep	3010	5	17.26	17.26	0.47	15.39	19.33
oct	3050	5	14.71	14.75	0.93	10.57	17.02
nov	3194	5	11.04	10.97	1.14	7.62	14.35
dec	2807	4	7.74	7.30	0.71	5.32	10.77

Tabel B.62: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Deutsche Bucht i 10.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3702	6	5.48	5.65	0.42	2.89	6.93
feb	3087	5	4.79	4.89	0.22	2.74	6.32
mar	2964	4	5.31	5.50	0.27	3.07	7.00
apr	2209	5	6.29	6.88	0.40	4.28	8.87
maj	2042	4	9.57	9.38	1.03	6.62	13.11
jun	2944	5	12.64	12.69	0.92	8.99	15.35
jul	2764	4	15.31	15.18	0.86	12.50	18.47
aug	2980	5	17.39	17.37	0.48	15.50	20.84
sep	2989	5	17.26	17.25	0.46	15.38	19.26
oct	2991	5	14.72	14.75	0.92	10.64	17.02
nov	3183	5	11.10	11.00	1.12	7.61	14.36
dec	2787	4	7.76	7.32	0.73	5.76	10.78

Tabel B.63: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Deutsche Bucht i 15.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3690	6	5.50	5.63	0.42	3.39	7.13
feb	3091	5	4.80	4.88	0.21	2.74	6.32
mar	2965	4	5.30	5.46	0.25	3.06	6.77
apr	2384	5	6.19	6.83	0.40	4.27	8.13
maj	2107	4	8.74	8.46	0.86	6.55	12.44
jun	2947	5	12.17	12.21	0.98	8.71	15.03
jul	2765	4	15.02	15.04	0.88	12.27	17.58
aug	2984	5	17.15	17.15	0.45	15.30	19.62
sep	2919	5	17.28	17.30	0.42	15.47	19.15
oct	2994	5	14.70	14.76	0.92	10.58	17.02
nov	3185	5	11.17	11.08	1.10	7.60	14.35
dec	2798	4	7.79	7.35	0.76	5.78	10.77

Tabel B.64: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Deutsche Bucht i 20.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3692	6	5.53	5.67	0.44	3.09	7.76
feb	3082	5	4.82	4.97	0.21	2.74	6.34
mar	2939	4	5.32	5.52	0.22	3.06	6.56
apr	2295	5	6.19	6.78	0.43	4.26	8.58
maj	2555	5	8.89	8.81	0.70	6.50	11.89
jun	2951	5	11.92	12.04	1.00	8.41	14.84
jul	2766	4	14.88	14.98	0.91	12.16	17.03
aug	2985	5	17.09	17.12	0.45	15.19	18.88
sep	2977	5	17.27	17.21	0.44	15.10	19.15
oct	2953	5	14.72	14.78	0.92	10.65	17.01
nov	3176	5	11.23	11.20	1.10	7.64	14.32
dec	2781	4	7.84	7.40	0.73	5.88	10.74

Tabel B.65: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Deutsche Bucht i 25.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3690	6	5.60	5.71	0.40	3.36	7.06
feb	3070	5	4.82	5.02	0.21	2.74	6.38
mar	2956	4	5.34	5.54	0.21	3.06	6.53
apr	2385	5	6.17	6.73	0.42	4.24	8.59
maj	2592	5	8.84	8.81	0.67	6.51	11.86
jun	2910	5	11.81	11.95	0.99	8.31	14.79
jul	2770	4	14.82	14.96	0.92	11.84	16.98
aug	2986	5	17.06	17.10	0.44	15.16	18.76
sep	2978	5	17.30	17.30	0.43	15.50	19.15
oct	3017	5	14.74	14.85	0.91	10.67	17.02
nov	3179	5	11.28	11.25	1.11	7.75	14.36
dec	2786	4	7.88	7.43	0.73	5.92	10.78

Tabel B.66: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Deutsche Bucht i 30.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3689	6	5.62	5.71	0.42	3.35	7.25
feb	3078	5	4.82	5.03	0.21	2.75	6.41
mar	2957	4	5.34	5.53	0.20	3.07	6.53
apr	2386	5	6.16	6.70	0.42	4.25	8.58
maj	2595	5	8.83	8.79	0.67	6.44	11.86
jun	2942	5	11.75	11.91	1.00	8.29	14.75
jul	2767	4	14.78	14.94	0.92	11.71	16.94
aug	2987	5	17.04	17.09	0.44	15.17	18.48
sep	2833	5	17.31	17.36	0.44	15.00	19.15
oct	2762	5	14.71	14.70	0.89	11.03	17.01
nov	3176	5	11.29	11.24	1.11	7.80	14.30
dec	2780	4	7.89	7.43	0.72	5.91	10.74

Tabel B.67: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Drogden i 2.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2501	4	3.27	3.25	0.59	1.35	5.85
feb	2342	4	2.96	3.02	0.39	1.18	4.85
mar	2557	4	3.13	3.00	0.35	1.82	4.80
apr	2300	3	5.54	5.27	0.84	2.80	10.15
maj	2078	3	10.18	10.12	1.86	5.75	15.45
jun	2070	3	13.90	13.60	1.24	11.42	17.59
jul	1798	3	16.90	16.98	1.17	11.90	21.25
aug	2046	3	17.11	17.00	1.06	12.40	20.84
sep	2075	3	15.32	15.20	1.05	12.47	18.05
oct	2105	3	12.53	12.75	0.92	9.99	14.86
nov	2034	3	8.94	8.90	1.10	6.28	11.37
dec	1928	3	5.97	6.10	1.35	2.05	10.40

Tabel B.68: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Drogden i 4.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2525	4	3.31	3.27	0.61	1.35	6.55
feb	2382	4	2.97	3.00	0.39	1.16	4.80
mar	2590	4	3.11	3.05	0.35	1.80	4.73
apr	2353	3	5.51	5.28	0.84	2.78	9.83
maj	2182	3	10.05	10.04	1.82	5.75	15.00
jun	2124	3	13.85	13.50	1.27	11.12	17.34
jul	1846	3	16.63	16.60	1.18	11.70	20.60
aug	2150	3	17.01	16.85	1.05	12.43	20.81
sep	2066	3	15.32	15.15	1.09	12.37	17.93
oct	1459	2	12.48	12.60	0.99	10.02	14.87
nov	1483	2	9.11	9.07	0.75	6.29	11.47
dec	1965	3	6.03	6.14	1.34	2.20	10.50

Tabel B.69: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Drogden i 6.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2527	4	3.43	3.42	0.72	1.35	7.20
feb	2382	4	3.01	3.05	0.39	1.27	4.80
mar	2591	4	3.15	3.05	0.36	1.85	4.77
apr	2353	3	5.53	5.28	0.82	2.65	10.00
maj	2183	3	9.88	9.85	1.72	5.65	14.45
jun	2124	3	13.78	13.40	1.21	10.50	17.25
jul	1844	3	16.35	16.25	1.24	11.65	20.30
aug	2143	3	16.87	16.75	1.03	12.34	20.49
sep	2124	3	15.17	15.00	1.21	12.43	17.81
oct	2171	3	12.45	12.65	0.86	10.18	14.81
nov	2061	3	9.02	8.95	1.09	6.25	11.47
dec	1965	3	6.10	6.20	1.37	2.20	10.70

Tabel B.70: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Drogden i 8.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2480	4	3.65	3.65	0.83	1.35	8.15
feb	2382	4	3.04	3.09	0.40	1.15	4.85
mar	2588	4	3.15	3.13	0.40	1.77	4.69
apr	2352	3	5.57	5.40	0.80	2.85	9.90
maj	2186	3	9.68	9.75	1.59	5.75	13.70
jun	2122	3	13.73	13.35	1.17	10.73	17.03
jul	1846	3	16.17	15.95	1.24	11.80	20.15
aug	2143	3	16.85	16.70	1.01	12.21	20.30
sep	2124	3	15.10	15.00	1.27	12.58	17.70
oct	2171	3	12.32	12.49	0.80	10.19	14.69
nov	2062	3	9.04	9.08	1.09	6.22	11.38
dec	1965	3	6.18	6.12	1.39	2.15	11.05

Tabel B.71: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Drogden i 10.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2514	4	3.81	3.90	0.92	1.50	8.20
feb	2365	4	3.09	3.04	0.46	1.24	6.90
mar	2549	4	3.20	3.21	0.43	1.84	4.57
apr	2326	3	5.58	5.43	0.78	2.85	9.75
maj	2163	3	9.52	9.62	1.51	5.75	13.25
jun	2112	3	13.69	13.35	1.12	11.05	16.61
jul	1838	3	16.08	15.83	1.17	11.70	20.10
aug	2142	3	16.83	16.75	0.99	12.28	20.36
sep	2125	3	15.04	14.93	1.27	12.50	17.55
oct	2172	3	12.23	12.35	0.71	10.41	14.49
nov	2062	3	9.15	9.20	1.11	6.27	11.49
dec	1965	3	6.32	6.17	1.47	2.20	11.10

Tabel B.72: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Elbe i 3.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	705	1	5.04	5.07	0.33	4.09	5.78
feb	1294	2	3.37	3.23	0.43	1.79	5.06
mar	1382	2	4.63	4.44	0.56	3.26	6.64
apr	1385	2	7.20	7.08	0.65	5.58	10.29
maj	1428	2	9.69	9.36	1.28	7.25	14.15
jun	2043	3	13.76	13.70	1.24	9.76	17.23
jul	2109	3	16.70	16.59	0.90	12.99	19.35
aug	1738	3	18.24	18.05	0.68	15.65	21.49
sep	1907	3	17.18	16.94	0.72	15.23	20.34
oct	1831	3	13.23	13.40	1.31	9.55	16.28
nov	1575	3	9.79	9.75	1.22	6.56	13.78
dec	1489	2	5.96	5.79	0.67	3.77	9.83

Tabel B.73: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Elbe i 6.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	704	1	5.07	5.08	0.30	4.39	5.78
feb	1281	2	3.42	3.29	0.41	1.95	5.06
mar	1376	2	4.58	4.40	0.54	3.26	6.56
apr	1390	2	7.03	6.90	0.56	4.95	9.86
maj	1436	2	9.33	9.01	1.21	6.73	14.04
jun	2063	3	13.39	13.44	1.25	9.15	16.16
jul	2093	3	16.38	16.21	0.88	12.98	18.65
aug	1738	3	18.05	17.92	0.62	15.65	20.50
sep	1909	3	17.17	16.96	0.69	15.23	20.23
oct	1830	3	13.26	13.42	1.30	9.64	16.29
nov	1567	3	9.88	9.76	1.21	6.56	13.48
dec	1475	2	6.00	5.80	0.66	4.14	9.81

Tabel B.74: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Elbe i 10.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	703	1	5.13	5.12	0.27	4.49	5.79
feb	1277	2	3.49	3.30	0.40	2.11	5.16
mar	1379	2	4.54	4.36	0.52	3.25	6.52
apr	1387	2	6.84	6.74	0.52	4.91	9.15
maj	1438	2	8.96	8.68	1.14	6.20	13.47
jun	2066	3	13.07	13.18	1.25	8.87	16.03
jul	2090	3	16.12	16.02	0.88	12.38	18.20
aug	1738	3	17.92	17.79	0.59	15.86	20.18
sep	1927	3	17.16	17.03	0.67	15.31	19.96
oct	1829	3	13.31	13.48	1.28	9.73	16.29
nov	1571	3	9.96	9.83	1.19	6.57	13.76
dec	1495	2	6.07	5.83	0.65	4.34	9.80

Tabel B.75: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Elbe i 15.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	702	1	5.22	5.21	0.26	4.49	5.79
feb	1267	2	3.58	3.21	0.40	2.17	5.22
mar	1370	2	4.52	4.35	0.50	3.26	6.42
apr	1378	2	6.69	6.55	0.49	4.93	8.72
maj	1438	2	8.70	8.42	1.12	5.94	12.95
jun	2070	3	12.83	12.95	1.26	8.80	16.02
jul	2091	3	15.96	15.93	0.88	12.24	18.06
aug	1738	3	17.84	17.72	0.57	16.02	19.96
sep	1908	3	17.21	17.05	0.65	15.41	19.98
oct	1830	3	13.42	13.57	1.27	10.07	16.91
nov	1553	3	10.06	9.97	1.16	6.77	13.48
dec	1484	2	6.17	5.88	0.65	4.54	9.83

Tabel B.76: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Elbe i 20.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	698	1	5.26	5.24	0.26	4.49	5.79
feb	1266	2	3.61	3.23	0.40	2.19	5.26
mar	1361	2	4.50	4.36	0.49	3.24	6.35
apr	1383	2	6.55	6.39	0.46	4.91	8.35
maj	1437	2	8.56	8.28	1.11	5.90	12.44
jun	2069	3	12.69	12.87	1.28	8.67	16.01
jul	2092	3	15.86	15.85	0.88	12.19	18.07
aug	1738	3	17.80	17.66	0.55	16.09	19.94
sep	1907	3	17.24	17.09	0.66	15.41	19.97
oct	1831	3	13.55	13.78	1.26	10.10	16.93
nov	1551	3	10.11	10.05	1.15	7.03	13.48
dec	1480	2	6.22	5.90	0.66	4.74	9.84

Tabel B.77: Månedlig statistik over temperaturdata fra station EMS i 3.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2869	5	6.02	6.20	0.44	3.08	7.21
feb	2492	4	5.42	5.87	0.27	2.89	7.60
mar	2288	4	5.82	5.76	0.30	4.14	7.29
apr	2156	3	7.22	7.18	0.55	5.66	10.12
maj	3206	5	10.19	10.25	1.27	6.74	13.32
jun	3325	5	13.67	13.60	0.98	10.66	17.24
jul	2563	4	16.51	16.75	0.77	13.78	20.01
aug	1506	2	16.83	17.14	0.29	15.79	20.30
sep	2492	4	17.21	17.16	0.38	15.54	19.39
oct	2922	5	14.83	14.96	0.82	12.71	17.03
nov	2119	4	11.69	11.33	0.88	8.41	14.57
dec	2560	4	8.33	7.94	0.70	6.52	10.88

Tabel B.78: Månedlig statistik over temperaturdata fra station EMS i 6.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2601	5	6.12	6.41	0.50	3.06	7.74
feb	1343	2	6.14	6.25	0.31	3.02	7.65
mar	1444	2	6.05	5.81	0.30	3.76	7.34
apr	1488	2	7.66	7.44	0.61	6.10	9.88
maj	2691	4	10.25	10.30	1.03	7.58	12.98
jun	3320	5	13.56	13.51	0.94	10.42	16.49
jul	2883	5	16.15	15.96	0.73	13.77	19.60
aug	1506	2	16.74	17.09	0.27	15.46	19.90
sep	2503	4	17.24	17.17	0.38	15.59	19.37
oct	2988	5	14.85	14.98	0.82	12.72	17.02
nov	2613	4	11.64	11.58	0.96	8.14	14.70
dec	2449	4	8.74	8.51	0.62	4.46	10.92

Tabel B.79: Månedlig statistik over temperaturdata fra station EMS i 10.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2982	5	6.08	6.23	0.47	3.09	7.69
feb	2487	4	5.42	5.88	0.26	2.95	7.59
mar	2292	4	5.75	5.70	0.29	4.11	6.78
apr	2166	3	7.05	7.05	0.51	5.62	9.85
maj	3178	5	9.72	9.70	1.20	6.76	12.92
jun	3311	5	13.37	13.40	0.96	10.20	16.51
jul	2866	5	15.94	15.67	0.65	13.78	19.45
aug	1498	2	16.63	17.04	0.26	15.21	19.82
sep	2524	4	17.19	17.14	0.38	15.55	19.34
oct	2986	5	14.82	14.96	0.83	12.71	17.02
nov	2608	4	11.67	11.52	0.91	8.71	14.64
dec	3021	5	8.59	8.53	0.72	6.65	10.87

Tabel B.80: Månedlig statistik over temperaturdata fra station EMS i 15.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2803	5	6.07	6.35	0.52	3.02	7.69
feb	1876	3	6.06	5.95	0.28	2.95	7.60
mar	2115	3	5.64	5.65	0.31	3.62	6.78
apr	2157	3	6.89	6.99	0.44	4.93	9.44
maj	3193	5	9.42	9.11	1.15	6.72	12.79
jun	2834	4	13.02	13.11	0.86	9.90	15.90
jul	2604	5	15.79	15.66	0.52	13.65	18.84
aug	1500	2	16.57	16.99	0.26	15.16	19.71
sep	2514	4	17.18	17.14	0.37	15.58	19.33
oct	2979	5	14.83	14.97	0.83	12.71	17.03
nov	2486	4	11.68	11.49	0.91	8.72	14.66
dec	2929	5	8.63	8.60	0.73	6.66	10.88

Tabel B.81: Månedlig statistik over temperaturdata fra station EMS i 20.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2790	5	6.17	6.39	0.47	3.13	7.87
feb	1908	3	4.89	5.23	0.21	2.95	6.73
mar	1707	3	5.52	5.57	0.32	3.92	6.21
apr	1568	2	6.76	6.74	0.39	5.58	9.11
maj	2691	4	9.20	8.93	1.15	6.74	12.74
jun	3306	5	13.01	13.14	0.99	9.83	15.67
jul	2867	5	15.67	15.52	0.52	13.78	17.84
aug	1482	2	16.53	16.95	0.25	15.15	19.59
sep	2482	4	17.18	17.13	0.37	15.60	19.30
oct	2976	5	14.83	14.98	0.83	12.71	17.03
nov	2594	4	11.69	11.54	0.90	8.74	14.65
dec	3001	5	8.66	8.64	0.73	6.67	10.88

Tabel B.82: Månedlig statistik over temperaturdata fra station EMS i 25.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2980	5	6.14	6.33	0.45	3.15	7.70
feb	2473	4	5.44	5.90	0.22	2.95	7.59
mar	2267	4	5.72	5.69	0.29	3.90	6.76
apr	1599	2	6.74	6.76	0.30	5.64	9.00
maj	2664	4	9.15	8.90	1.14	6.77	12.26
jun	3192	5	12.93	13.05	1.02	9.79	15.57
jul	2871	5	15.64	15.51	0.52	13.78	17.47
aug	1501	2	16.51	16.96	0.28	15.12	19.18
sep	2483	4	17.18	17.14	0.37	15.60	19.28
oct	2971	5	14.84	15.00	0.83	12.72	17.04
nov	2599	4	11.72	11.53	0.90	8.77	14.65
dec	3013	5	8.60	8.66	0.80	5.36	10.87

Tabel B.83: Månedlig statistik over temperaturdata fra station EMS i 30.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2696	5	6.15	6.47	0.43	3.19	7.80
feb	2216	4	5.46	5.89	0.22	2.88	7.72
mar	1860	4	5.67	5.67	0.25	4.10	6.81
apr	1456	2	7.31	7.29	0.40	5.91	9.00
maj	2644	4	9.35	9.09	0.96	6.96	12.45
jun	3316	5	12.92	13.10	0.99	9.76	15.57
jul	2870	5	15.62	15.50	0.51	13.78	17.46
aug	1500	2	16.49	16.96	0.27	15.12	19.19
sep	2491	4	17.17	17.13	0.37	15.60	19.26
oct	2971	5	14.84	14.99	0.83	12.71	17.03
nov	2548	4	11.73	11.52	0.90	8.78	14.65
dec	2989	5	8.69	8.66	0.71	6.68	10.88

Tabel B.84: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Farøi 2.8 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1441	2	3.19	3.00	0.49	1.66	4.43
feb	672	1	3.08	3.64	1.70	0.18	5.91
mar	744	1	3.80	3.85	0.55	2.45	5.51
apr	719	1	5.99	5.61	1.61	3.98	9.51
maj	744	1	11.27	10.93	1.34	8.97	14.27
jun	580	1	14.84	15.02	0.97	12.25	16.55
jul	696	1	15.84	15.73	0.61	14.84	17.56
aug	744	1	16.37	16.57	0.95	14.35	17.83
sep	720	1	14.74	14.74	0.51	13.61	15.86
oct	1353	2	11.11	10.96	1.65	7.78	14.32
nov	1430	2	6.99	7.29	1.13	4.01	9.00
dec	1463	2	3.18	3.24	0.77	1.36	5.32

Tabel B.85: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Farøi 5.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1438	2	3.16	2.99	0.50	1.57	4.49
feb	672	1	3.02	3.50	1.71	0.10	5.84
mar	744	1	3.75	3.81	0.55	2.45	5.46
apr	719	1	5.95	5.55	1.61	3.94	9.55
maj	743	1	11.19	10.75	1.35	8.97	13.62
jun	578	1	14.80	14.99	0.99	12.25	16.52
jul	695	1	15.84	15.74	0.61	14.80	17.43
aug	738	1	16.37	16.58	0.95	14.32	17.79
sep	713	1	14.73	14.72	0.51	13.60	15.81
oct	1350	2	11.11	10.96	1.64	7.77	14.22
nov	1429	2	6.98	7.28	1.13	4.14	8.97
dec	1461	2	3.15	3.21	0.75	1.36	5.23

Tabel B.86: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Farøi 8.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1432	2	3.20	3.00	0.50	1.65	4.72
feb	671	1	3.07	3.50	1.72	0.17	5.90
mar	744	1	3.82	3.86	0.54	2.63	5.41
apr	716	1	6.01	5.63	1.61	4.01	9.57
maj	742	1	11.19	10.75	1.37	9.03	13.57
jun	576	1	14.80	15.02	0.99	12.32	16.46
jul	690	1	15.85	15.75	0.61	14.83	17.39
aug	736	1	16.39	16.65	0.94	14.34	17.73
sep	711	1	14.72	14.71	0.52	13.55	15.86
oct	1347	2	11.15	10.99	1.64	7.80	14.19
nov	1427	2	7.02	7.30	1.13	4.22	8.98
dec	1456	2	3.20	3.27	0.75	1.35	5.29

Tabel B.87: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Farøi 11.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1426	2	3.21	3.05	0.51	1.68	4.83
feb	671	1	3.06	3.50	1.72	0.15	5.92
mar	744	1	3.83	3.90	0.53	2.73	5.28
apr	715	1	5.99	5.54	1.61	3.94	9.56
maj	742	1	11.15	10.68	1.40	8.92	13.59
jun	573	1	14.79	15.02	1.03	12.25	16.49
jul	686	1	15.89	15.77	0.62	14.87	17.38
aug	733	1	16.43	16.66	0.95	14.35	17.75
sep	706	1	14.75	14.74	0.52	13.61	15.87
oct	1340	2	11.14	11.02	1.64	7.77	14.20
nov	1422	2	6.99	7.30	1.12	4.19	8.99
dec	1449	2	3.21	3.30	0.73	1.33	5.23

Tabel B.88: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Farøi 14.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1422	2	2.87	2.73	0.52	1.35	4.65
feb	670	1	2.70	2.98	1.74	-0.22	5.59
mar	742	1	3.48	3.47	0.52	2.49	4.92
apr	713	1	5.64	5.21	1.61	3.62	9.23
maj	739	1	10.75	10.31	1.43	8.32	13.20
jun	572	1	14.41	14.64	1.05	11.74	16.22
jul	682	1	15.55	15.43	0.61	14.47	16.96
aug	728	1	16.08	16.27	0.93	14.00	17.40
sep	702	1	14.39	14.40	0.52	13.27	15.50
oct	1335	2	10.80	10.66	1.63	7.38	13.81
nov	1417	2	6.64	6.97	1.12	3.82	8.61
dec	1448	2	2.87	2.93	0.73	1.01	4.95

Tabel B.89: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Farøi 21.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	798	1	3.84	3.91	0.41	1.65	5.05
feb	665	1	3.08	3.31	1.75	0.15	5.91
mar	738	1	3.87	3.91	0.51	2.96	5.24
apr	710	1	6.01	5.62	1.59	3.96	9.62
maj	736	1	11.01	10.59	1.50	8.41	13.46
jun	570	1	14.72	15.00	1.15	11.97	17.21
jul	679	1	15.97	15.85	0.60	14.90	17.30
aug	727	1	16.49	16.66	0.91	14.43	17.71
sep	700	1	14.78	14.80	0.51	13.67	15.85
oct	1325	2	11.16	11.10	1.64	6.96	14.19
nov	1410	2	7.02	7.34	1.10	3.62	9.05
dec	1437	2	3.33	3.34	0.74	1.46	5.39

Tabel B.90: Månedlig statistik over temperaturdata fra station "Early"Flinten i 1.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	744	1	3.84	3.90	0.60	2.13	5.53
feb	672	1	2.68	2.80	0.35	1.60	3.10
mar	744	1	2.68	2.43	0.61	1.80	3.90
apr	945	2	5.00	5.10	0.46	3.20	6.90
maj	739	1	9.16	9.00	1.60	6.40	13.10
jun	1344	2	15.23	15.00	0.97	10.67	19.80
jul	1484	2	16.72	16.23	0.81	13.30	20.37
aug	1486	2	16.55	16.40	0.61	13.90	19.57
sep	1417	2	14.26	15.10	0.76	11.17	17.30
oct	519	1	12.41	12.50	1.59	9.83	15.10
nov	251	0	-	6.67	0.40	6.00	7.57
dec	743	1	5.71	5.83	0.77	3.73	7.30

Tabel B.91: Månedlig statistik over temperaturdata fra station "Early"Flinten i 7.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	-	-	-	-	-	-	-
feb	-	-	-	-	-	-	-
mar	-	-	-	-	-	-	-
apr	-	-	-	-	-	-	-
maj	-	-	-	-	-	-	-
jun	-	-	-	-	-	-	-
jul	370	1	14.34	14.40	0.50	13.33	15.50
aug	739	1	14.99	15.00	0.49	13.93	16.03
sep	697	1	12.81	12.40	0.88	11.20	14.63
oct	-	-	-	-	-	-	-
nov	-	-	-	-	-	-	-
dec	-	-	-	-	-	-	-

Tabel B.92: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Flinten i 3.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	4581	6	2.73	2.87	0.65	-0.24	6.46
feb	4494	7	2.17	2.40	0.77	-0.58	6.02
mar	4570	6	2.77	3.09	0.47	-0.42	5.13
apr	4030	6	4.87	4.89	1.01	0.89	9.25
maj	4606	6	8.67	8.55	1.21	5.23	13.04
jun	4058	7	13.18	13.24	1.29	8.86	17.49
jul	3782	6	16.36	16.25	1.12	11.31	22.77
aug	3587	5	18.79	18.77	1.07	13.98	23.34
sep	4081	6	15.73	15.46	1.50	10.40	21.57
oct	3796	6	11.49	11.80	0.77	7.99	15.04
nov	4102	6	7.99	8.21	1.41	3.17	12.13
dec	4382	6	4.94	4.87	1.23	0.92	10.06

Tabel B.93: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Flinten i 4.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	4583	6	2.98	3.04	0.83	-0.11	6.88
feb	4446	7	2.33	2.54	0.85	-0.59	7.34
mar	4544	6	2.87	3.12	0.51	-0.32	5.23
apr	4027	6	4.86	4.89	0.92	1.31	9.24
maj	4662	6	8.54	8.45	1.14	4.89	12.89
jun	4058	7	13.12	13.11	1.27	8.79	17.23
jul	3892	6	16.24	16.33	1.10	11.23	22.33
aug	3603	5	18.58	18.47	1.11	12.51	23.12
sep	3795	6	15.34	15.18	1.67	9.48	21.42
oct	4011	6	11.36	11.66	0.81	8.04	14.87
nov	4211	6	8.13	8.28	1.41	3.29	12.11
dec	4383	6	5.17	5.19	1.22	1.24	10.86

Tabel B.94: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Flinten i 6.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	4583	6	3.18	3.16	1.01	-0.03	7.56
feb	4455	7	2.35	2.56	0.88	-0.62	7.38
mar	4560	6	2.86	3.10	0.55	-0.41	5.21
apr	4029	6	4.75	4.71	0.85	1.31	8.52
maj	4662	6	8.39	8.29	1.13	4.74	12.83
jun	4060	7	13.00	12.98	1.30	8.61	17.17
jul	3752	5	15.87	15.97	1.08	11.24	21.38
aug	3602	5	18.28	18.13	1.11	12.19	22.67
sep	3831	6	15.15	15.04	1.66	9.30	21.36
oct	4083	7	11.67	11.63	0.83	8.00	14.81
nov	4209	6	8.19	8.30	1.38	3.25	12.04
dec	4382	6	5.26	5.38	1.24	1.96	11.12

Tabel B.95: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Flinten i 7.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	4579	6	3.40	3.25	1.12	0.01	7.73
feb	4441	7	2.44	2.67	0.89	-0.60	7.36
mar	4560	6	2.95	3.16	0.59	-0.34	5.27
apr	3927	6	4.78	4.80	0.82	1.42	8.52
maj	4662	6	8.36	8.26	1.13	4.75	12.91
jun	4054	7	12.92	12.93	1.31	7.75	17.13
jul	3891	6	16.06	15.92	1.11	11.24	21.38
aug	3537	5	18.16	18.02	1.12	12.14	22.68
sep	3835	6	15.03	15.00	1.66	9.32	21.36
oct	4089	7	11.68	11.61	0.82	8.26	14.80
nov	4211	6	8.30	8.41	1.34	3.29	12.06
dec	4383	6	5.39	5.52	1.26	2.01	11.13

Tabel B.96: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Flinten i 9.1 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	4583	6	3.41	3.22	1.14	-0.06	7.68
feb	4423	7	2.42	2.62	0.90	-0.62	7.49
mar	4539	6	2.95	3.14	0.57	-0.39	5.29
apr	4016	6	4.77	4.71	0.80	1.42	8.58
maj	3921	5	8.25	8.13	1.13	4.76	12.87
jun	3632	6	12.93	13.02	1.23	8.70	17.16
jul	3872	6	16.00	15.86	1.11	11.28	21.29
aug	3635	5	18.06	17.92	1.17	12.09	22.67
sep	4047	6	15.16	15.04	1.66	9.23	21.35
oct	4086	7	11.66	11.59	0.82	8.44	14.81
nov	4211	6	8.29	8.42	1.34	3.21	12.04
dec	4383	6	5.39	5.51	1.27	1.95	11.14

Tabel B.97: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Gamle Bro i 5.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3048	4	2.84	2.95	0.84	0.20	5.62
feb	3367	5	2.91	3.02	0.51	-0.08	5.69
mar	3372	5	3.03	3.42	0.66	0.16	5.46
apr	2464	3	6.09	6.05	0.87	2.71	10.15
maj	3493	5	10.46	10.52	1.57	6.68	15.09
jun	2666	4	12.74	12.61	1.53	7.95	16.29
jul	2789	4	16.28	16.12	1.47	10.47	21.25
aug	2938	4	17.49	16.88	1.34	13.56	22.53
sep	2865	4	15.83	15.82	0.88	13.43	18.55
oct	2965	4	12.55	12.62	1.12	8.58	14.84
nov	3119	4	8.72	8.29	0.85	5.63	11.93
dec	3700	5	5.56	5.77	1.25	1.81	8.71

Tabel B.98: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Gamle Bro i 10.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3049	4	2.89	2.96	0.84	0.28	5.67
feb	3375	5	2.94	3.02	0.52	0.03	5.71
mar	3379	5	3.04	3.41	0.66	0.21	5.43
apr	2466	3	6.06	6.02	0.86	2.75	10.10
maj	3492	5	9.94	10.00	1.45	6.17	14.77
jun	2666	4	12.01	11.91	1.35	7.58	16.14
jul	2792	4	15.78	15.84	1.52	9.97	21.14
aug	2939	4	17.30	16.77	1.33	13.54	22.50
sep	2869	4	15.77	15.79	0.90	13.15	18.51
oct	2968	4	12.56	12.66	1.11	8.59	15.24
nov	2939	4	8.75	8.44	0.91	6.31	11.96
dec	3704	5	5.58	5.81	1.25	1.83	8.73

Tabel B.99: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Gamle Bro i 15.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3052	4	2.96	2.96	0.85	0.45	5.69
feb	3371	5	2.98	3.05	0.52	0.10	5.71
mar	3374	5	3.09	3.42	0.67	0.33	5.38
apr	2467	3	5.98	5.97	0.83	2.73	10.02
maj	3443	5	9.28	9.38	1.48	5.36	13.56
jun	2667	4	11.09	11.11	1.66	6.61	15.65
jul	2789	4	15.22	15.33	1.59	8.02	20.74
aug	2940	4	17.02	16.68	1.34	12.87	22.56
sep	2866	4	15.70	15.71	0.93	12.96	18.40
oct	2967	4	12.61	12.76	1.10	8.73	14.93
nov	3123	4	8.81	8.42	0.87	5.47	11.98
dec	3704	5	5.64	5.79	1.24	1.97	8.73

Tabel B.100: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Gamle Bro i 20.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3053	4	2.92	2.96	0.85	0.39	5.75
feb	3373	5	2.96	3.06	0.52	0.13	5.71
mar	3380	5	3.07	3.43	0.67	0.21	5.28
apr	2468	3	5.94	5.89	0.80	2.74	10.00
maj	3459	5	8.76	8.73	1.47	5.34	13.34
jun	2551	4	10.39	10.34	1.58	6.42	15.48
jul	2562	4	14.96	15.17	1.50	8.82	20.49
aug	2618	4	16.79	16.60	1.31	12.15	22.23
sep	2604	4	15.70	15.70	0.87	13.21	18.24
oct	2074	3	12.39	12.67	1.20	8.61	14.78
nov	2434	3	8.60	8.18	0.82	5.57	11.98
dec	3310	5	5.41	5.54	1.18	1.85	8.20

Tabel B.101: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Gamle Bro i 22.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3056	4	2.87	2.94	0.86	-0.08	5.71
feb	3376	5	2.92	3.06	0.53	-0.39	5.68
mar	3385	5	3.03	3.42	0.68	-0.40	5.21
apr	2468	3	5.92	5.85	0.79	2.74	10.09
maj	2841	4	8.44	8.17	1.50	5.25	13.32
jun	1949	3	10.65	10.74	1.58	7.10	15.46
jul	1650	2	15.93	15.66	1.66	6.53	20.30
aug	1459	2	17.02	16.52	1.16	14.54	22.17
sep	1460	2	15.81	15.79	0.48	14.05	17.17
oct	2423	4	12.68	12.75	0.95	8.11	15.51
nov	1723	2	8.40	8.06	0.67	5.35	10.49
dec	2965	5	5.18	5.37	1.07	1.32	8.22

Tabel B.102: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Hjelm Bugt i 6.7 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2905	4	3.02	2.73	0.53	0.84	5.60
feb	2680	4	2.37	2.36	0.30	0.65	4.74
mar	2919	4	2.72	2.79	0.58	0.69	4.88
apr	2345	3	4.79	4.59	0.83	2.67	8.00
maj	2194	3	9.20	9.09	1.76	5.86	14.56
jun	2116	3	14.16	14.18	1.38	9.94	17.47
jul	2225	3	16.93	16.58	1.42	11.55	21.60
aug	2132	3	18.47	18.62	1.80	12.25	22.05
sep	2115	3	16.30	15.77	1.17	12.25	20.32
oct	2174	3	12.53	12.76	1.41	9.12	16.39
nov	1838	3	8.67	8.45	0.92	7.02	12.23
dec	2468	3	5.37	5.57	1.20	2.35	8.43

Tabel B.103: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Hjelm Bugt i 10.2 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2901	4	2.98	2.72	0.55	0.11	5.55
feb	2679	4	2.36	2.51	0.35	0.52	4.96
mar	2919	4	2.67	2.80	0.58	0.63	4.59
apr	2344	3	4.62	4.49	0.74	2.54	8.64
maj	2194	3	8.82	8.58	1.51	5.71	14.73
jun	2113	3	13.61	13.66	1.70	8.37	17.47
jul	2225	3	15.25	15.51	1.32	9.45	18.51
aug	2108	3	17.33	17.84	2.12	9.51	21.56
sep	2115	3	16.06	15.68	1.23	11.97	20.70
oct	2174	3	12.60	12.77	1.48	8.88	16.22
nov	1838	3	8.79	8.53	1.02	7.01	12.64
dec	2467	3	5.44	5.65	1.25	2.33	8.47

Tabel B.104: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Hjelm Bugt i 15.4 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2905	4	3.14	2.84	0.62	0.06	7.20
feb	2680	4	2.59	2.77	0.56	0.51	6.36
mar	2919	4	2.68	2.71	0.56	0.62	4.84
apr	2344	3	4.51	4.45	0.67	2.42	7.96
maj	2194	3	8.13	7.94	1.39	4.59	12.78
jun	2116	3	12.02	12.24	2.08	6.83	17.42
jul	2225	3	12.83	13.01	1.56	7.55	17.77
aug	2132	3	14.96	14.59	2.17	8.12	20.29
sep	2115	3	15.43	15.37	1.65	8.90	20.69
oct	2174	3	12.89	12.95	1.48	8.92	16.60
nov	1838	3	9.23	8.96	1.11	7.04	12.86
dec	2468	3	5.84	5.98	1.19	2.30	8.83

Tabel B.105: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Hjelm Bugt i 21.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2905	4	3.91	3.67	0.79	0.51	7.98
feb	2680	4	3.57	3.39	0.62	0.82	6.95
mar	2919	4	3.07	3.15	0.41	0.90	4.28
apr	2344	3	4.09	4.20	0.37	2.45	4.93
maj	2173	3	5.30	5.25	0.57	4.31	8.62
jun	2116	3	7.79	7.53	1.27	5.59	13.27
jul	2214	3	11.15	10.85	1.14	8.20	15.45
aug	2132	3	11.69	11.34	0.89	9.72	17.70
sep	2115	3	13.54	13.81	0.81	9.04	18.12
oct	2184	3	13.46	13.30	0.84	10.16	15.43
nov	1838	3	9.86	9.63	1.41	6.78	12.97
dec	2468	3	6.59	6.53	0.98	3.08	9.85

Tabel B.106: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Kiel i 0.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3931	6	3.05	3.36	0.49	-0.56	5.18
feb	3828	6	3.09	2.99	0.49	-0.08	5.12
mar	3686	6	3.93	4.09	0.40	2.53	5.87
apr	3935	6	6.08	5.99	1.05	3.21	10.60
maj	4039	6	10.94	10.57	1.67	6.56	15.39
jun	3403	5	14.79	14.94	1.22	11.34	18.32
jul	3496	5	17.45	17.52	0.97	13.76	22.10
aug	3124	5	18.59	17.88	0.83	15.64	22.92
sep	2458	4	16.08	15.96	1.24	13.39	21.47
oct	2592	4	12.05	12.34	0.86	8.46	14.31
nov	3301	5	8.47	8.47	1.27	4.43	12.35
dec	3511	5	4.98	4.67	1.03	1.62	8.55

Tabel B.107: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Kiel i 1.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3935	6	3.11	3.40	0.49	-0.52	5.37
feb	3834	6	3.13	3.05	0.49	0.03	5.13
mar	3693	6	3.97	4.13	0.39	2.55	5.85
apr	3938	6	6.11	6.02	1.05	3.28	10.81
maj	4044	6	11.03	10.60	1.66	6.61	19.40
jun	3397	5	14.80	14.97	1.22	11.37	18.37
jul	3496	5	17.47	17.54	0.97	13.88	22.10
aug	3123	5	18.62	17.92	0.83	15.66	22.91
sep	2458	4	16.11	15.98	1.24	13.42	21.49
oct	2588	4	12.10	12.41	0.85	8.48	14.31
nov	3298	5	8.52	8.52	1.27	4.52	12.40
dec	3512	5	5.04	4.70	1.02	1.67	8.67

Tabel B.108: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Kiel i 2.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3244	5	3.54	3.56	0.50	1.29	5.20
feb	3177	5	3.38	3.37	0.40	1.99	5.14
mar	2986	5	3.92	4.17	0.40	2.54	5.74
apr	3222	5	6.12	6.02	1.09	3.18	10.33
maj	3297	5	11.23	11.23	1.78	6.58	15.31
jun	2705	4	14.77	14.88	1.23	11.07	18.32
jul	3495	5	17.43	17.49	0.95	13.86	21.83
aug	3124	5	18.60	17.89	0.83	15.66	22.93
sep	2461	4	16.11	15.97	1.23	13.43	21.48
oct	2585	4	12.09	12.38	0.85	8.49	14.32
nov	3301	5	8.52	8.50	1.27	4.52	12.41
dec	3514	5	5.01	4.68	1.03	1.69	8.57

Tabel B.109: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Kiel i 4.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2929	6	3.11	3.36	0.44	0.22	5.00
feb	3237	5	2.85	2.92	0.47	0.27	5.13
mar	3229	6	3.92	4.05	0.36	2.53	5.42
apr	3651	6	6.01	5.99	1.01	3.18	10.14
maj	3697	6	10.67	10.36	1.59	6.57	15.11
jun	2813	4	14.75	14.99	1.33	10.57	18.22
jul	3440	5	17.26	17.20	0.97	13.87	21.67
aug	3106	5	18.51	17.77	0.84	15.66	22.92
sep	2449	4	16.12	15.97	1.21	13.49	21.36
oct	2566	4	12.16	12.43	0.87	8.73	14.34
nov	2546	5	8.77	8.47	1.20	4.56	12.42
dec	2683	5	4.79	4.45	0.95	1.80	8.39

Tabel B.110: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Kiel i 8.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3932	6	3.24	3.45	0.46	0.41	5.28
feb	3837	6	3.16	3.08	0.48	0.50	5.16
mar	3703	6	3.89	4.10	0.28	2.56	5.29
apr	3942	6	5.64	5.63	0.96	3.09	9.93
maj	4045	6	10.08	9.87	1.69	6.09	14.55
jun	3412	5	13.74	14.25	1.61	7.50	17.34
jul	3482	5	15.98	15.95	1.53	9.49	20.31
aug	3120	5	17.26	17.08	1.29	9.79	21.98
sep	2462	4	15.93	15.59	1.04	13.49	21.04
oct	2581	4	12.23	12.54	0.84	9.07	14.39
nov	3257	5	8.73	8.64	1.27	4.64	12.45
dec	3502	5	5.21	4.97	1.10	2.06	8.76

Tabel B.111: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Kiel i 13.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3238	5	3.46	3.61	0.55	0.90	6.06
feb	3176	5	3.02	3.05	0.43	1.25	5.24
mar	2986	5	3.33	3.39	0.26	1.43	4.92
apr	3218	5	4.49	4.59	0.55	1.75	7.01
maj	3303	5	7.57	7.37	1.46	3.67	12.88
jun	2698	4	9.84	9.68	1.33	7.30	14.71
jul	3486	5	12.19	11.84	1.44	7.76	18.98
aug	3122	5	13.58	14.09	1.17	8.89	18.66
sep	2458	4	14.94	14.76	0.96	11.53	17.57
oct	2581	4	12.43	12.58	0.85	9.18	14.50
nov	3330	5	9.09	9.11	1.27	5.33	12.11
dec	3510	5	5.34	5.22	1.29	1.34	9.18

Tabel B.112: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Læsø Rende i 6.2 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	660	1	3.12	3.38	1.03	0.01	7.73
feb	1299	2	3.67	3.98	0.83	0.73	6.34
mar	1397	2	3.44	3.79	0.50	0.70	4.85
apr	2118	3	5.50	5.30	0.85	3.68	8.63
maj	2212	3	9.73	9.87	1.87	4.93	14.96
jun	1420	2	12.92	12.48	0.98	8.76	17.71
jul	1338	2	15.79	15.80	1.49	10.72	19.29
aug	1298	2	16.79	16.85	0.69	13.63	18.90
sep	1382	2	14.96	14.96	0.89	13.21	17.31
oct	1091	2	13.12	13.17	0.62	11.54	14.36
nov	712	1	9.54	9.80	1.94	5.68	12.63
dec	743	1	5.05	5.19	1.41	1.23	8.23

Tabel B.113: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Læsø Rende i 10.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	662	1	5.28	5.32	0.54	1.08	8.24
feb	1297	2	4.60	4.71	1.00	0.94	6.63
mar	1397	2	4.22	4.26	0.49	1.47	5.61
apr	2118	3	5.14	5.13	0.39	3.88	7.83
maj	2216	3	7.19	6.83	1.71	4.64	12.45
jun	1420	2	11.58	11.54	0.63	9.19	14.96
jul	1327	2	12.86	12.93	1.30	10.41	18.13
aug	1296	2	15.52	15.82	0.95	12.02	18.13
sep	1382	2	14.76	14.77	0.78	12.21	17.08
oct	1091	2	13.01	12.88	0.56	10.53	14.13
nov	712	1	9.70	9.84	1.84	5.70	12.71
dec	743	1	5.97	6.19	1.76	1.25	8.55

Tabel B.114: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Læsø Rende i 15.8 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	680	1	5.70	5.84	0.52	3.38	8.24
feb	1299	2	4.95	5.02	0.89	1.32	6.61
mar	1397	2	4.62	4.67	0.34	3.24	5.61
apr	2118	3	5.07	5.16	0.26	3.91	5.89
maj	2216	3	6.64	6.31	1.47	4.62	11.62
jun	1420	2	10.60	10.58	0.44	8.54	12.30
jul	1340	2	11.99	12.09	0.83	10.29	14.98
aug	1298	2	15.01	15.41	0.91	11.77	17.24
sep	1382	2	14.46	14.45	0.69	12.11	16.52
oct	1091	2	12.88	12.65	0.54	10.14	13.96
nov	712	1	9.72	9.77	1.78	5.67	12.81
dec	743	1	7.00	7.72	1.77	1.65	8.54

Tabel B.115: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Læsø Rende i 21.1 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	664	1	5.85	6.01	0.53	3.38	8.27
feb	1299	2	5.10	5.13	0.85	1.31	6.64
mar	1362	2	4.72	4.80	0.41	3.54	5.68
apr	1405	2	5.01	4.74	0.18	3.88	5.88
maj	1480	2	6.23	6.30	1.17	4.61	11.20
jun	707	1	10.05	10.29	0.36	8.34	11.80
jul	595	1	11.58	11.51	1.07	10.21	14.96
aug	744	1	15.81	15.79	0.57	13.96	16.91
sep	680	1	15.21	15.21	0.76	13.11	16.38
oct	1091	2	12.86	12.80	0.57	10.09	14.02
nov	712	1	9.77	9.74	1.77	5.69	12.88
dec	743	1	7.45	8.05	1.43	1.99	8.73

Tabel B.116: Månedlig statistik over temperaturdata fra station "Early"Ndr. Røse i 2.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	743	1	3.40	3.70	0.84	1.07	4.77
feb	753	1	2.44	2.63	0.30	1.00	3.53
mar	1484	2	3.33	3.70	0.61	1.20	5.13
apr	1216	2	5.14	5.13	0.78	3.20	7.87
maj	744	1	10.00	9.57	2.04	6.70	14.50
jun	1365	2	15.60	15.57	0.93	11.97	19.80
jul	1481	2	16.90	16.57	0.94	13.20	21.60
aug	1482	2	16.58	16.62	0.59	13.70	19.90
sep	1429	2	14.13	14.70	0.83	10.70	17.50
oct	1276	2	10.34	10.23	1.69	7.17	14.90
nov	1176	2	7.49	7.45	0.79	5.63	10.73
dec	739	1	5.34	5.63	1.42	1.20	7.97

Tabel B.117: Månedlig statistik over temperaturdata fra station "Early"Ndr. Røse i 7.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	-	-	-	-	-	-	-
feb	202	0	-	3.00	0.53	1.77	3.50
mar	1189	2	3.41	3.70	0.51	1.40	4.73
apr	1216	2	4.78	4.70	0.67	3.07	7.13
maj	349	0	-	7.50	0.92	6.00	13.70
jun	645	1	13.93	14.50	1.22	10.73	16.50
jul	737	1	15.01	14.93	0.63	13.70	17.60
aug	740	1	14.99	15.00	0.42	13.67	16.27
sep	709	1	12.39	12.33	0.99	10.30	14.60
oct	-	-	-	-	-	-	-
nov	-	-	-	-	-	-	-
dec	-	-	-	-	-	-	-

Tabel B.118: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Ndr. Røse i 2.9 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	5109	7	2.85	3.09	0.84	-0.64	6.33
feb	4095	6	2.47	2.59	0.73	-0.21	5.22
mar	4800	7	2.75	3.11	0.58	-0.67	5.10
apr	4343	7	5.17	5.10	1.19	1.42	9.79
maj	4604	7	9.90	9.82	1.23	6.21	15.06
jun	4566	6	13.69	13.69	1.24	8.90	17.61
jul	4195	6	16.85	17.04	0.98	11.33	22.24
aug	3236	5	18.55	19.05	1.00	14.18	23.21
sep	3535	5	15.88	15.48	1.23	11.30	21.05
oct	5137	7	11.61	11.58	1.23	7.38	15.48
nov	4905	7	7.77	7.91	1.35	2.48	11.16
dec	4617	7	4.54	4.38	1.07	0.28	9.95

Tabel B.119: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Ndr. Røse i 4.4 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	5107	7	3.04	3.10	0.91	-0.16	8.26
feb	4095	6	2.49	2.60	0.75	0.16	5.27
mar	4800	7	2.82	3.14	0.60	-0.23	5.07
apr	4343	7	5.16	5.07	1.15	1.80	9.62
maj	4603	7	9.86	9.82	1.21	6.46	14.96
jun	4221	6	13.59	13.55	1.17	8.69	17.52
jul	3878	6	16.94	17.33	0.89	11.48	21.71
aug	3236	5	18.45	18.95	1.02	14.16	23.01
sep	3540	5	15.86	15.46	1.21	11.28	21.17
oct	5132	7	11.65	11.60	1.20	7.62	15.43
nov	4904	7	7.90	8.04	1.33	2.50	11.25
dec	4613	7	4.74	4.61	1.11	0.62	10.20

Tabel B.120: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Ndr. Røse i 5.9 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	5110	7	3.20	3.06	1.14	-0.44	8.73
feb	4095	6	2.43	2.60	0.65	-0.12	6.12
mar	4800	7	2.77	3.05	0.65	-0.50	5.11
apr	4343	7	4.96	4.92	1.05	1.56	9.63
maj	4604	7	9.46	9.48	1.21	6.19	13.84
jun	4566	6	13.41	13.31	1.29	7.61	17.30
jul	4191	6	16.58	16.68	0.88	11.33	20.46
aug	3234	5	18.08	18.48	1.05	13.54	22.40
sep	3538	5	15.49	15.23	1.18	10.66	20.33
oct	5138	7	11.50	11.48	1.14	7.49	15.31
nov	4904	7	7.94	7.97	1.31	2.31	11.61
dec	4616	7	4.93	4.72	1.22	0.23	10.92

Tabel B.121: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Ndr. Røse i 7.4 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	5110	7	3.64	3.41	1.35	-0.45	8.78
feb	4095	6	2.58	2.69	0.64	0.16	6.93
mar	4800	7	2.92	3.21	0.72	-0.52	5.12
apr	4307	7	4.90	4.88	0.95	1.63	9.50
maj	4605	7	8.98	8.95	1.34	5.71	13.63
jun	4544	6	13.07	13.10	1.38	7.10	17.23
jul	4190	6	16.25	16.02	0.93	11.31	20.61
aug	3251	5	17.58	17.71	1.21	11.43	22.04
sep	3539	5	14.99	14.96	1.22	10.14	19.09
oct	5137	7	11.52	11.43	1.07	7.96	15.15
nov	4902	7	8.22	8.21	1.31	2.31	11.97
dec	4617	7	5.36	5.16	1.38	0.16	11.06

Tabel B.122: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Ndr. Røse i 9.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	5110	7	3.83	3.50	1.46	-0.61	9.02
feb	4095	6	2.53	2.60	0.66	-0.05	7.08
mar	4799	7	2.91	3.17	0.77	-0.71	5.20
apr	4343	7	4.79	4.80	0.91	1.46	9.58
maj	4603	7	8.51	8.40	1.36	5.62	13.62
jun	4550	6	12.67	12.86	1.57	6.96	16.79
jul	4017	6	15.75	15.46	1.08	9.98	19.63
aug	3235	5	17.06	16.95	1.31	10.69	21.88
sep	3540	5	14.55	14.62	1.29	9.95	17.99
oct	5137	7	11.45	11.31	1.04	7.75	14.96
nov	4905	7	8.33	8.30	1.36	2.27	12.16
dec	4617	7	5.51	5.22	1.45	0.00	11.41

Tabel B.123: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Ndr. Røse i 10.6 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	5132	7	4.43	4.06	1.54	-0.17	9.25
feb	4095	6	2.89	2.93	0.66	0.47	7.50
mar	4800	7	3.20	3.37	0.81	-0.43	5.32
apr	4676	7	4.98	4.96	0.87	2.18	9.59
maj	4899	7	8.00	7.84	1.30	5.47	13.32
jun	4381	7	11.88	12.21	2.01	6.22	16.35
jul	3463	5	14.73	14.80	1.13	9.20	18.97
aug	3473	5	16.19	16.20	1.56	9.95	21.20
sep	3669	5	14.05	14.35	1.38	9.29	17.84
oct	5093	7	11.55	11.44	0.95	8.23	15.08
nov	4900	7	8.79	8.70	1.37	3.38	12.66
dec	4617	7	6.13	5.95	1.49	0.93	11.78

Tabel B.124: Månedlig statistik over temperaturdata fra station North Sea i 3.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	829	1	7.40	7.31	0.16	5.13	8.09
feb	672	1	5.10	5.09	0.11	4.50	6.75
mar	795	1	5.11	5.19	0.28	4.21	6.70
apr	1258	2	6.81	6.49	0.57	5.51	9.55
maj	1008	2	9.36	9.86	1.49	6.74	12.31
jun	676	1	14.07	14.21	0.87	11.18	15.42
jul	1107	2	16.89	17.08	1.12	13.58	19.46
aug	707	1	18.15	17.77	0.70	16.80	19.59
sep	878	1	16.43	16.85	0.55	15.42	18.30
oct	681	1	15.11	15.16	0.24	14.35	15.50
nov	446	1	13.01	12.77	0.76	11.98	14.42
dec	416	1	9.29	9.39	0.62	6.86	10.33

Tabel B.125: Månedlig statistik over temperaturdata fra station North Sea i 12.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	894	1	7.41	7.30	0.13	5.14	8.10
feb	1156	2	5.83	5.35	0.11	4.52	6.87
mar	1339	2	5.71	5.57	0.23	4.22	6.84
apr	1949	3	6.92	6.98	0.52	5.53	9.28
maj	1846	3	9.25	9.69	1.01	6.75	12.14
jun	1331	2	13.17	13.64	1.10	9.23	15.17
jul	1443	2	16.40	16.64	1.23	13.60	18.60
aug	1434	2	18.43	18.12	0.86	16.74	21.77
sep	1586	2	16.91	16.93	0.73	15.42	19.63
oct	1373	2	14.91	15.15	0.63	12.68	16.08
nov	956	2	12.45	12.21	0.66	10.39	14.42
dec	420	1	9.29	9.39	0.62	6.86	10.32

Tabel B.126: Månedlig statistik over temperaturdata fra station North Sea i 15.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	898	1	7.41	7.31	0.13	5.16	8.09
feb	1156	2	5.83	5.36	0.11	4.53	6.86
mar	1095	2	5.68	6.16	0.23	4.23	6.77
apr	1371	2	7.17	7.12	0.56	6.25	9.13
maj	1439	2	9.47	9.57	0.90	7.49	12.10
jun	891	1	13.21	13.63	0.72	9.73	15.01
jul	1454	2	15.85	15.75	1.05	13.51	18.38
aug	1436	2	17.83	17.75	0.56	15.70	19.95
sep	1590	2	16.90	16.93	0.74	15.41	19.60
oct	1373	2	14.90	15.15	0.63	12.68	16.07
nov	953	2	12.45	12.20	0.66	10.38	14.41
dec	420	1	9.29	9.39	0.62	6.85	10.33

Tabel B.127: Månedlig statistik over temperaturdata fra station North Sea i 20.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	898	1	7.44	7.33	0.13	5.15	8.11
feb	1156	2	5.83	5.36	0.11	4.53	6.87
mar	1341	2	5.69	5.56	0.18	4.24	6.56
apr	1969	3	6.57	6.48	0.34	5.43	8.24
maj	1690	3	8.64	9.04	0.93	6.47	11.73
jun	1280	2	11.14	9.87	0.47	8.15	14.78
jul	1443	2	14.36	14.07	0.87	10.23	17.40
aug	1415	2	16.18	16.87	0.68	12.36	18.30
sep	1586	2	16.61	16.76	0.65	14.94	19.14
oct	1372	2	14.89	15.15	0.64	12.68	16.08
nov	958	2	12.45	12.20	0.65	10.38	14.39
dec	417	1	9.33	9.41	0.64	6.86	10.68

Tabel B.128: Månedlig statistik over temperaturdata fra station North Sea i 25.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	738	1	7.33	7.26	0.10	5.09	7.69
feb	1156	2	5.79	5.34	0.13	4.50	6.87
mar	1338	2	5.67	5.54	0.15	4.21	6.56
apr	1976	3	6.50	6.44	0.33	5.33	8.05
maj	1837	3	8.23	8.46	0.48	6.40	12.59
jun	1271	2	10.47	9.61	0.46	7.72	14.39
jul	1451	2	12.65	12.72	1.11	9.92	16.67
aug	1431	2	14.81	15.31	0.53	11.54	17.51
sep	1581	2	16.15	16.56	0.57	14.91	17.84
oct	947	2	14.69	14.81	0.60	12.68	16.08
nov	725	2	12.27	12.13	0.63	10.38	13.92
dec	-	-	-	-	-	-	-

Tabel B.129: Månedlig statistik over temperaturdata fra station North Sea i 30.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	893	1	7.43	7.32	0.13	5.14	8.09
feb	1156	2	5.82	5.34	0.11	4.52	6.86
mar	1330	2	5.68	5.54	0.15	4.32	6.56
apr	1971	3	6.48	6.42	0.31	5.39	7.89
maj	1843	3	8.09	8.36	0.34	6.42	12.58
jun	1265	2	10.25	9.60	0.32	7.76	12.50
jul	1455	2	12.34	12.48	0.97	9.89	16.41
aug	1429	2	14.30	14.48	0.77	11.32	17.53
sep	1585	2	16.28	16.41	0.52	14.91	17.68
oct	1373	2	14.89	15.17	0.62	12.67	16.01
nov	957	2	12.46	12.20	0.66	10.38	14.41
dec	413	1	9.36	9.35	0.69	6.86	10.51

Tabel B.130: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Oder i 3.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1819	3	2.33	2.35	0.47	0.82	3.57
feb	1761	3	2.04	2.08	0.53	0.48	3.74
mar	1631	3	3.27	3.56	0.51	1.87	6.83
apr	2217	3	6.31	6.29	1.14	2.86	12.14
maj	2671	4	11.99	11.95	1.68	7.40	17.25
jun	3152	5	15.77	15.82	1.12	11.97	19.52
jul	2919	4	18.17	18.51	0.94	14.10	22.27
aug	2186	3	20.32	20.09	0.80	16.68	23.96
sep	2529	5	16.55	16.58	1.37	13.18	21.69
oct	2255	4	11.29	11.65	1.47	6.48	14.82
nov	1813	4	7.36	7.45	1.31	1.82	9.95
dec	2196	4	3.99	3.91	1.08	0.61	6.86

Tabel B.131: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Oder i 12.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1840	3	3.86	2.78	0.36	1.05	7.24
feb	1750	3	3.88	2.88	0.45	0.50	7.43
mar	1633	3	4.69	3.61	0.34	2.82	7.34
apr	2207	3	5.67	5.69	0.81	2.93	8.48
maj	2656	4	10.00	10.03	1.72	5.25	14.31
jun	3187	5	14.41	14.82	1.48	10.09	17.50
jul	3105	5	17.03	16.76	0.96	13.85	20.94
aug	1996	3	18.67	18.51	0.57	15.96	20.85
sep	2750	5	16.08	15.97	1.41	11.89	20.15
oct	2767	5	11.58	11.93	1.20	8.16	14.90
nov	2201	4	7.72	7.69	1.34	3.46	11.43
dec	2295	4	4.03	3.91	0.97	1.10	6.89

Tabel B.132: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Østerrenden Nord i 3.3 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1488	2	2.11	2.07	0.82	-0.17	4.40
feb	1253	2	2.54	1.66	0.49	0.06	5.17
mar	1483	2	3.18	3.73	0.83	0.40	5.37
apr	1428	2	5.58	5.33	0.99	4.18	8.13
maj	1488	2	10.88	10.85	1.93	7.19	15.99
jun	1440	2	15.64	15.65	0.79	13.11	18.05
jul	1488	2	17.59	17.42	1.26	14.46	21.36
aug	1480	2	19.32	19.29	1.48	15.93	22.73
sep	1437	2	16.85	16.51	1.30	13.31	19.92
oct	1484	2	11.69	11.51	1.81	8.19	14.88
nov	1437	2	7.54	7.51	0.72	5.80	9.43
dec	1397	2	5.29	5.59	1.21	1.50	8.39

Tabel B.133: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Østerrenden Nord i 5.8 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1488	2	2.37	2.27	0.77	0.28	4.60
feb	1253	2	2.73	1.86	0.50	0.21	5.31
mar	1483	2	3.29	3.85	0.78	0.26	5.18
apr	1428	2	5.68	5.49	0.94	4.32	8.27
maj	1488	2	10.71	10.79	1.82	7.11	15.22
jun	1440	2	15.39	15.53	0.87	12.10	17.60
jul	1488	2	17.51	17.34	1.21	14.38	21.14
aug	1480	2	19.24	19.15	1.35	16.19	22.37
sep	1437	2	16.96	16.63	1.22	14.03	20.00
oct	1485	2	11.88	11.74	1.78	8.56	14.84
nov	1429	2	7.81	7.83	0.73	6.00	10.39
dec	1399	2	5.53	5.74	1.18	2.09	8.66

Tabel B.134: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Østerrenden Nord i 9.8 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1488	2	2.63	2.43	0.77	0.62	5.25
feb	1253	2	2.76	1.92	0.52	0.10	5.25
mar	1483	2	3.38	3.84	0.82	-0.01	4.79
apr	1428	2	5.48	5.42	0.75	4.30	7.65
maj	1488	2	9.35	9.29	1.69	5.80	14.53
jun	1440	2	13.00	13.51	2.18	7.36	17.01
jul	1488	2	16.76	16.75	1.16	13.50	20.28
aug	1480	2	18.22	18.29	1.26	14.76	21.80
sep	1437	2	16.55	16.46	1.05	14.28	19.62
oct	1485	2	11.90	11.70	1.74	8.69	14.73
nov	1432	2	7.99	8.05	0.82	5.90	10.60
dec	1402	2	5.63	5.69	1.14	2.35	9.05

Tabel B.135: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Østerrenden Nord i 14.9 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1488	2	3.47	3.33	0.96	1.34	6.42
feb	1253	2	3.26	2.81	0.55	0.57	5.44
mar	1483	2	4.07	4.17	0.65	0.69	5.31
apr	1428	2	5.25	5.17	0.45	4.51	7.57
maj	1488	2	6.44	6.26	0.78	5.12	9.99
jun	1440	2	8.62	7.79	2.18	5.90	16.13
jul	1488	2	13.88	13.82	2.11	7.26	19.09
aug	1459	2	15.70	15.53	1.73	11.53	20.38
sep	1377	2	15.39	15.26	0.82	12.12	18.31
oct	1482	2	12.23	12.04	1.58	9.17	14.94
nov	1394	2	8.97	8.91	1.03	6.00	11.86
dec	1399	2	6.31	6.30	1.38	2.34	10.90

Tabel B.136: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Romsø Tue Fyr i 7.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	728	1	4.58	4.60	0.74	3.26	5.96
feb	655	1	4.72	4.68	0.27	4.08	5.28
mar	682	1	5.23	5.18	0.47	4.69	6.29
apr	692	1	6.99	6.78	0.71	6.10	9.21
maj	835	1	11.18	11.82	1.35	8.18	14.00
jun	846	2	13.76	13.55	1.59	10.21	18.27
jul	1111	2	15.99	16.12	1.19	9.64	18.85
aug	1406	2	16.59	16.59	0.72	14.20	19.05
sep	1296	2	15.22	15.28	0.74	12.73	17.14
oct	998	2	12.59	12.56	0.53	11.54	14.79
nov	469	1	9.45	9.85	1.89	6.43	12.35
dec	635	1	5.34	4.74	0.81	4.12	6.72

Tabel B.137: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Romsø Tue Fyr i 10.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	728	1	4.86	4.95	0.65	3.49	6.37
feb	655	1	4.77	4.73	0.25	4.25	5.27
mar	682	1	5.27	5.22	0.45	4.75	6.25
apr	692	1	6.94	6.67	0.69	6.11	9.00
maj	836	1	9.88	9.74	1.51	7.22	13.27
jun	846	2	12.01	12.29	1.48	8.69	16.27
jul	1037	2	14.72	14.95	1.75	8.21	18.01
aug	1392	2	15.79	15.73	0.95	12.19	18.73
sep	1297	2	14.89	15.00	0.61	12.73	16.29
oct	999	2	12.58	12.50	0.52	11.17	14.82
nov	476	1	9.60	10.17	1.83	6.48	11.67
dec	635	1	5.43	4.93	0.81	4.20	7.26

Tabel B.138: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Romsø Tue Fyr i 12.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	-	-	-	-	-	-	-
feb	128	0	-	5.10	0.12	4.85	5.26
mar	682	1	5.25	5.18	0.46	4.75	6.24
apr	692	1	6.88	6.63	0.65	6.13	8.60
maj	836	1	8.71	8.53	1.55	6.54	12.96
jun	846	2	10.35	10.39	1.15	7.57	14.54
jul	1090	2	13.10	13.27	2.15	8.04	17.38
aug	1394	2	14.81	14.91	1.14	11.01	18.54
sep	1297	2	14.63	14.70	0.57	12.91	16.08
oct	999	2	12.57	12.50	0.51	11.25	14.73
nov	476	1	9.69	10.39	1.82	6.50	11.63
dec	635	1	5.52	5.13	0.81	4.30	7.28

Tabel B.139: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Romsø Tue Fyr i 14.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	728	1	5.48	5.46	0.68	3.83	7.41
feb	655	1	4.82	4.81	0.20	4.31	5.22
mar	683	1	5.19	5.10	0.46	4.69	6.19
apr	692	1	6.76	6.53	0.61	6.08	8.51
maj	837	1	7.59	7.50	1.22	6.31	11.60
jun	847	2	8.89	8.64	0.83	7.28	12.97
jul	1058	2	11.60	10.48	2.06	7.82	17.22
aug	1407	2	13.77	13.72	1.23	10.68	17.34
sep	1297	2	14.30	14.34	0.53	12.69	15.98
oct	999	2	12.56	12.48	0.50	11.09	14.61
nov	476	1	9.81	10.53	1.84	6.22	11.66
dec	635	1	5.61	5.41	0.85	4.26	7.41

Tabel B.140: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Romsø Tue Fyr i 16.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	728	1	5.85	5.76	0.72	3.88	7.64
feb	655	1	4.95	4.94	0.17	4.48	5.28
mar	683	1	5.25	5.15	0.43	4.77	6.21
apr	692	1	6.73	6.52	0.60	5.92	8.60
maj	838	1	7.07	7.07	0.65	6.24	9.22
jun	847	2	8.06	7.96	0.48	7.23	10.60
jul	1038	2	10.44	9.39	1.76	7.80	15.16
aug	1394	2	12.84	12.73	1.11	10.34	16.99
sep	1297	2	14.01	14.00	0.49	12.49	15.29
oct	999	2	12.62	12.54	0.49	11.19	14.22
nov	476	1	10.01	10.74	1.79	6.37	11.71
dec	635	1	5.81	5.85	0.96	4.27	8.03

Tabel B.141: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Romsø Tue Fyr i 19.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	728	1	6.28	6.30	0.78	4.07	8.01
feb	655	1	4.97	4.97	0.16	4.56	5.27
mar	683	1	5.17	5.05	0.43	4.69	6.09
apr	692	1	6.56	6.45	0.52	5.80	8.26
maj	838	1	6.62	6.58	0.30	6.07	7.95
jun	847	2	7.42	7.38	0.30	6.79	8.80
jul	1110	2	9.47	8.83	1.52	7.53	15.02
aug	1409	2	11.76	11.75	0.73	9.74	16.05
sep	1297	2	13.54	13.49	0.55	12.18	14.93
oct	999	2	12.59	12.50	0.49	11.14	14.06
nov	474	1	10.15	10.95	1.74	6.84	11.72
dec	635	1	6.09	6.21	1.20	4.28	9.08

Tabel B.142: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Vesterrenden i 6.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3688	5	4.03	3.76	0.76	2.16	6.82
feb	2867	4	2.88	2.86	0.56	-0.03	5.14
mar	3653	5	3.41	3.58	0.70	0.55	6.15
apr	3485	5	5.78	5.93	0.85	3.48	9.08
maj	3618	5	9.93	9.97	1.25	6.32	14.16
jun	3836	6	13.72	13.50	1.28	8.19	18.73
jul	3056	4	15.91	15.89	1.03	10.06	20.75
aug	2920	4	16.84	16.48	0.64	14.35	21.73
sep	3890	6	14.93	14.94	0.91	12.27	17.91
oct	4396	6	11.61	11.79	1.16	8.27	14.73
nov	4150	6	8.23	8.33	1.12	3.60	11.71
dec	3627	5	5.27	5.37	0.63	3.27	7.93

Tabel B.143: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Vesterrenden i 9.6 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3689	5	4.17	3.91	0.76	2.29	7.61
feb	3190	5	2.79	2.86	0.48	0.14	5.17
mar	2909	4	3.70	3.95	0.64	1.17	6.08
apr	2821	4	5.85	6.05	0.77	3.54	8.97
maj	2788	4	9.23	9.32	1.21	5.31	15.22
jun	3178	5	12.57	12.33	1.41	6.41	17.31
jul	3153	5	14.65	14.78	1.40	8.16	18.66
aug	2769	4	15.66	15.65	0.59	11.72	18.79
sep	3172	5	14.90	14.91	0.77	12.31	17.46
oct	3653	5	11.93	11.96	1.15	8.55	14.89
nov	3439	5	8.45	8.51	1.27	3.86	11.72
dec	3604	5	5.42	5.49	0.79	3.25	8.47

Tabel B.144: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Vesterrenden i 11.6 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3689	5	4.29	4.05	0.75	2.28	7.73
feb	3190	5	2.86	2.92	0.50	0.12	5.12
mar	2909	4	3.79	4.06	0.67	1.24	6.41
apr	2819	4	5.79	5.91	0.69	3.59	8.81
maj	2885	4	8.55	8.43	1.33	4.76	16.11
jun	3102	5	11.03	11.21	1.53	6.21	16.39
jul	3150	5	13.46	13.88	1.78	7.97	18.35
aug	2603	4	14.85	15.08	0.77	10.45	18.30
sep	3191	5	14.70	14.66	0.74	12.43	17.64
oct	3553	5	11.95	11.98	1.03	8.75	14.79
nov	3439	5	8.70	8.73	1.30	4.64	11.70
dec	3601	5	5.58	5.63	0.86	3.41	8.50

Tabel B.145: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Vesterrenden i 13.6 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2957	4	4.17	3.85	0.62	1.86	8.01
feb	2540	4	2.44	2.76	0.58	-0.09	4.45
mar	2187	3	3.43	3.67	0.79	1.22	5.61
apr	2358	3	5.32	5.52	0.56	3.56	8.87
maj	2884	4	7.77	7.29	1.27	4.67	14.71
jun	3180	5	9.44	9.27	1.40	5.92	13.97
jul	3158	5	12.31	12.41	1.99	7.95	17.96
aug	2844	4	13.89	14.11	0.96	9.45	17.89
sep	3180	5	14.50	14.45	0.71	12.62	17.48
oct	3653	5	12.15	12.05	1.01	9.27	14.82
nov	3439	5	9.04	9.05	1.34	5.38	11.96
dec	3602	5	5.72	5.73	0.93	3.30	8.86

Tabel B.146: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Vesterrenden i 15.6 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	3689	5	4.49	4.19	0.78	1.94	8.10
feb	3190	5	2.96	2.88	0.51	-0.10	5.19
mar	2909	4	3.94	4.27	0.71	1.14	6.72
apr	2821	4	5.63	5.67	0.50	3.53	9.02
maj	2712	4	7.02	6.79	0.92	4.59	11.59
jun	3098	5	8.34	8.11	1.01	5.70	13.16
jul	3153	5	11.14	10.73	1.90	7.45	17.61
aug	2828	4	13.00	13.09	1.11	8.96	16.39
sep	3204	5	14.06	14.06	0.66	12.21	16.48
oct	3653	5	12.19	12.14	0.95	9.46	14.76
nov	3439	5	9.26	9.29	1.33	6.00	11.95
dec	3604	5	5.84	5.83	0.98	3.23	9.22

Tabel B.147: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Vesterrenden i 18.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	2951	4	4.74	4.64	0.81	2.34	8.11
feb	2998	5	2.92	2.97	0.46	0.17	5.17
mar	2909	4	3.73	3.86	0.63	0.72	6.69
apr	2804	4	5.23	4.90	0.42	3.60	8.47
maj	2911	4	5.88	5.60	0.39	4.62	8.94
jun	3842	6	7.44	7.41	0.86	5.16	11.89
jul	3664	6	9.84	9.47	1.54	6.89	16.41
aug	3500	5	12.14	12.11	1.19	8.72	17.12
sep	3902	6	13.43	13.39	0.64	11.23	15.66
oct	4396	6	12.06	12.05	0.90	8.85	14.27
nov	3940	6	9.45	9.37	1.18	6.79	12.03
dec	2886	4	5.97	5.88	0.86	3.24	9.38

Tabel B.148: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Østerrenden i 7.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1475	2	4.38	4.38	1.01	2.53	6.19
feb	403	1	4.61	4.51	0.24	1.73	5.11
mar	-	-	-	-	-	-	-
apr	-	-	-	-	-	-	-
maj	203	0	-	12.97	0.39	11.93	14.64
jun	1099	2	14.71	14.85	1.40	11.89	18.49
jul	1196	2	16.28	16.15	1.05	12.97	19.01
aug	1418	2	16.89	16.91	0.78	14.72	19.11
sep	1343	2	15.40	15.59	0.93	12.59	17.94
oct	1448	2	12.34	12.41	0.87	9.82	14.78
nov	1357	2	8.98	8.66	1.27	6.35	11.68
dec	1304	2	5.10	4.67	0.90	3.66	6.91

Tabel B.149: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Østerrenden i 10.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1475	2	4.47	4.41	1.00	2.64	6.37
feb	1005	2	2.90	1.85	0.44	0.28	5.06
mar	744	1	2.99	2.99	1.20	1.39	5.22
apr	720	1	6.37	6.59	0.66	4.81	7.90
maj	807	1	8.32	9.33	0.68	6.53	14.36
jun	1099	2	13.59	13.45	1.19	10.01	17.41
jul	1233	2	15.40	15.65	1.55	9.53	18.64
aug	1419	2	16.46	16.44	0.83	12.86	18.74
sep	1341	2	15.18	15.30	0.85	12.61	17.64
oct	1448	2	12.33	12.44	0.87	9.89	14.76
nov	1357	2	9.15	9.05	1.29	6.53	11.59
dec	1370	2	5.17	4.86	0.91	3.55	7.11

Tabel B.150: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Østerrenden i 12.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1475	2	4.55	4.58	1.00	2.53	6.92
feb	1005	2	2.95	1.89	0.43	0.32	5.07
mar	744	1	3.15	3.05	1.28	1.39	5.39
apr	720	1	6.33	6.58	0.65	4.91	7.72
maj	807	1	8.14	9.07	0.81	6.54	13.99
jun	1099	2	12.51	12.52	1.51	8.58	16.14
jul	1233	2	14.50	15.15	2.05	8.90	18.17
aug	1419	2	15.93	15.75	1.01	12.15	18.72
sep	1343	2	14.99	15.00	0.86	12.68	17.63
oct	1448	2	12.37	12.47	0.87	9.96	14.77
nov	1357	2	9.31	9.44	1.34	6.64	11.63
dec	1370	2	5.21	4.91	0.93	3.52	7.30

Tabel B.151: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Østerrenden i 14.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1475	2	4.65	4.79	1.02	2.51	7.09
feb	1004	2	3.03	1.93	0.44	0.25	5.09
mar	744	1	3.37	3.53	1.36	1.41	5.45
apr	720	1	6.29	6.54	0.61	5.02	7.28
maj	807	1	7.97	8.53	1.04	6.72	13.95
jun	1100	2	11.05	10.48	1.79	7.83	16.07
jul	1233	2	13.33	13.69	2.50	8.62	17.84
aug	1419	2	15.21	15.31	1.22	11.59	18.64
sep	1343	2	14.73	14.65	0.84	12.77	17.48
oct	1179	2	12.10	12.15	0.58	9.97	13.15
nov	1357	2	9.51	9.85	1.40	6.73	11.63
dec	1370	2	5.25	4.96	0.95	3.49	7.44

Tabel B.152: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Østerrenden i 16.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1475	2	4.73	4.93	1.02	2.50	7.25
feb	1005	2	3.08	2.01	0.46	0.33	4.98
mar	744	1	3.66	4.22	1.41	1.45	5.71
apr	720	1	6.27	6.28	0.60	5.14	7.29
maj	807	1	7.82	7.94	1.20	6.75	13.07
jun	1095	2	9.27	8.66	1.50	7.36	14.86
jul	1232	2	12.17	11.96	2.68	8.09	17.48
aug	1419	2	14.29	14.47	1.30	10.18	17.99
sep	1343	2	14.40	14.28	0.76	12.77	17.07
oct	1448	2	12.32	12.47	0.85	10.06	14.57
nov	1357	2	9.68	10.12	1.44	6.74	11.64
dec	1370	2	5.25	5.04	0.95	3.38	7.65

Tabel B.153: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Østerrenden i 19.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1475	2	4.97	5.29	1.04	2.33	7.64
feb	1004	2	3.13	2.02	0.48	0.12	5.06
mar	744	1	3.85	4.55	1.42	1.30	5.67
apr	720	1	6.10	5.92	0.54	5.12	7.02
maj	807	1	7.49	7.15	1.08	6.37	12.31
jun	1098	2	7.88	7.80	0.73	6.55	12.62
jul	1233	2	11.18	10.26	2.58	7.68	17.16
aug	1418	2	13.00	13.23	1.25	10.00	16.30
sep	1322	2	14.06	14.04	0.64	12.30	16.49
oct	1448	2	12.46	12.53	0.82	10.04	14.73
nov	1356	2	10.06	10.68	1.52	6.79	11.79
dec	1370	2	5.36	5.11	0.96	3.53	7.91

Tabel B.154: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Langelandsbælt i 7.6 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	523	1	4.88	5.16	0.55	3.50	5.57
feb	656	1	4.62	4.53	0.32	4.11	5.30
mar	561	1	5.33	5.22	0.49	4.64	6.32
apr	692	1	6.97	6.87	0.71	6.05	9.26
maj	901	1	10.83	11.21	1.32	8.19	14.44
jun	1084	2	14.10	13.99	1.63	10.86	18.53
jul	1014	2	15.82	15.69	1.24	11.27	19.41
aug	1257	2	16.54	16.54	0.71	15.06	19.84
sep	1321	2	15.36	15.46	0.85	12.81	17.84
oct	747	1	12.91	12.97	0.54	11.84	14.93
nov	383	1	9.72	10.34	1.68	6.49	11.85
dec	326	1	5.48	4.84	0.81	4.33	6.99

Tabel B.155: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Langelandsbælt i 10.6 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	523	1	4.72	4.98	0.53	3.35	5.38
feb	656	1	4.43	4.36	0.32	3.92	5.11
mar	561	1	5.15	5.03	0.49	4.48	6.06
apr	692	1	6.80	6.64	0.70	5.87	9.01
maj	901	1	10.07	10.20	1.37	7.60	13.46
jun	1084	2	12.57	12.32	1.35	8.95	17.35
jul	1014	2	14.74	14.40	1.81	9.16	20.09
aug	1258	2	16.03	15.93	0.77	13.00	19.40
sep	1321	2	15.14	15.20	0.79	12.80	17.46
oct	747	1	12.83	12.96	0.55	11.72	14.82
nov	387	1	9.66	10.26	1.70	6.56	11.66
dec	329	1	5.32	4.63	0.82	4.15	6.88

Tabel B.156: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Langelandsbælt i 12.6 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	523	1	4.87	5.13	0.51	3.53	5.51
feb	298	0	-	4.29	0.17	3.60	4.52
mar	107	0	-	5.91	0.09	5.79	6.17
apr	692	1	6.84	6.60	0.70	5.94	8.88
maj	901	1	9.57	9.39	1.41	7.18	12.99
jun	1081	2	11.34	11.19	1.14	8.32	16.22
jul	1013	2	13.76	13.06	2.12	8.21	18.30
aug	1212	2	15.55	15.52	0.80	12.35	18.38
sep	1320	2	14.94	15.04	0.73	12.73	17.07
oct	747	1	12.88	12.89	0.54	11.81	14.79
nov	387	1	9.81	10.37	1.69	6.84	11.75
dec	322	1	5.50	4.76	0.83	4.29	7.18

Tabel B.157: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Langelandsbælt i 14.6 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	523	1	4.97	5.21	0.49	3.76	5.65
feb	656	1	4.62	4.60	0.31	4.15	5.28
mar	561	1	5.32	5.23	0.47	4.67	6.21
apr	692	1	6.88	6.59	0.68	6.01	8.90
maj	901	1	8.88	8.55	1.43	6.42	12.33
jun	1078	2	9.92	9.65	0.99	7.75	13.42
jul	1016	2	12.70	11.96	2.52	7.95	16.82
aug	1257	2	14.88	15.09	0.94	11.44	17.43
sep	1320	2	14.72	14.77	0.64	12.88	16.75
oct	747	1	12.94	12.98	0.54	11.89	14.82
nov	391	1	9.81	10.53	1.72	6.90	11.79
dec	331	1	5.58	4.88	0.85	4.34	7.26

Tabel B.158: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Langelandsbælt i 16.6 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	523	1	5.11	5.31	0.44	3.92	6.14
feb	656	1	4.69	4.68	0.30	4.23	5.31
mar	561	1	5.38	5.30	0.47	4.72	6.21
apr	692	1	6.83	6.56	0.65	6.06	8.87
maj	901	1	8.13	7.91	0.97	6.15	12.18
jun	1080	2	8.74	8.56	0.80	7.23	12.38
jul	1016	2	11.79	10.80	2.54	7.75	16.36
aug	1258	2	14.09	14.17	1.20	10.27	16.65
sep	1317	2	14.40	14.40	0.62	12.22	16.30
oct	747	1	12.94	13.00	0.52	11.89	14.79
nov	391	1	10.09	10.82	1.73	6.95	11.79
dec	330	1	5.63	4.92	0.87	4.38	7.32

Tabel B.159: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Langelandsbælt i 19.6 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	521	1	4.52	4.48	0.47	2.77	6.78
feb	656	1	4.42	4.42	0.35	3.70	5.20
mar	561	1	5.27	5.27	0.47	4.60	6.12
apr	692	1	6.57	6.38	0.52	5.89	8.31
maj	901	1	7.27	6.93	0.65	5.98	10.93
jun	1082	2	7.62	7.55	0.47	6.65	9.72
jul	989	2	10.51	9.58	2.29	7.48	15.17
aug	736	1	12.64	12.72	1.25	9.79	15.76
sep	1316	2	13.84	13.88	0.64	12.06	15.70
oct	747	1	12.90	12.96	0.51	11.86	14.57
nov	390	1	10.25	11.41	1.73	6.86	11.71
dec	326	1	5.58	4.82	0.90	4.28	7.28

Tabel B.160: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Saltholm North i 3.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	645	1	3.40	3.64	0.60	0.99	4.83
feb	374	1	2.33	2.57	0.55	0.86	2.97
mar	744	1	2.29	2.07	0.69	1.39	3.71
apr	720	1	4.63	4.28	1.26	2.82	8.35
maj	436	1	9.41	9.27	1.27	7.07	12.26
jun	473	1	14.92	14.88	0.40	13.64	16.08
jul	896	1	14.94	15.08	0.80	13.52	20.51
aug	1488	2	16.59	16.48	0.56	13.77	20.15
sep	718	1	15.55	15.32	0.32	14.21	17.30
oct	537	1	12.18	12.26	1.53	9.49	14.98
nov	231	0	-	6.28	0.36	5.56	7.89
dec	744	1	5.30	5.62	0.91	3.12	6.57

Tabel B.161: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Saltholm North i 5.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	645	1	3.54	3.72	0.64	1.24	5.55
feb	374	1	2.36	2.63	0.56	0.99	2.99
mar	744	1	2.31	1.98	0.70	1.44	3.65
apr	720	1	4.64	4.31	1.19	2.92	7.78
maj	436	1	9.38	9.39	1.11	7.19	11.70
jun	473	1	14.97	14.92	0.41	13.78	16.51
jul	896	1	15.00	15.12	0.83	13.73	20.32
aug	1488	2	16.64	16.73	0.53	14.00	20.09
sep	718	1	15.61	15.36	0.32	14.27	17.30
oct	537	1	12.28	12.34	1.58	9.52	15.27
nov	231	0	-	6.42	0.39	5.50	7.90
dec	744	1	5.43	5.74	0.91	3.17	6.96

Tabel B.162: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Saltholm North i 7.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	644	1	3.67	3.73	0.74	1.00	6.03
feb	374	1	2.32	2.58	0.59	0.92	2.94
mar	744	1	2.26	1.89	0.72	1.29	3.58
apr	720	1	4.54	4.21	1.17	2.69	7.56
maj	436	1	9.01	8.98	0.98	6.48	10.95
jun	473	1	14.81	14.82	0.39	13.16	16.32
jul	896	1	14.94	15.02	0.88	13.75	19.98
aug	1488	2	16.43	16.18	0.46	14.09	19.20
sep	718	1	15.48	15.25	0.31	14.19	16.99
oct	537	1	12.31	12.44	1.63	9.30	15.02
nov	231	0	-	6.56	0.44	5.42	8.02
dec	744	1	5.64	5.77	1.07	3.06	7.95

Tabel B.163: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Saltholm North i 9.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	644	1	4.10	3.87	0.91	1.56	6.56
feb	374	1	2.34	2.62	0.63	0.77	2.98
mar	744	1	2.36	2.00	0.72	1.31	3.62
apr	720	1	4.43	4.11	1.01	2.88	7.21
maj	436	1	8.37	8.16	1.10	5.98	10.59
jun	473	1	14.64	14.81	0.71	11.85	16.70
jul	896	1	14.99	14.96	0.95	13.54	19.77
aug	1488	2	16.17	15.70	0.49	13.98	18.64
sep	718	1	15.28	15.11	0.25	13.98	17.00
oct	537	1	12.52	12.61	1.63	9.32	14.98
nov	231	0	-	6.98	0.57	5.75	8.68
dec	744	1	6.24	6.12	1.31	3.31	8.87

Tabel B.164: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Saltholm North i 11.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	644	1	4.75	4.46	1.11	3.41	7.05
feb	374	1	2.22	2.48	0.61	0.88	2.79
mar	744	1	2.35	2.39	0.74	1.12	3.57
apr	720	1	4.06	3.89	0.76	2.79	6.61
maj	435	1	7.31	7.00	1.32	4.97	10.73
jun	473	1	13.02	13.80	1.83	6.17	15.32
jul	894	1	14.66	14.70	1.27	9.70	18.72
aug	1486	2	15.26	15.07	0.91	10.88	18.03
sep	718	1	14.50	14.75	0.42	11.14	16.27
oct	537	1	12.52	12.33	1.50	9.97	14.95
nov	231	0	-	7.54	0.85	6.27	9.85
dec	744	1	6.87	6.76	1.19	4.14	9.11

Tabel B.165: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Saltholm North i 13.5 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	644	1	5.33	5.37	1.35	3.65	7.48
feb	374	1	2.51	2.67	0.48	1.02	3.55
mar	744	1	2.77	3.01	0.71	1.46	3.88
apr	720	1	4.12	4.04	0.57	3.11	6.30
maj	435	1	5.98	5.88	0.78	4.80	7.86
jun	473	1	10.46	11.34	2.97	5.50	14.95
jul	895	1	13.97	14.07	1.64	7.46	15.46
aug	1488	2	13.71	13.97	1.52	8.56	16.90
sep	718	1	13.12	13.41	0.74	9.84	15.64
oct	537	1	12.50	12.32	1.00	10.63	14.88
nov	231	0	-	8.46	0.89	6.68	10.25
dec	744	1	7.75	7.58	0.99	5.66	9.50

Tabel B.166: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Saltholm North i 14.2 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	644	1	5.21	5.38	1.40	3.36	7.34
feb	374	1	2.27	2.40	0.45	0.95	2.86
mar	744	1	2.56	2.77	0.68	1.25	3.62
apr	720	1	3.79	3.77	0.49	2.94	5.62
maj	435	1	5.30	5.14	0.65	4.43	7.06
jun	471	1	9.26	9.99	2.97	4.31	14.28
jul	894	1	13.21	13.30	1.58	7.29	15.09
aug	1488	2	13.09	13.27	1.54	8.41	16.43
sep	718	1	12.71	12.91	0.71	9.68	14.93
oct	537	1	12.26	12.13	0.77	10.63	14.38
nov	231	0	-	8.46	0.88	6.53	10.12
dec	744	1	7.69	7.51	0.96	5.82	9.39

Tabel B.167: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Svinbådan i 2.7 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	957	1	3.54	2.85	0.64	2.08	5.79
feb	-	-	-	-	-	-	-
mar	-	-	-	-	-	-	-
apr	34	0	-	8.35	0.52	6.53	9.26
maj	738	1	10.73	11.09	1.15	8.81	13.14
jun	720	1	13.51	13.61	0.74	12.37	15.66
jul	744	1	18.82	19.41	2.24	14.65	23.29
aug	741	1	20.60	20.64	1.91	17.30	23.16
sep	718	1	15.36	15.15	1.23	13.38	17.59
oct	1088	2	9.84	9.80	1.17	7.20	13.51
nov	1369	2	7.21	7.42	0.99	3.24	9.78
dec	1482	2	4.88	4.65	0.76	2.75	7.39

Tabel B.168: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Svinbådan i 6.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	-	-	-	-	-	-	-
feb	-	-	-	-	-	-	-
mar	-	-	-	-	-	-	-
apr	33	0	-	5.86	0.18	5.67	6.25
maj	48	0	-	5.10	0.92	4.85	8.95
jun	-	-	-	-	-	-	-
jul	-	-	-	-	-	-	-
aug	-	-	-	-	-	-	-
sep	-	-	-	-	-	-	-
oct	-	-	-	-	-	-	-
nov	-	-	-	-	-	-	-
dec	-	-	-	-	-	-	-

Tabel B.169: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Svinbådan i 7.7 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	957	1	3.60	3.76	0.77	1.85	5.92
feb	-	-	-	-	-	-	-
mar	-	-	-	-	-	-	-
apr	34	0	-	8.21	0.67	5.72	9.28
maj	738	1	9.00	9.15	1.06	5.75	12.75
jun	720	1	13.09	13.29	0.71	9.40	15.38
jul	744	1	17.00	16.58	2.00	13.56	21.16
aug	743	1	19.05	18.52	1.70	13.86	22.63
sep	720	1	14.93	14.81	1.36	12.07	17.41
oct	1091	2	9.97	9.91	1.11	7.34	13.22
nov	1369	2	8.05	7.88	0.90	5.07	11.21
dec	1482	2	5.31	5.55	1.02	2.85	8.52

Tabel B.170: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Svinbådan i 12.9 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	957	1	4.60	5.08	0.87	2.43	6.78
feb	-	-	-	-	-	-	-
mar	-	-	-	-	-	-	-
apr	33	0	-	5.40	0.05	5.34	5.51
maj	738	1	5.81	5.55	1.02	4.80	11.63
jun	720	1	11.79	12.71	2.20	4.96	14.30
jul	744	1	14.33	13.92	1.58	10.88	19.60
aug	743	1	13.90	13.66	2.75	9.22	20.34
sep	430	1	13.44	13.30	1.87	9.38	17.47
oct	1041	2	10.48	11.06	0.67	8.30	13.35
nov	1369	2	8.81	8.23	1.00	6.97	11.61
dec	1482	2	6.46	6.70	1.30	3.37	8.87

Tabel B.171: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Svinbådan i 21.0 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	624	1	6.14	6.32	1.35	3.26	8.48
feb	-	-	-	-	-	-	-
mar	-	-	-	-	-	-	-
apr	-	-	-	-	-	-	-
maj	690	1	5.19	5.14	0.17	4.88	5.51
jun	18	0	-	4.95	0.02	4.90	5.00
jul	-	-	-	-	-	-	-
aug	614	1	8.48	8.10	1.13	7.30	15.88
sep	720	1	8.97	9.03	1.16	7.30	13.51
oct	701	1	11.53	11.33	0.52	10.95	13.27
nov	694	1	10.52	10.92	0.97	8.05	11.64
dec	744	1	8.45	8.79	0.73	5.29	9.01

Tabel B.172: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Valgrundet i 2.7 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1129	2	3.35	2.94	0.62	2.15	5.42
feb	672	1	1.47	1.95	1.03	-0.28	2.94
mar	696	1	1.81	2.10	0.99	-0.04	4.03
apr	706	1	5.02	4.82	1.12	3.27	8.10
maj	694	1	10.17	10.63	1.06	8.05	12.14
jun	720	1	12.97	13.12	0.87	10.75	15.40
jul	744	1	18.35	18.99	2.59	13.73	23.34
aug	744	1	20.41	19.42	2.12	16.44	23.34
sep	534	1	15.25	15.79	1.01	12.52	17.22
oct	1228	2	10.35	10.68	1.14	7.46	12.87
nov	1394	2	7.27	7.48	1.07	3.49	9.51
dec	1488	2	4.93	4.55	0.71	2.89	7.46

Tabel B.173: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Valgrundet i 4.7 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.

	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1128	2	3.52	3.10	0.71	2.24	5.92
feb	672	1	1.55	2.04	1.00	-0.23	2.95
mar	696	1	1.92	2.17	1.04	0.07	4.52
apr	706	1	5.00	4.83	1.08	3.21	8.03
maj	694	1	9.94	10.38	1.10	6.79	11.93
jun	720	1	12.79	13.12	1.09	8.03	15.29
jul	744	1	18.14	18.76	2.44	13.78	23.10
aug	744	1	20.15	19.10	2.04	16.10	23.38
sep	534	1	15.25	15.78	0.99	12.52	17.07
oct	1230	2	10.43	10.74	1.12	7.58	12.87
nov	1394	2	7.48	7.58	1.05	3.68	11.34
dec	1488	2	5.14	4.84	0.90	2.96	7.93

Tabel B.174: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Valgrundet i 6.8 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.


	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1129	2	3.61	3.13	0.89	2.25	6.61
feb	672	1	1.68	2.08	1.04	-0.29	4.15
mar	696	1	2.29	2.54	1.27	-0.01	4.74
apr	706	1	4.90	4.77	1.05	3.13	7.96
maj	694	1	9.36	9.53	1.51	4.95	11.39
jun	720	1	12.38	12.80	1.56	6.42	14.94
jul	744	1	17.71	18.00	2.24	13.71	22.52
aug	744	1	19.36	18.39	2.32	10.15	22.88
sep	534	1	15.08	15.49	1.06	10.80	16.87
oct	1230	2	10.41	10.72	1.08	7.60	12.72
nov	1394	2	7.75	7.81	1.05	3.65	11.37
dec	1488	2	5.50	5.28	1.28	3.13	8.55

Tabel B.175: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Valgrundet i 8.8 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.


	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	744	1	3.39	2.94	0.96	2.13	6.24
feb	672	1	1.71	2.00	1.24	-0.34	4.94
mar	698	1	2.50	2.82	1.43	-0.22	4.71
apr	706	1	4.71	4.64	1.03	2.92	7.67
maj	694	1	8.42	8.78	1.80	4.56	11.02
jun	720	1	11.83	12.39	2.00	5.08	15.51
jul	744	1	16.95	15.96	2.25	11.86	21.50
aug	744	1	17.78	18.03	3.30	7.70	22.71
sep	534	1	14.36	14.37	1.71	8.29	16.61
oct	1230	2	10.38	10.73	1.01	7.95	12.55
nov	880	1	7.36	7.93	1.06	4.12	11.22
dec	744	1	5.39	4.86	1.83	2.92	8.06

Tabel B.176: Månedlig statistik over temperaturdata fra station Valgrundet i 10.9 m dybde. Obs., gns. og std. betyder h.h.v. antal observationer, gennemsnit og standardafvigelse. År er antal måneder der er brugt til beregning af gns. Median, minimum (min.) og maximum (max.) er også givet.


	obs.	år	gns.	median	std.	min.	max.
jan	1109	2	4.28	3.65	1.43	2.17	7.45
feb	672	1	2.20	2.20	1.26	-0.28	5.13
mar	696	1	2.97	3.23	1.48	-0.11	4.78
apr	493	1	4.73	4.88	0.82	3.08	7.04
maj	666	1	7.41	7.60	1.69	4.68	10.61
jun	720	1	11.38	12.01	2.33	4.80	15.85
jul	744	1	15.66	15.45	2.39	10.69	21.58
aug	57	0	-	13.47	1.96	10.84	19.89
sep	-	-	-	-	-	-	-
oct	1203	2	10.27	10.61	0.86	7.87	11.81
nov	1394	2	8.46	8.42	1.15	4.28	11.15
dec	1488	2	6.28	6.48	1.55	3.03	8.63




(a) Århus Bugt



(b) Darss Sill




(c) Deutsche Bucht




(d) Drogden


Figur B.6: Årlig forløb i temperatur. Hver dybde har sin farve. Farvekoden er vist i venstre hjørne af hver figur.




Figur B.7: Årlig forløb i temperatur. Hver dybde har sin farve. Farvekoden er vist i venstre hjørne af hver figur.




(a) Flinten



(b) Gamle Bro




(c) Hjelm Bugt




(d) Kiel


Figur B.8: Årlig forløb i temperatur. Hver dybde har sin farve. Farvekoden er vist i venstre hjørne af hver figur.




(a) Læsø Rende



(b) "Early" Ndr. Røse




(c) Ndr. Røse




(d) North Sea


Figur B.9: Årlig forløb i temperatur. Hver dybde har sin farve. Farvekoden er vist i venstre hjørne af hver figur.




(a) Oder



(b) Østerrenden Nord




(c) Romsø Tue Fyr




(d) Vesterrenden


Figur B.10: Årlig forløb i temperatur. Hver dybde har sin farve. Farvekoden er vist i venstre hjørne af hver figur.




(a) Østerrenden



(b) Langelandsbælt




(c) Saltholm North




(d) Svinbådan

Figur B.11: Årlig forløb i temperatur. Hver dybde har sin farve. Farvekodeen er vist i venstre hjørne af hver figur.




(a) Valgrundet


Figur B.12: Årlig forløb i temperatur. Hver dybde har sin farve. Farvekoden er vist i venstre hjørne af hver figur.



(a) 4.0 m dybde




(b) 9.0 m dybde




(c) 14.0 m dybde


Figur B.13: Årlig temperaturvariation ved Århus Bugt . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 2.0 m dybde




(b) 5.0 m dybde




(c) 7.0 m dybde



(d) 12.0 m dybde




(e) 17.0 m dybde




(f) 19.0 m dybde


Figur B.14: Årlig temperaturvariation ved Darss Sill . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 3.0 m dybde




(b) 6.0 m dybde




(c) 10.0 m dybde




(d) 15.0 m dybde



(e) 20.0 m dybde




(f) 25.0 m dybde




(g) 30.0 m dybde


Figur B.15: Årlig temperaturvariation ved Deutsche Bucht . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 2.0 m dybde




(b) 4.0 m dybde



(c) 6.0 m dybde




(d) 8.0 m dybde




(e) 10.0 m dybde


Figur B.16: Årlig temperaturvariation ved Drogden . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 3.0 m dybde




(b) 6.0 m dybde



(c) 10.0 m dybde




(d) 15.0 m dybde




(e) 20.0 m dybde


Figur B.17: Årlig temperaturvariation ved Elbe . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 3.0 m dybde




(b) 6.0 m dybde




(c) 10.0 m dybde




(d) 15.0 m dybde



(e) 20.0 m dybde




(f) 25.0 m dybde




(g) 30.0 m dybde


Figur B.18: Årlig temperaturvariation ved EMS . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 2.8 m dybde




(b) 5.5 m dybde




(c) 8.5 m dybde



(d) 11.5 m dybde




(e) 14.5 m dybde




(f) 21.0 m dybde

Figur B.19: Årlig temperaturvariation ved Farø. Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 1.5 m dybde




(b) 7.5 m dybde


Figur B.20: Årlig temperaturvariation ved "Early"Flinten . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 3.0 m dybde




(b) 4.5 m dybde



(c) 6.0 m dybde




(d) 7.5 m dybde




(e) 9.1 m dybde


Figur B.21: Årlig temperaturvariation ved Flinten . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 5.0 m dybde




(b) 10.0 m dybde



(c) 15.0 m dybde




(d) 20.0 m dybde




(e) 22.5 m dybde


Figur B.22: Årlig temperaturvariation ved Gamle Bro . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 6.7 m dybde



(b) 10.2 m dybde




(c) 15.4 m dybde




(d) 21.5 m dybde


Figur B.23: Årlig temperaturvariation ved Hjelm Bugt . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 0.0 m dybde




(b) 1.0 m dybde




(c) 2.0 m dybde



(d) 4.0 m dybde




(e) 8.0 m dybde




(f) 13.0 m dybde


Figur B.24: Årlig temperaturvariation ved Kiel . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 6.2 m dybde



(b) 10.5 m dybde




(c) 15.8 m dybde




(d) 21.1 m dybde

Figur B.25: Årlig temperaturvariation ved Læsø Rende . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 2.5 m dybde




(b) 7.0 m dybde


Figur B.26: Årlig temperaturvariation ved "Early"Ndr. Røse. Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 2.9 m dybde




(b) 4.4 m dybde




(c) 5.9 m dybde



(d) 7.4 m dybde




(e) 9.0 m dybde




(f) 10.6 m dybde


Figur B.27: Årlig temperaturvariation ved Ndr. Røse . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 3.0 m dybde




(b) 12.0 m dybde




(c) 15.0 m dybde



(d) 20.0 m dybde




(e) 25.0 m dybde




(f) 30.0 m dybde

Figur B.28: Årlig temperaturvariation ved North Sea . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 3.0 m dybde




(b) 12.0 m dybde


Figur B.29: Årlig temperaturvariation ved Oder . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 3.3 m dybde



(b) 5.8 m dybde




(c) 9.8 m dybde




(d) 14.9 m dybde


Figur B.30: Årlig temperaturvariation ved Østerrenden Nord . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 7.0 m dybde




(b) 10.0 m dybde




(c) 12.0 m dybde



(d) 14.0 m dybde




(e) 16.0 m dybde




(f) 19.0 m dybde


Figur B.31: Årlig temperaturvariation ved Romsø Tue Fyr . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 6.5 m dybde




(b) 9.6 m dybde




(c) 11.6 m dybde



(d) 13.6 m dybde




(e) 15.6 m dybde




(f) 18.5 m dybde


Figur B.32: Årlig temperaturvariation ved Vesterrenden . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 7.0 m dybde




(b) 10.0 m dybde




(c) 12.0 m dybde



(d) 14.0 m dybde




(e) 16.0 m dybde




(f) 19.0 m dybde


Figur B.33: Årlig temperaturvariation ved Østerrenden . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 7.6 m dybde




(b) 10.6 m dybde




(c) 12.6 m dybde



(d) 14.6 m dybde




(e) 16.6 m dybde




(f) 19.6 m dybde


Figur B.34: Årlig temperaturvariation ved Langelandsbælt . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 3.5 m dybde




(b) 5.5 m dybde




(c) 7.5 m dybde




(d) 9.5 m dybde



(e) 11.5 m dybde




(f) 13.5 m dybde




(g) 14.2 m dybde


Figur B.35: Årlig temperaturvariation ved Saltholm North . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 2.7 m dybde




(b) 6.0 m dybde



(c) 7.7 m dybde




(d) 12.9 m dybde




(e) 21.0 m dybde


Figur B.36: Årlig temperaturvariation ved Svinbådan . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.




(a) 2.7 m dybde




(b) 4.7 m dybde



(c) 6.8 m dybde



(d) 8.8 m dybde



(e) 10.9 m dybde

Figur B.37: Årlig temperaturvariation ved Valgrundet . Gennemsnittet er vist med sort, standardafvigelsen med grønt og minimum og maximum er vist med rødt. Der er en figur for hver dybde.

Tabel B.177: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Århus Bugt i 4.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		0.1										
0 - 1		15.7	15.2									
1 - 2	24.5	11.3	12.4									
2 - 3	49.3	56.2	30.5									
3 - 4	14.4	16.8	23.9	0.8								
4 - 5	10.2		17.8	23.6								
5 - 6	1.5		0.1	23.5								26.6
6 - 7				14.3	0.5							23.8
7 - 8				10.0	4.0						67.4	37.9
8 - 9				14.3	13.2					12.7	31.6	11.6
9 - 10				8.8	18.1					8.1	1.0	0.1
10 - 11				4.7	25.1	0.6				16.9		
11 - 12					24.6	7.0				11.8		
12 - 13					12.9	3.8	0.3			18.3		
13 - 14					1.4	30.8	7.8		2.6	30.8		
14 - 15					0.3	30.0	16.6		15.0	1.5		
15 - 16						20.0	9.9	0.1	11.1			
16 - 17						6.0	19.3	22.1	71.3			
17 - 18						1.3	18.0	16.8				
18 - 19						0.4	2.0	10.8				
19 - 20							8.3	9.8				
20 - 21							17.6	8.1				
21 - 22							0.1	28.9				
22 - 23								3.5				
23 - 24												
> 24												
antal	803	1365	1485	1437	1468	1439	1426	1486	745	608	589	741

Tabel B.178: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Århus Bugt i 9.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1		0.2	12.6									
1 - 2	20.5	24.0	4.0									
2 - 3	48.8	42.6	34.9									
3 - 4	16.4	32.8	18.0									
4 - 5	12.3	0.4	30.5	28.6								
5 - 6	1.9			39.3	28.3							24.6
6 - 7				13.4	24.3	0.8						22.7
7 - 8				9.8	13.7	12.6					61.5	35.6
8 - 9				4.3	7.4	6.2				0.2	29.6	14.4
9 - 10				2.2	18.7	12.9				16.3	7.9	2.4
10 - 11				2.4	6.1	18.3	0.1			9.7	0.9	0.3
11 - 12					1.7	23.5	3.9			6.4		
12 - 13						13.2	12.9	0.1	0.5	28.8		
13 - 14						9.9	15.9	5.0	2.8	14.5		
14 - 15						2.7	21.3	9.2	10.2	17.1		
15 - 16							14.7	10.9	23.1	7.1		
16 - 17							13.2	23.6	63.4			
17 - 18							2.2	24.7				
18 - 19							2.7	12.5				
19 - 20							7.1	4.2				
20 - 21							5.8	9.1				
21 - 22							0.4	0.7				
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	803	1365	1485	1437	1468	1439	1425	1486	745	608	533	741

Tabel B.179: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Århus Bugt i 14.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2	3.5	10.0	5.1									
2 – 3	33.3	25.1	16.1									
3 – 4	24.5	10.6	13.6									
4 – 5	29.1	44.2	60.9	54.4	5.2							
5 – 6	3.7	9.3	4.3	33.6	72.9							4.0
6 – 7	5.9	0.8		3.1	15.5	31.3						38.3
7 – 8				8.1	3.1	22.2					10.4	14.3
8 – 9				0.8	3.1	12.7	1.3				13.9	4.5
9 – 10					0.1	26.3	15.4			17.1	5.9	9.4
10 – 11						5.4	29.8			7.1	16.1	14.8
11 – 12						1.5	28.0	7.6		1.0	33.8	14.6
12 – 13						0.6	17.3	33.0	3.4	0.3	19.9	
13 – 14							5.9	32.4	0.3	16.9		
14 – 15							1.8	20.2	53.2	27.0		
15 – 16							0.4	6.5	36.6	30.6		
16 – 17								0.3	6.6			
17 – 18												
18 – 19												
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	803	1365	1485	1437	1468	1439	1425	1486	745	608	589	741

Tabel B.180: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Darss Sill i 2.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
−2 – −1												
−1 – 0	0.7											
0 – 1	6.1	16.6										
1 – 2	6.6	25.7										
2 – 3	36.5	21.7	29.7									6.9
3 – 4	41.5	26.4	52.9	2.8								27.9
4 – 5	4.8	9.7	17.4	53.6								18.9
5 – 6	3.7		0.1	24.5	5.5						10.5	29.3
6 – 7				12.8	17.7						6.5	13.8
7 – 8				6.4	21.1						19.3	3.1
8 – 9					18.7						30.4	0.1
9 – 10					10.2		0.4		0.4	6.7	7.4	
10 – 11					11.7	2.3	1.1	0.6	5.5	26.7	5.3	
11 – 12					8.5	10.2	0.7	0.4	1.2	32.1	17.1	
12 – 13					5.2	20.0	1.5	1.1	1.4	28.0	3.4	
13 – 14					1.6	32.0	6.1	2.7	15.2	6.4		
14 – 15						20.0	18.9	4.8	16.2	0.1		
15 – 16						12.1	21.4	23.5	12.6			
16 – 17						3.3	12.3	16.8	23.3			
17 – 18							19.6	7.0	17.0			
18 – 19							9.4	9.1	2.2			
19 – 20							4.0	16.6	2.7			
20 – 21							1.0	9.3	2.2			
21 – 22							1.1	5.6	0.1			
22 – 23							2.3	2.1				
23 – 24							0.1	0.4				
> 24												
antal	1791	1718	1969	1635	1665	1377	1952	1790	1613	1502	1889	2000

Tabel B.181: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Darss Sill i 5.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2		22.4										
2 - 3	40.3	33.2	43.2									5.7
3 - 4	56.7	39.7	46.2	4.7								30.7
4 - 5	0.5	4.6	10.6	54.4								17.7
5 - 6		0.1		26.6	4.9						9.0	26.3
6 - 7				11.1	16.5						7.2	16.5
7 - 8	0.3			3.2	22.1						19.0	3.1
8 - 9	2.1				18.5	0.2					33.6	
9 - 10					10.3	4.8	0.5	0.2	0.7	7.4	15.6	
10 - 11					12.0	8.4	1.0	0.5	6.0	34.7	9.7	
11 - 12					9.3	10.4	1.0	0.5	0.6	20.1	5.4	
12 - 13					5.6	19.4	1.8	2.4	1.5	29.4	0.4	
13 - 14					0.8	30.5	8.3	3.0	15.5	8.4		
14 - 15						19.0	20.9	4.8	16.6	0.1		
15 - 16						5.8	21.0	27.1	12.1			
16 - 17						1.5	9.0	11.3	24.1			
17 - 18							20.3	7.2	16.2			
18 - 19							9.4	10.8	1.4			
19 - 20							2.9	17.6	3.0			
20 - 21							1.8	6.5	2.3			
21 - 22							2.2	2.6				
22 - 23								2.2				
23 - 24								1.4				
> 24												
antal	1433	1185	1348	1571	1830	1960	1991	1742	1625	1512	1927	1998

Tabel B.182: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Darss Sill i 7.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2	1.0	19.1										
2 - 3	39.5	30.4	52.8	2.2								3.9
3 - 4	52.4	47.7	45.3	11.2								32.9
4 - 5	7.1	2.8	1.9	54.7								24.0
5 - 6				24.0	7.2						8.1	23.0
6 - 7				7.1	22.7	0.6	0.1				8.4	13.4
7 - 8				0.7	24.1	0.6	0.6	0.1	0.2		20.1	2.8
8 - 9					14.6	3.6	2.2	0.2	0.3	0.5	30.1	
9 - 10					10.9	7.1	1.3	1.0	1.8	6.8	17.6	
10 - 11					10.0	7.1	2.1	0.9	7.2	31.2	10.3	
11 - 12					9.5	15.0	2.5	2.3	6.9	19.3	5.1	
12 - 13					0.9	15.5	5.1	2.6	6.9	37.3	0.4	
13 - 14					0.1	31.2	9.2	2.3	18.1	4.8		
14 - 15						13.5	19.1	4.9	15.6	0.1		
15 - 16						5.1	18.6	26.8	18.1			
16 - 17						0.6	12.8	12.7	16.7			
17 - 18							17.2	13.1	3.1			
18 - 19							7.6	18.1	0.8			
19 - 20							1.0	4.5	2.4			
20 - 21							0.8	6.0	2.0			
21 - 22								3.8				
22 - 23								0.9				
23 - 24												
> 24												
antal	1763	1998	2415	2213	3134	2494	2366	1759	1932	1697	1935	1963

Tabel B.183: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Darss Sill i 12.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
−2 – −1												
−1 – 0												
0 – 1												
1 – 2	1.2	19.9										
2 – 3	40.7	28.8	46.8	2.4								3.8
3 – 4	49.1	48.2	51.5	12.6								27.6
4 – 5	7.9	2.3	1.8	61.2	0.7							26.5
5 – 6	1.0	0.8		21.0	12.4						1.8	22.4
6 – 7				2.9	28.1	2.7	0.3				14.1	15.9
7 – 8					24.1	4.9	1.9		0.1		20.1	3.9
8 – 9					11.1	12.5	4.2	0.2	0.8	0.6	23.7	
9 – 10					7.3	12.5	8.7	2.3	2.7	6.4	17.2	
10 – 11					13.6	13.2	6.9	5.9	11.0	22.8	16.6	
11 – 12					2.5	13.3	9.7	4.8	14.4	19.1	6.0	
12 – 13					0.2	17.8	13.2	5.9	8.8	42.5	0.4	
13 – 14						18.6	10.2	5.6	21.3	8.6		
14 – 15						3.8	18.3	10.1	15.3	0.1		
15 – 16						0.5	12.1	17.1	13.3			
16 – 17							5.9	14.7	6.2			
17 – 18							8.2	20.1	0.5			
18 – 19							0.5	10.4	1.4			
19 – 20								2.3	2.9			
20 – 21								0.5	1.2			
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	1655	1970	2866	2672	3122	2446	2340	1699	1712	1448	1887	1861

Tabel B.184: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Darss Sill i 17.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2	0.1	13.5										
2 – 3	20.3	33.4	47.7	2.8								2.7
3 – 4	63.4	45.1	50.3	19.8								21.1
4 – 5	8.4	5.3	2.0	66.2	5.4							18.5
5 – 6	5.6	2.8		11.2	30.9							22.0
6 – 7	2.2				25.2	0.7	0.3		0.1		7.7	25.4
7 – 8					22.1	24.3	3.3	0.1	0.4		16.0	8.5
8 – 9					9.9	12.8	5.8	0.6	1.1	0.6	25.1	1.9
9 – 10					5.3	13.0	14.9	1.8	4.9	6.2	21.8	
10 – 11					1.2	16.5	22.6	7.4	7.3	18.8	20.6	
11 – 12						15.7	14.6	7.8	12.8	18.2	7.5	
12 – 13						9.7	11.8	17.4	13.2	37.6	1.2	
13 – 14						6.7	8.5	16.9	17.5	18.5		
14 – 15						0.6	10.5	21.2	16.6	0.1		
15 – 16							3.8	11.7	17.2			
16 – 17							1.5	8.5	4.8			
17 – 18							2.4	6.6	0.8			
18 – 19									1.0			
19 – 20									2.3			
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	1578	1939	2845	2460	3097	2296	2374	1572	1792	1613	1850	1810

Tabel B.185: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Darss Sill i 19.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
−2 – −1												
−1 – 0												
0 – 1												
1 – 2	0.3	11.3										
2 – 3	19.6	34.1	45.9	2.6								
3 – 4	57.4	44.5	51.7	21.1								14.8
4 – 5	9.0	6.9	2.4	68.3	6.8							12.9
5 – 6	11.2	3.3		8.0	40.1						0.3	20.8
6 – 7	2.6				21.0	5.9			0.3		2.6	32.5
7 – 8					20.5	27.0	0.9		0.6		12.7	14.0
8 – 9					9.4	6.9	3.2		1.1	0.5	28.8	4.9
9 – 10					2.2	17.4	10.2	1.1	4.5	5.8	20.7	
10 – 11						20.7	31.8	6.6	8.6	17.8	24.9	
11 – 12						13.0	21.0	12.0	9.2	14.4	8.8	
12 – 13						4.5	5.5	28.7	12.9	39.9	1.2	
13 – 14						4.6	14.1	18.7	26.5	21.7		
14 – 15							7.1	13.8	12.5	0.1		
15 – 16							3.0	11.2	15.2			
16 – 17							1.8	7.1	4.8			
17 – 18							1.4	0.8	1.1			
18 – 19									0.9			
19 – 20									1.7			
20 – 21									0.1			
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	1482	2023	2960	2501	3132	2193	2114	1729	1909	1700	1888	1538

Tabel B.186: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Deutsche Bucht i 3.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3	0.8	11.7										
3 - 4	15.9	12.4	17.7									
4 - 5	4.5	29.3	17.6	15.0								
5 - 6	56.6	45.2	41.0	14.9								3.8
6 - 7	22.2	1.4	22.7	13.5	0.2							32.6
7 - 8			1.0	41.6	5.6						4.4	32.1
8 - 9				13.8	11.4						10.0	7.0
9 - 10				1.2	20.2						11.0	12.5
10 - 11					24.6	2.2				1.3	25.4	12.0
11 - 12					23.7	11.7				1.7	22.9	
12 - 13					12.1	26.5				7.3	16.3	
13 - 14					2.1	30.8	1.1			18.9	9.2	
14 - 15					0.1	18.7	14.4			37.4	0.7	
15 - 16						8.9	23.9	0.4	11.4	18.7		
16 - 17						1.2	28.3	22.9	19.5	14.6		
17 - 18							18.1	37.1	32.6	0.2		
18 - 19							12.4	18.3	34.0			
19 - 20							1.8	8.7	2.5			
20 - 21								10.6				
21 - 22								2.1				
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	3358	3084	2944	2328	2583	2953	2764	2914	2653	2717	3177	2695

Tabel B.187: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Deutsche Bucht i 6.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3	0.4	11.6										
3 - 4	14.0	11.9	17.7									
4 - 5	3.6	29.6	17.1	16.3								
5 - 6	57.9	45.5	42.4	15.1								4.3
6 - 7	24.0	1.4	22.2	14.3	0.3							34.3
7 - 8			0.6	42.7	7.1						4.2	31.1
8 - 9				11.4	15.3						10.1	6.8
9 - 10				0.2	25.1	0.2					11.0	12.0
10 - 11					21.1	4.3				1.1	25.8	11.6
11 - 12					20.9	15.1				1.5	23.4	
12 - 13					9.9	26.5				6.5	15.7	
13 - 14					0.5	31.9	3.2			16.5	9.2	
14 - 15						18.0	17.5			33.3	0.7	
15 - 16						3.8	27.1	1.6	14.8	27.8		
16 - 17						0.2	30.8	24.2	22.6	13.0		
17 - 18							15.7	40.0	30.2	0.1		
18 - 19							5.5	18.9	30.7			
19 - 20							0.2	8.3	1.7			
20 - 21								6.4				
21 - 22								0.6				
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	3708	3080	2959	2385	2618	2956	2753	2983	3010	3050	3194	2807

Tabel B.188: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Deutsche Bucht i 10.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3	0.1	11.5										
3 - 4	13.6	9.9	18.2									
4 - 5	7.3	31.2	15.9	18.9								
5 - 6	55.7	46.2	45.1	16.1								4.0
6 - 7	23.4	1.2	20.7	22.7	5.3							34.5
7 - 8				33.9	16.2						3.6	30.5
8 - 9				8.4	16.3						9.2	7.4
9 - 10					23.9	4.5					10.6	12.4
10 - 11					16.9	7.9				1.1	26.6	11.2
11 - 12					17.2	16.9				1.5	24.0	
12 - 13					4.1	28.2	1.4			6.7	16.2	
13 - 14						28.7	9.7			16.8	9.1	
14 - 15						13.3	27.4			33.4	0.7	
15 - 16						0.4	30.2	4.5	14.5	27.2		
16 - 17							25.9	27.8	22.3	13.2		
17 - 18							5.1	50.2	31.5	0.2		
18 - 19							0.3	13.7	30.8			
19 - 20								3.0	1.0			
20 - 21								0.9				
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	3702	3087	2964	2209	2042	2944	2764	2980	2989	2991	3183	2787

Tabel B.189: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Deutche Bucht i 15.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3		11.8										
3 - 4	11.8	9.4	18.2									
4 - 5	9.4	31.6	15.7	18.4								
5 - 6	54.1	45.7	46.0	17.9								2.4
6 - 7	24.7	1.4	20.1	27.5	12.1							35.2
7 - 8	0.1			35.2	21.8						3.4	28.6
8 - 9				1.0	27.6	1.9					8.2	10.3
9 - 10					19.9	5.7					8.9	11.8
10 - 11					12.0	14.3				1.2	26.5	11.8
11 - 12					6.4	20.0				1.5	25.5	
12 - 13					0.2	26.8	5.1			6.8	17.2	
13 - 14						21.2	14.1			16.7	9.6	
14 - 15						10.0	28.0			33.2	0.7	
15 - 16							26.9	7.5	12.6	27.1		
16 - 17							24.9	35.0	22.4	13.4		
17 - 18							1.0	48.5	33.0	0.1		
18 - 19								8.5	31.5			
19 - 20								0.5	0.5			
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	3690	3091	2965	2384	2107	2947	2765	2984	2919	2994	3185	2798

Tabel B.190: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Deutche Bucht i 20.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3		11.9										
3 - 4	11.4	9.4	18.6									
4 - 5	8.7	29.6	14.1	19.3								
5 - 6	53.5	47.6	46.2	17.3								0.9
6 - 7	26.2	1.5	21.2	29.2	9.2							35.3
7 - 8	0.2			27.8	19.5						3.2	29.4
8 - 9				6.4	29.4	2.8					8.1	10.5
9 - 10					21.3	7.1					8.3	12.3
10 - 11					17.4	18.2				1.1	24.0	11.5
11 - 12					3.2	20.1				1.6	28.8	
12 - 13						26.1	7.8			6.7	17.3	
13 - 14						17.4	15.1			16.9	9.7	
14 - 15						8.2	28.1			34.4	0.5	
15 - 16							26.0	9.5	14.1	25.7		
16 - 17							23.0	33.0	21.6	13.5		
17 - 18								50.7	33.0	0.1		
18 - 19								6.9	30.7			
19 - 20									0.5			
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	3692	3082	2939	2295	2555	2951	2766	2985	2977	2953	3176	2781

Tabel B.191: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Deutsche Bucht i 25.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3		11.8										
3 - 4	10.0	9.6	18.3									
4 - 5	7.5	27.7	13.4	18.8								
5 - 6	51.6	49.8	46.9	16.7								0.5
6 - 7	30.7	1.1	21.3	30.8	9.2							34.9
7 - 8	0.1			28.3	19.5						2.4	29.0
8 - 9				5.4	29.4	3.2					8.5	11.5
9 - 10					22.5	7.7					8.3	12.3
10 - 11					16.6	20.4				0.4	22.4	11.9
11 - 12					2.8	20.3	0.1			2.2	29.3	
12 - 13						24.2	9.0			6.4	18.0	
13 - 14						17.0	14.9			16.5	10.4	
14 - 15						7.2	28.9			32.0	0.7	
15 - 16							25.2	10.5	12.5	29.1		
16 - 17							21.8	33.1	20.8	13.3		
17 - 18								50.4	35.3	0.1		
18 - 19								5.9	31.1			
19 - 20									0.4			
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	3690	3070	2956	2385	2592	2910	2770	2986	2978	3017	3179	2786

Tabel B.192: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Deutsche Bucht i 30.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3		11.5										
3 - 4	9.9	9.8	18.7									
4 - 5	7.6	27.4	13.1	19.4								
5 - 6	50.1	50.0	45.8	16.2								0.4
6 - 7	32.1	1.3	22.4	31.3	9.8							34.6
7 - 8	0.3			27.3	19.1						1.7	29.0
8 - 9				5.8	29.4	3.4					9.0	11.6
9 - 10					22.7	7.9					8.2	12.9
10 - 11					16.1	21.5					21.9	11.5
11 - 12					2.8	19.9	0.6			2.9	30.5	
12 - 13						24.1	8.9			7.0	17.5	
13 - 14						17.0	14.8			18.0	10.7	
14 - 15						6.3	30.0			36.0	0.4	
15 - 16							24.5	10.9	12.1	21.6		
16 - 17							21.1	33.0	20.0	14.4		
17 - 18								50.9	34.9	0.1		
18 - 19								5.3	32.6			
19 - 20									0.3			
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	3689	3078	2957	2386	2595	2942	2767	2987	2833	2762	3176	2780

Tabel B.193: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Drogden i 2.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2	11.3	22.0	1.8									
2 – 3	28.2	27.1	47.9	0.7								5.0
3 – 4	35.0	45.2	41.2	7.2								9.2
4 – 5	22.0	5.8	9.1	31.6								12.7
5 – 6	3.4			35.8	0.7							17.0
6 – 7				16.6	2.7						6.8	28.9
7 – 8				2.6	17.6						16.4	8.4
8 – 9				4.7	16.3						30.2	14.1
9 – 10				0.8	11.2					0.1	24.6	4.4
10 – 11					14.8					11.3	21.0	0.4
11 – 12					15.2	3.0	0.1			16.9	1.1	
12 – 13					10.8	31.4	1.7	0.3	2.0	33.5		
13 – 14					5.6	22.3	10.6	0.6	24.9	32.6		
14 – 15					4.8	16.0	13.1	7.3	14.2	5.6		
15 – 16					0.4	18.5	14.2	13.4	19.2			
16 – 17						7.6	10.5	28.0	20.5			
17 – 18						1.1	15.0	24.6	19.2			
18 – 19							19.2	10.5				
19 – 20							11.5	10.1				
20 – 21							4.0	5.3				
21 – 22							0.2					
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2501	2342	2557	2300	2078	2070	1798	2046	2075	2105	2034	1928

Tabel B.194: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Drogden i 4.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2	11.5	21.2	1.1									
2 – 3	26.7	28.8	47.9	0.6								4.4
3 – 4	32.3	43.4	44.0	7.5								9.2
4 – 5	25.0	6.6	6.9	30.7								13.5
5 – 6	4.2			37.7	0.7							15.9
6 – 7	0.3			15.0	2.7						6.4	29.2
7 – 8				2.7	17.5						18.3	8.0
8 – 9				5.3	16.3						24.3	13.5
9 – 10				0.6	12.4						28.5	5.1
10 – 11					13.7					15.1	20.9	1.2
11 – 12					13.6	3.4	0.2			13.9	1.6	
12 – 13					11.6	31.0	3.1	0.5	1.0	35.7		
13 – 14					8.5	24.4	12.0	0.6	25.4	28.6		
14 – 15					2.9	14.0	15.4	7.7	16.2	6.6		
15 – 16					0.1	19.4	13.3	16.7	18.8			
16 – 17						6.9	11.5	28.7	19.2			
17 – 18						0.9	16.1	23.4	19.6			
18 – 19							18.3	10.5				
19 – 20							8.3	8.2				
20 – 21							1.8	3.7				
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2525	2382	2590	2353	2182	2124	1846	2150	2066	1459	1483	1965

Tabel B.195: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Drogden i 6.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2	11.5	20.6	1.2									
2 – 3	22.7	25.8	47.1	0.5								4.3
3 – 4	33.6	46.6	40.9	6.2								8.1
4 – 5	24.9	7.0	10.8	31.0								14.4
5 – 6	4.7			36.7	0.8							15.9
6 – 7	2.2			16.5	2.9						5.1	29.5
7 – 8	0.4			3.7	18.7						16.4	8.1
8 – 9				4.6	15.8						28.5	10.8
9 – 10				0.6	13.6						26.9	6.6
10 – 11					14.3	0.2				10.9	21.8	2.3
11 – 12					13.4	4.2	0.2			16.8	1.3	
12 – 13					14.2	32.1	3.6	0.7	3.0	41.5		
13 – 14					6.0	22.8	10.2	0.3	27.1	27.4		
14 – 15					0.4	15.3	17.6	7.1	17.9	3.5		
15 – 16						20.5	15.1	18.1	16.2			
16 – 17						4.2	15.8	32.1	18.2			
17 – 18						0.7	15.6	22.6	17.6			
18 – 19							15.3	10.9				
19 – 20							5.9	5.7				
20 – 21							0.6	2.4				
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2527	2382	2591	2353	2183	2124	1844	2143	2124	2171	2061	1965

Tabel B.196: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Drogden i 8.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2	7.7	21.5	1.0									
2 – 3	21.0	24.4	44.6	0.4								4.3
3 – 4	31.5	45.3	44.8	5.9								8.2
4 – 5	26.7	8.8	9.6	26.4								13.9
5 – 6	5.6			45.5	0.7							16.3
6 – 7	5.0			12.8	2.8						5.3	29.5
7 – 8	2.3			4.1	20.8						15.7	7.5
8 – 9	0.1			4.4	14.6						27.6	6.1
9 – 10				0.5	16.1						27.3	9.2
10 – 11					15.5	0.2				11.7	22.8	4.8
11 – 12					14.2	2.7	0.4			19.3	1.4	0.2
12 – 13					12.2	34.6	3.3	0.8	3.0	46.8		
13 – 14					3.1	23.7	9.9	0.4	28.3	21.1		
14 – 15						15.1	19.1	7.0	16.9	1.1		
15 – 16						20.2	17.7	17.3	16.6			
16 – 17						3.4	17.3	32.5	20.3			
17 – 18							14.4	23.4	14.9			
18 – 19							12.6	11.6				
19 – 20							5.1	5.3				
20 – 21							0.2	1.9				
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2480	2382	2588	2352	2186	2122	1846	2143	2124	2171	2062	1965

Tabel B.197: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Drogden i 10.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2	4.3	17.9	0.9									
2 – 3	21.4	30.7	39.2	0.4								3.7
3 – 4	28.6	38.1	50.2	4.4								8.8
4 – 5	31.6	12.2	9.8	25.2								13.5
5 – 6	3.6	0.3		47.3	0.8							15.2
6 – 7	6.3	0.6		14.2	2.8						4.9	30.7
7 – 8	3.7			3.7	20.8						15.0	5.5
8 – 9	0.4			4.3	15.3						26.1	4.8
9 – 10				0.5	17.9						21.0	6.1
10 – 11					19.2					9.9	29.5	11.5
11 – 12					13.5	1.8	0.3			23.4	3.5	0.2
12 – 13					7.5	35.7	2.8	0.8	3.9	52.0		
13 – 14					2.4	24.9	11.1	0.3	28.3	14.2		
14 – 15						15.4	18.9	7.7	18.6	0.6		
15 – 16						20.3	19.7	16.4	16.8			
16 – 17						2.0	15.0	32.4	18.2			
17 – 18							16.5	24.8	14.2			
18 – 19							11.8	11.7				
19 – 20							3.6	4.2				
20 – 21							0.2	1.5				
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2514	2365	2549	2326	2163	2112	1838	2142	2125	2172	2062	1965

Tabel B.198: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Elbe i 3.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2		0.9										
2 - 3		36.6										
3 - 4		39.4	13.4									0.1
4 - 5	42.8	22.5	61.7									11.8
5 - 6	57.2	0.7	18.3	2.3								50.2
6 - 7			6.6	44.3							2.2	17.1
7 - 8				38.3	10.8						10.9	14.6
8 - 9				10.9	27.5						17.3	4.0
9 - 10				3.9	24.4	0.1				2.4	24.2	2.2
10 - 11				0.3	17.5	6.3				11.0	20.1	
11 - 12					13.3	8.4				13.1	19.9	
12 - 13					2.9	13.1	0.1			16.3	2.9	
13 - 14					3.3	30.0	1.2			22.2	2.5	
14 - 15					0.2	15.9	2.8			28.7		
15 - 16						21.6	20.3	1.9	29.9	5.2		
16 - 17						4.6	38.6	6.0	20.4	1.1		
17 - 18							26.5	38.2	8.8			
18 - 19							10.3	31.3	30.3			
19 - 20							0.1	16.9	10.0			
20 - 21								5.1	0.6			
21 - 22								0.5				
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	705	1294	1382	1385	1428	2043	2109	1738	1907	1831	1575	1489

Tabel B.199: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Elbe i 6.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2		0.2										
2 - 3		37.5										
3 - 4		36.0	16.1									
4 - 5	40.6	25.3	60.2	0.1								9.9
5 - 6	59.4	1.0	18.5	6.0								51.7
6 - 7			5.2	48.7	0.3						1.6	16.6
7 - 8				35.2	21.3						10.8	15.3
8 - 9				9.0	27.9						14.9	4.2
9 - 10				1.1	17.5	3.3				0.8	26.4	2.2
10 - 11					19.8	9.7				12.0	20.1	
11 - 12					7.6	4.9				13.5	20.5	
12 - 13					3.8	16.3				15.7	3.1	
13 - 14					1.8	30.5	2.2			22.4	2.5	
14 - 15					0.1	13.9	5.5			28.9		
15 - 16						20.6	29.6	1.8	29.0	5.3		
16 - 17						0.7	35.5	8.1	21.2	1.4		
17 - 18							20.3	48.1	9.1			
18 - 19							6.9	22.8	30.4			
19 - 20								18.2	9.8			
20 - 21								1.0	0.5			
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	704	1281	1376	1390	1436	2063	2093	1738	1909	1830	1567	1475

Tabel B.200: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Elbe i 10.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3		40.2										
3 - 4		29.1	19.7									
4 - 5	29.2	28.3	57.4	0.4								6.2
5 - 6	70.8	2.4	18.6	11.8								53.6
6 - 7			4.3	49.6	4.3						1.1	17.2
7 - 8				32.6	26.4						9.2	16.7
8 - 9				5.4	25.9	0.2					12.3	4.1
9 - 10				0.2	19.4	6.8				0.3	30.4	2.2
10 - 11					12.5	8.7				11.6	20.5	
11 - 12					8.3	5.0				14.2	20.9	
12 - 13					2.9	23.8	1.0			15.4	3.2	
13 - 14					0.2	24.1	3.4			21.8	2.4	
14 - 15						18.7	9.6			28.6		
15 - 16						12.4	34.2	0.9	26.8	6.8		
16 - 17						0.2	30.5	11.1	23.1	1.3		
17 - 18							17.5	58.2	11.0			
18 - 19							3.8	13.1	28.9			
19 - 20								16.6	10.2			
20 - 21								0.2				
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	703	1277	1379	1387	1438	2066	2090	1738	1927	1829	1571	1495

Tabel B.201: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Elbe i 15.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2												
2 – 3		35.8										
3 – 4		31.2	23.6									
4 – 5	14.7	29.2	53.9	0.4								3.8
5 – 6	85.3	3.8	18.8	19.0	0.3							52.6
6 – 7			3.7	43.7	10.1						0.2	17.2
7 – 8				34.1	23.5						8.4	19.7
8 – 9				2.8	28.5	1.3					12.2	4.2
9 – 10					20.6	7.9					29.6	2.5
10 – 11					7.0	7.6				8.9	21.8	
11 – 12					8.1	8.0				16.0	21.7	
12 – 13					1.9	26.1	2.1			13.8	3.6	
13 – 14						20.5	4.9			21.6	2.4	
14 – 15						20.0	11.4			27.6		
15 – 16						8.6	37.3		23.6	10.8		
16 – 17						0.1	25.5	12.8	25.9	1.4		
17 – 18							17.4	62.1	12.9			
18 – 19							1.5	9.4	27.3			
19 – 20								15.6	10.3			
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	702	1267	1370	1378	1438	2070	2091	1738	1908	1830	1553	1484

Tabel B.202: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Elbe i 20.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2												
2 – 3		33.4										
3 – 4		32.3	29.3									
4 – 5	9.2	30.2	48.9	0.7								2.9
5 – 6	90.8	4.1	18.1	32.9	1.3							50.5
6 – 7			3.7	30.2	13.3							18.9
7 – 8				34.4	21.7						8.0	20.7
8 – 9				1.8	29.9	2.1					12.0	4.4
9 – 10					19.5	9.3					29.2	2.6
10 – 11					4.7	6.8				7.0	22.2	
11 – 12					8.2	9.4				16.8	22.8	
12 – 13					1.4	25.3	2.3			12.6	3.4	
13 – 14						22.5	6.3			19.2	2.4	
14 – 15						16.7	11.7			31.0		
15 – 16						7.9	41.4		22.2	11.9		
16 – 17							20.6	13.9	27.0	1.5		
17 – 18							16.6	62.5	13.5			
18 – 19							1.1	9.2	27.0			
19 – 20								14.4	10.3			
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	698	1266	1361	1383	1437	2069	2092	1738	1907	1831	1551	1480

Tabel B.203: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station EMS i 3.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2												
2 – 3		1.3										
3 – 4	3.9	24.0										
4 – 5	13.8	3.7	16.4									
5 – 6	19.8	29.4	48.3	5.6								
6 – 7	56.2	28.4	34.9	35.8	0.7							13.2
7 – 8	6.2	13.2	0.4	33.5	6.8							37.4
8 – 9				15.4	16.7						5.7	23.9
9 – 10				9.6	17.1						10.1	18.0
10 – 11				0.2	27.1	0.2					24.6	7.5
11 – 12					21.7	5.2					25.7	
12 – 13					9.7	22.3				2.0	22.2	
13 – 14					0.1	35.5	0.2			21.9	11.7	
14 – 15						25.1	18.4			26.9	0.1	
15 – 16						9.9	20.2	1.1	7.7	34.2		
16 – 17						1.6	17.3	40.2	36.5	14.6		
17 – 18						0.2	33.9	36.0	20.5	0.5		
18 – 19							8.3	17.8	30.6			
19 – 20							1.7	4.6	4.7			
20 – 21								0.2				
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2869	2492	2288	2156	3206	3325	2563	1506	2492	2922	2119	2560

Tabel B.204: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station EMS i 6.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4	3.5	3.5	0.9									
4 - 5	5.8	5.1	13.5									
5 - 6	20.3	39.2	39.5									
6 - 7	60.4	24.2	45.8	14.8								8.7
7 - 8	10.1	28.0	0.3	50.5	2.3							30.2
8 - 9				22.4	19.1						9.5	21.4
9 - 10				12.3	16.9						4.4	24.3
10 - 11					30.1	0.3					20.8	15.4
11 - 12					22.5	6.3					24.8	
12 - 13					9.1	23.7				1.9	26.1	
13 - 14						37.6	0.2			21.1	11.1	
14 - 15						21.5	17.3			27.2	3.3	
15 - 16						10.0	33.5	2.1	7.0	34.7		
16 - 17						0.5	15.7	43.1	36.5	14.6		
17 - 18							28.4	31.3	20.3	0.4		
18 - 19							4.1	19.0	31.7			
19 - 20							0.8	4.6	4.5			
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	2601	1343	1444	1488	2691	3320	2883	1506	2503	2988	2613	2449

Tabel B.205: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station EMS i 10.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3		1.0										
3 - 4	3.9	24.3										
4 - 5	13.0	3.3	18.2									
5 - 6	19.4	29.6	49.3	8.0								
6 - 7	55.5	28.7	32.5	38.8	0.9							10.5
7 - 8	8.1	13.0		33.5	10.7							31.3
8 - 9				14.9	23.8						4.2	24.2
9 - 10				4.8	21.4						8.6	22.1
10 - 11					22.5	2.5					22.3	11.8
11 - 12					16.9	8.3					25.3	
12 - 13					3.7	23.7				1.8	25.5	
13 - 14						37.6	0.2			21.7	10.9	
14 - 15						21.2	18.8			27.4	3.1	
15 - 16						6.5	39.4	4.5	7.8	34.5		
16 - 17						0.2	14.7	43.7	36.1	14.4		
17 - 18							24.7	32.2	20.4	0.2		
18 - 19							1.9	15.0	31.1			
19 - 20							0.3	4.6	4.4			
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	2982	2487	2292	2166	3178	3311	2866	1498	2524	2986	2608	3021

Tabel B.206: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station EMS i 15.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3		0.5										
3 - 4	3.0	8.1	0.7									
4 - 5	9.6	3.7	16.6	0.2								
5 - 6	27.2	40.1	51.9	13.1								
6 - 7	50.2	29.8	30.7	37.2	0.8							9.6
7 - 8	10.0	17.8		34.2	15.0							32.2
8 - 9				14.8	30.6						3.8	24.8
9 - 10				0.6	19.3	0.1					9.6	21.5
10 - 11					19.4	7.7					22.8	12.0
11 - 12					12.5	11.8					25.6	
12 - 13					2.4	25.9				1.8	24.4	
13 - 14						33.8	0.3			21.6	11.0	
14 - 15						16.5	14.8			27.4	2.8	
15 - 16						4.2	46.6	5.7	7.5	34.5		
16 - 17							18.0	44.7	36.5	14.5		
17 - 18							19.9	32.0	20.3	0.3		
18 - 19							0.4	13.1	31.3			
19 - 20								4.6	4.4			
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	2803	1876	2115	2157	3193	2834	2604	1500	2514	2979	2486	2929

Tabel B.207: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station EMS i 20.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3		0.9										
3 - 4	4.3	32.0	0.2									
4 - 5	13.6	3.7	21.8									
5 - 6	15.5	36.7	70.7	16.1								
6 - 7	52.4	26.7	7.3	43.8	1.3							8.9
7 - 8	14.2			25.4	19.0							31.9
8 - 9				14.5	32.9						3.5	24.4
9 - 10				0.2	18.2	0.8					9.4	21.2
10 - 11					13.9	8.7					21.5	13.6
11 - 12					12.1	12.6					25.4	
12 - 13					2.6	22.6				2.3	25.8	
13 - 14						32.7	0.2			21.1	11.3	
14 - 15						19.6	27.1			27.0	3.1	
15 - 16						3.0	42.0	6.1	8.0	34.9		
16 - 17							15.4	46.2	35.9	14.5		
17 - 18							15.2	34.8	20.7	0.3		
18 - 19								9.4	31.1			
19 - 20								3.5	4.3			
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	2790	1908	1707	1568	2691	3306	2867	1482	2482	2976	2594	3001

Tabel B.208: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station EMS i 25.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2												
2 – 3		0.4										
3 – 4	4.1	24.9	0.2									
4 – 5	12.7	2.3	15.8									
5 – 6	18.1	28.2	53.7	16.3								2.4
6 – 7	52.7	30.7	30.2	46.3	1.3							14.3
7 – 8	12.6	13.6		23.3	19.7							23.7
8 – 9				14.1	33.1						3.0	24.1
9 – 10				0.1	19.7	1.6					9.8	21.2
10 – 11					12.0	10.2					21.6	14.3
11 – 12					11.8	13.1					24.9	
12 – 13					2.4	23.3				1.7	26.0	
13 – 14						28.9	0.2			21.4	11.3	
14 – 15						20.1	27.7			26.7	3.4	
15 – 16						2.7	42.7	6.5	7.5	35.3		
16 – 17							15.2	45.0	36.5	14.4		
17 – 18							14.2	36.6	20.5	0.5		
18 – 19								9.9	31.1			
19 – 20								2.1	4.4			
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2980	2473	2267	1599	2664	3192	2871	1501	2483	2971	2599	3013

Tabel B.209: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station EMS i 30.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3		0.6										
3 - 4	3.7	22.9										
4 - 5	10.7	1.8	15.2									
5 - 6	15.2	31.6	52.3	1.2								
6 - 7	55.9	29.3	32.5	30.5								7.8
7 - 8	14.5	13.8		49.2	14.2							32.8
8 - 9				19.0	32.9						3.1	23.7
9 - 10				0.1	20.5	1.7					10.0	20.8
10 - 11					16.7	11.0					22.0	15.0
11 - 12					13.3	11.5					25.3	
12 - 13					2.4	21.8				1.7	25.3	
13 - 14						32.1	0.2			21.5	11.2	
14 - 15						19.4	27.9			26.8	3.1	
15 - 16						2.4	43.0	6.4	7.8	35.1		
16 - 17							15.1	45.4	36.3	14.6		
17 - 18							13.8	37.7	20.5	0.3		
18 - 19								9.1	31.0			
19 - 20								1.4	4.4			
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	2696	2216	1860	1456	2644	3316	2870	1500	2491	2971	2548	2989

Tabel B.210: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Farøi 2.8 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1		11.9										
1 - 2	1.2	26.5										11.6
2 - 3	46.5	6.5	8.2									28.4
3 - 4	33.1	15.2	49.5	0.1								37.5
4 - 5	19.2	21.1	41.1	38.5							11.2	20.4
5 - 6		18.8	1.2	17.2							11.4	2.2
6 - 7				11.4							15.5	
7 - 8				18.2						2.1	40.2	
8 - 9				5.3	0.1					11.9	21.7	
9 - 10				9.2	16.9					14.6		
10 - 11					35.5					22.9		
11 - 12					14.5					13.9		
12 - 13					8.9	2.2				12.4		
13 - 14					23.9	21.0			7.2	20.8		
14 - 15					0.1	26.4	3.6	18.3	67.8	1.5		
15 - 16						35.3	67.5	13.0	25.0			
16 - 17						15.0	21.3	35.6				
17 - 18							7.6	33.1				
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	1441	672	744	719	744	580	696	744	720	1353	1430	1463

Tabel B.211: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Farøi 5.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1		12.5										
1 - 2	1.7	26.8										12.3
2 - 3	48.4	5.8	9.8									29.1
3 - 4	32.4	16.1	53.4	3.2								36.2
4 - 5	17.5	20.1	35.6	36.2							11.3	20.4
5 - 6		18.8	1.2	17.9							12.5	2.0
6 - 7				10.3							14.3	
7 - 8				17.9						2.2	40.0	
8 - 9				6.0	0.5					11.7	21.9	
9 - 10				8.5	18.4					14.6		
10 - 11					35.9					22.7		
11 - 12					13.1					14.0		
12 - 13					8.1	3.1				12.9		
13 - 14					24.0	23.0			10.8	20.5		
14 - 15						24.7	3.7	17.6	65.4	1.3		
15 - 16						34.6	67.2	12.3	23.8			
16 - 17						14.5	20.6	36.7				
17 - 18							8.5	33.3				
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	1438	672	744	719	743	578	695	738	713	1350	1429	1461

Tabel B.212: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Farøi 8.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1		11.5										
1 - 2	1.5	27.6										11.7
2 - 3	48.7	6.4	8.5									27.8
3 - 4	30.8	14.2	50.0									37.2
4 - 5	19.0	21.2	39.9	36.7							11.2	20.5
5 - 6		19.2	1.6	18.3							10.7	2.7
6 - 7				11.9							14.7	
7 - 8				18.6						2.1	39.6	
8 - 9				5.9						11.6	23.8	
9 - 10				8.7	19.3					14.6		
10 - 11					37.3					22.1		
11 - 12					11.5					14.9		
12 - 13					8.1	3.3				12.6		
13 - 14					23.9	22.7			9.4	20.3		
14 - 15						23.1	3.2	16.8	64.4	1.9		
15 - 16						36.8	68.1	13.6	26.2			
16 - 17						14.1	18.7	34.5				
17 - 18							10.0	35.1				
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	1432	671	744	716	742	576	690	736	711	1347	1427	1456

Tabel B.213: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Farøi 11.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1		12.1										
1 - 2	1.5	27.1										11.4
2 - 3	47.1	6.4	5.9									27.1
3 - 4	32.1	14.2	55.1	2.4								37.7
4 - 5	19.3	20.9	37.0	33.7							11.5	21.3
5 - 6		19.4	2.0	20.8							11.6	2.6
6 - 7				9.8							14.0	
7 - 8				18.9						2.2	40.9	
8 - 9				5.9	0.5					11.5	21.9	
9 - 10				8.5	21.0					14.5		
10 - 11					35.8					21.6		
11 - 12					10.8					15.4		
12 - 13					8.1	3.7				12.6		
13 - 14					23.7	22.9			8.8	20.5		
14 - 15						23.2	2.3	15.4	66.3	1.6		
15 - 16						36.5	66.9	13.6	24.9			
16 - 17						13.8	20.3	34.8				
17 - 18							10.5	36.2				
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	1426	671	744	715	742	573	686	733	706	1340	1422	1449

Tabel B.214: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Farøi 14.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		1.9										
0 - 1		18.8										
1 - 2	12.0	21.0										20.9
2 - 3	45.5	8.5	18.2									34.0
3 - 4	36.8	18.5	63.6	9.8							0.4	25.8
4 - 5	5.7	17.0	18.2	35.2							15.8	19.3
5 - 6		14.2		13.7							13.5	
6 - 7				19.2							22.3	
7 - 8				8.1						4.0	40.9	
8 - 9				13.2	8.9					15.4	7.1	
9 - 10				0.7	30.6					12.3		
10 - 11					21.4					24.2		
11 - 12					13.7	1.6				13.7		
12 - 13					19.9	9.6				17.0		
13 - 14					5.5	22.7			22.8	13.5		
14 - 15						37.1	14.7	17.3	62.7			
15 - 16						24.1	63.2	19.4	14.5			
16 - 17						4.9	22.1	51.6				
17 - 18								11.7				
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	1422	670	742	713	739	572	682	728	702	1335	1417	1448

Tabel B.215: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Farøi 21.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1		11.1										
1 - 2	1.8	26.8										9.5
2 - 3	13.4	10.4	2.2									25.6
3 - 4	44.0	9.3	57.5	0.4							0.1	36.9
4 - 5	37.6	19.7	37.4	30.0							8.7	22.6
5 - 6	3.3	22.7	3.0	24.5							13.8	5.4
6 - 7				12.7						0.1	17.0	
7 - 8				17.6						2.9	40.3	
8 - 9				6.8	6.1					10.8	20.0	
9 - 10				8.0	22.1					14.1	0.2	
10 - 11					29.3					20.1		
11 - 12					11.4	0.2				17.4		
12 - 13					8.8	9.5				12.4		
13 - 14					22.1	17.9			6.1	20.2		
14 - 15						21.6	1.6	12.8	65.4	2.0		
15 - 16						37.0	61.4	14.6	28.4			
16 - 17						13.7	25.8	34.5				
17 - 18						0.2	11.2	38.1				
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	798	665	738	710	736	570	679	727	700	1325	1410	1437

Tabel B.216: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station "Early"Flinten i 1.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2		6.5	2.4									
2 - 3	13.2	67.7	58.1									
3 - 4	41.3	25.7	39.5	27.0								1.6
4 - 5	43.7			21.5								22.1
5 - 6	1.9			32.0								32.6
6 - 7				19.6	6.1						75.3	43.1
7 - 8					13.9						24.7	0.7
8 - 9					29.8							
9 - 10					23.5					1.3		
10 - 11					12.3	0.1				30.6		
11 - 12					2.3				10.2	9.1		
12 - 13					11.0	1.2			20.6	21.0		
13 - 14					1.1	12.3	10.9	0.9	11.6	16.0		
14 - 15						36.2	20.4	24.8	6.9	18.5		
15 - 16						23.5	15.2	24.2	36.7	3.5		
16 - 17						14.1	5.8	0.3	9.2			
17 - 18						9.5	4.6	24.5	4.9			
18 - 19						2.4	21.4	17.3				
19 - 20						0.7	20.8	8.1				
20 - 21							0.9					
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	744	672	744	945	739	1344	1484	1486	1417	519	251	743

Tabel B.217: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station "Early"Flinten i 7.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6												
6 - 7												
7 - 8												
8 - 9												
9 - 10												
10 - 11												
11 - 12									13.9			
12 - 13									48.1			
13 - 14							27.3	0.4	22.8			
14 - 15							63.5	49.4	15.2			
15 - 16							9.2	50.1				
16 - 17								0.1				
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	744	672	744	945	739	1344	370	739	697	519	251	743

Tabel B.218: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Flinten i 3.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0	0.5	8.4	7.7									
0 - 1	5.3	6.8	7.9	0.2								0.2
1 - 2	18.5	22.4	3.6	3.8								1.3
2 - 3	30.5	38.5	25.2	5.2								7.7
3 - 4	34.6	20.1	47.3	14.3							1.7	20.2
4 - 5	8.7	3.4	8.1	30.2							5.4	24.0
5 - 6	1.8	0.4	0.2	27.5	2.5						5.1	19.9
6 - 7	0.1			12.9	7.5						9.5	17.3
7 - 8				3.7	24.0						23.9	8.0
8 - 9				1.9	28.2					6.0	25.4	1.2
9 - 10				0.3	19.8	3.8				9.0	22.3	0.3
10 - 11					9.1	5.4			0.4	12.5	4.8	0.1
11 - 12					5.1	11.6	1.8		1.6	31.6	1.7	
12 - 13					3.8	23.9	4.7		3.7	23.8	0.2	
13 - 14						26.6	5.9		6.6	14.0		
14 - 15						19.8	16.5	1.3	27.2	3.1		
15 - 16						7.2	19.0	16.1	19.4			
16 - 17						1.0	8.2	13.9	25.8			
17 - 18						0.8	18.4	8.1	8.6			
18 - 19							14.4	13.2	2.2			
19 - 20							7.0	14.9	0.7			
20 - 21							1.8	12.1	2.2			
21 - 22							1.9	6.7	1.7			
22 - 23							0.4	12.9				
23 - 24								0.6				
> 24												
antal	4581	4494	4570	4030	4606	4058	3782	3587	4081	3796	4102	4382

Tabel B.219: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Flinten i 4.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0	0.2	7.4	5.9									
0 - 1	4.1	4.6	7.4									
1 - 2	14.0	21.6	3.6	2.9								0.3
2 - 3	31.0	38.3	26.1	6.2								6.9
3 - 4	32.9	21.5	46.0	13.1							1.2	14.6
4 - 5	13.4	4.9	10.6	30.9	0.1						4.9	24.9
5 - 6	3.3	0.9	0.5	29.4	2.4						3.8	21.4
6 - 7	1.1	0.7		13.3	9.5						10.2	19.9
7 - 8		0.1		3.1	22.8						21.6	10.3
8 - 9				1.1	31.2	0.1				5.0	25.9	1.0
9 - 10					19.2	3.9			0.2	7.9	23.1	0.4
10 - 11					7.6	6.0			1.9	16.5	5.8	0.3
11 - 12					3.0	11.1	2.4		3.1	34.8	3.3	
12 - 13					4.1	25.0	3.8	0.1	4.3	21.6	0.2	
13 - 14						27.2	5.7	0.1	8.0	11.4		
14 - 15						18.7	16.2	1.4	28.4	2.9		
15 - 16						6.4	18.0	17.9	18.9			
16 - 17						0.8	11.4	14.3	23.1			
17 - 18						0.8	17.7	8.2	6.6			
18 - 19							15.2	15.8	1.7			
19 - 20							6.5	11.7	0.6			
20 - 21							1.7	13.2	1.8			
21 - 22							1.3	8.6	1.4			
22 - 23								8.7				
23 - 24								0.1				
> 24												
antal	4583	4446	4544	4027	4662	4058	3892	3603	3795	4011	4211	4383

Tabel B.220: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Flinten i 6.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		6.7	6.1									
0 - 1	3.7	5.4	6.5									
1 - 2	11.4	20.7	4.2	2.2								
2 - 3	28.0	37.9	26.7	7.3								6.3
3 - 4	34.8	22.4	46.8	16.7							0.5	14.4
4 - 5	13.3	4.0	9.4	31.7	0.2						4.2	22.3
5 - 6	5.8	1.4	0.3	28.9	3.1						4.9	22.8
6 - 7	2.5	1.1		10.3	10.6						9.1	21.4
7 - 8	0.4	0.3		2.3	26.8						22.2	11.0
8 - 9				0.6	29.5	0.3				5.0	27.4	1.0
9 - 10					17.1	4.3			0.2	6.4	20.4	0.3
10 - 11					6.1	6.7			2.9	18.4	7.2	0.3
11 - 12					2.9	13.7	2.3		3.6	34.9	4.0	
12 - 13					3.7	25.1	3.8	0.1	3.2	20.7		
13 - 14						25.7	6.6	0.1	8.6	10.6		
14 - 15						16.3	16.9	1.0	30.5	4.0		
15 - 16						6.4	20.9	19.7	19.0			
16 - 17						1.2	9.3	15.2	21.9			
17 - 18						0.3	18.8	11.5	6.2			
18 - 19							12.8	13.9	1.7			
19 - 20							6.2	13.5	0.7			
20 - 21							1.4	12.9	1.0			
21 - 22							1.0	7.8	0.5			
22 - 23								4.1				
23 - 24												
> 24												
antal	4583	4455	4560	4029	4662	4060	3752	3602	3831	4083	4209	4382

Tabel B.221: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Flinten i 7.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		6.6	5.3									
0 - 1	3.0	3.6	5.9									
1 - 2	10.9	21.7	4.3	1.8								
2 - 3	23.5	36.1	23.4	7.6								5.6
3 - 4	36.3	24.7	50.0	14.7							0.3	13.2
4 - 5	13.3	4.2	10.6	31.4	0.2						3.0	21.2
5 - 6	7.7	1.6	0.5	30.9	3.4						4.7	22.5
6 - 7	3.7	1.2		11.0	10.7						8.9	22.7
7 - 8	1.6	0.4		1.9	27.7						22.1	12.8
8 - 9				0.7	28.9	0.3				4.2	28.4	1.2
9 - 10					16.3	4.3			0.3	6.9	20.6	0.3
10 - 11					6.3	7.4			3.4	18.8	7.3	0.3
11 - 12					3.1	14.8	2.0		3.7	36.0	4.6	
12 - 13					3.3	24.6	4.0	0.1	3.3	20.2	0.1	
13 - 14						24.8	6.1	0.2	9.3	9.8		
14 - 15						16.0	17.4	1.7	30.0	4.0		
15 - 16						6.5	21.8	20.7	21.7			
16 - 17						1.0	10.0	16.4	19.6			
17 - 18						0.2	18.8	10.8	6.2			
18 - 19							11.7	12.7	1.0			
19 - 20							6.0	14.3	0.4			
20 - 21							1.1	13.3	0.5			
21 - 22							0.9	7.1	0.6			
22 - 23								2.6				
23 - 24												
> 24												
antal	4579	4441	4560	3927	4662	4054	3891	3537	3835	4089	4211	4383

Tabel B.222: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Flinten i 9.1 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		6.6	5.6									
0 - 1	2.9	4.3	5.3									
1 - 2	10.7	21.1	4.1	1.5								
2 - 3	25.6	36.2	27.1	7.7								5.5
3 - 4	33.4	24.5	45.5	17.9							0.3	13.0
4 - 5	13.9	4.1	12.0	30.8	0.2						3.0	21.6
5 - 6	7.8	1.6	0.5	28.6	3.9						4.6	21.6
6 - 7	3.2	1.2		11.3	13.2						9.2	23.1
7 - 8	2.5	0.4		1.4	27.2						22.6	13.1
8 - 9				0.8	29.9	0.6				4.4	27.9	1.4
9 - 10					12.8	4.5			0.3	7.2	21.4	0.3
10 - 11					5.3	7.4			3.4	19.4	6.5	0.3
11 - 12					3.8	13.7	2.0		3.5	36.5	4.5	
12 - 13					3.6	23.2	3.8	0.1	3.6	18.9	0.1	
13 - 14						24.1	6.4	0.4	9.5	9.9		
14 - 15						18.1	18.4	1.9	28.5	3.7		
15 - 16						7.0	21.7	20.8	20.4			
16 - 17						1.1	10.1	15.3	21.4			
17 - 18						0.2	18.1	13.0	7.1			
18 - 19							11.6	12.5	1.0			
19 - 20							5.7	13.7	0.3			
20 - 21							1.2	13.5	0.5			
21 - 22							0.9	6.0	0.5			
22 - 23								2.7				
23 - 24												
> 24												
antal	4583	4423	4539	4016	3921	3632	3872	3635	4047	4086	4211	4383

Tabel B.223: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Gamle Bro i 5.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		0.4										
0 - 1	5.1	10.5	6.1									
1 - 2	20.7	12.1	9.8									1.5
2 - 3	26.1	26.0	26.4	1.6								7.2
3 - 4	28.4	33.9	27.3	4.2								16.8
4 - 5	15.5	6.2	29.1	18.9								10.7
5 - 6	4.2	10.9	1.3	23.1							0.1	17.2
6 - 7				33.4	0.8						9.6	23.9
7 - 8				14.0	7.7						24.4	13.4
8 - 9				2.9	11.9	0.4				1.9	32.9	9.2
9 - 10				1.6	17.5	2.7				3.6	18.4	
10 - 11				0.3	25.6	12.6	0.1			10.9	9.7	
11 - 12					18.1	20.0	1.9			7.6	4.9	
12 - 13					10.2	22.6	3.2			35.2		
13 - 14					5.7	16.9	9.0	0.3	1.9	33.3		
14 - 15					2.4	15.6	16.7	1.8	25.1	7.6		
15 - 16					0.2	8.1	15.5	13.4	28.7			
16 - 17						1.1	16.4	37.8	32.3			
17 - 18							15.7	19.2	7.9			
18 - 19							12.9	8.2	4.2			
19 - 20							6.4	8.4				
20 - 21							1.9	5.8				
21 - 22							0.3	3.6				
22 - 23								1.5				
23 - 24												
> 24												
antal	3048	3367	3372	2464	3493	2666	2789	2938	2865	2965	3119	3700

Tabel B.224: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Gamle Bro i 10.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1	4.8	10.6	6.0									
1 – 2	19.2	11.5	7.8									1.5
2 – 3	28.0	27.0	28.0	1.5								6.7
3 – 4	27.6	33.5	28.1	4.3								17.1
4 – 5	15.3	6.0	29.0	18.9								9.5
5 – 6	5.0	11.4	1.1	24.6								18.8
6 – 7				33.8	1.4						9.8	23.2
7 – 8				12.2	12.2	0.3					20.4	13.2
8 – 9				2.7	14.7	2.0				1.7	34.2	10.0
9 – 10				1.8	22.4	8.9				3.7	19.9	
10 – 11				0.2	24.6	17.5	1.0			11.1	10.3	
11 – 12					14.7	23.5	5.7			7.0	5.4	
12 – 13					6.3	22.5	6.3			35.4		
13 – 14					3.2	11.8	9.9	0.6	2.5	32.9		
14 – 15					0.5	9.2	15.6	2.9	24.8	8.2		
15 – 16						4.1	15.3	15.9	30.7	0.1		
16 – 17						0.2	15.8	37.7	32.0			
17 – 18							12.9	17.6	6.3			
18 – 19							10.4	8.3	3.8			
19 – 20							5.4	8.8				
20 – 21							1.5	4.7				
21 – 22							0.1	2.7				
22 – 23								1.0				
23 – 24												
> 24												
antal	3049	3375	3379	2466	3492	2666	2792	2939	2869	2968	2939	3704

Tabel B.225: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Gamle Bro i 15.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1	4.0	9.9	5.7									
1 – 2	17.9	11.2	4.2									0.7
2 – 3	29.4	26.4	30.6	1.5								6.3
3 – 4	27.1	35.1	26.8	4.3								17.8
4 – 5	16.2	5.8	31.8	18.3								8.6
5 – 6	5.4	11.6	0.9	26.8	1.2						0.4	20.2
6 – 7				35.0	6.3	0.4					10.8	22.3
7 – 8				10.1	17.6	3.1					21.4	13.6
8 – 9				2.2	16.5	8.8	1.0			0.8	31.0	10.5
9 – 10				1.7	24.3	17.2	3.8			4.4	20.2	
10 – 11					19.6	17.7	3.3			11.0	10.6	
11 – 12					10.1	22.0	6.3			6.7	5.6	
12 – 13					3.5	18.7	5.8			34.6		
13 – 14					0.9	5.9	11.0	2.3	4.0	33.4		
14 – 15						4.5	14.7	5.4	24.8	9.0		
15 – 16						1.5	14.5	18.7	33.0			
16 – 17							15.8	34.9	27.4			
17 – 18							9.0	16.8	7.3			
18 – 19							8.2	8.3	3.5			
19 – 20							5.3	7.1				
20 – 21							1.3	3.3				
21 – 22								2.0				
22 – 23								1.1				
23 – 24												
> 24												
antal	3052	3371	3374	2467	3443	2667	2789	2940	2866	2967	3123	3704

Tabel B.226: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Gamle Bro i 20.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1	4.4	10.4	5.9									
1 – 2	19.1	11.5	7.6									1.6
2 – 3	27.7	25.5	27.7	1.5								7.1
3 – 4	28.1	35.3	29.1	4.2								19.6
4 – 5	14.9	5.1	29.1	20.0								9.2
5 – 6	5.8	12.2	0.6	27.7	3.0						0.5	22.2
6 – 7				35.3	11.1	2.0					14.0	25.9
7 – 8				7.3	23.8	8.9					27.7	13.7
8 – 9				2.3	16.6	15.3	0.2			2.3	28.7	0.8
9 – 10				1.7	21.2	17.5	2.2			5.4	16.1	
10 – 11					14.7	17.2	3.9			16.1	8.6	
11 – 12					7.5	19.9	5.2			7.3	4.4	
12 – 13					1.7	13.0	6.9	0.8		29.6		
13 – 14					0.4	2.6	12.9	3.7	2.9	31.8		
14 – 15						2.9	16.1	5.3	25.3	7.6		
15 – 16						0.7	17.6	19.7	34.0			
16 – 17							13.9	34.1	30.9			
17 – 18							8.2	17.8	4.3			
18 – 19							8.3	7.5	2.5			
19 – 20							4.4	6.0				
20 – 21							0.2	2.6				
21 – 22								2.1				
22 – 23								0.5				
23 – 24												
> 24												
antal	3053	3373	3380	2468	3459	2551	2562	2618	2604	2074	2434	3310

Tabel B.227: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Gamle Bro i 22.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0	0.1	0.4	0.3									
0 - 1	4.8	10.8	5.8									
1 - 2	21.0	11.7	9.3									2.3
2 - 3	26.2	25.4	26.2	1.5								8.2
3 - 4	27.3	34.4	29.5	4.3								21.8
4 - 5	14.8	5.4	28.6	20.7								10.4
5 - 6	5.7	11.8	0.4	27.8	4.4						1.0	19.9
6 - 7				35.0	16.2		0.1				16.3	24.1
7 - 8				6.8	25.8	3.4	0.5				31.2	12.5
8 - 9				2.2	16.7	14.7	0.5			2.4	27.9	0.8
9 - 10				1.7	17.1	17.4	0.3			4.5	16.7	
10 - 11					12.4	20.0	0.3			13.4	6.8	
11 - 12					5.5	23.7	2.1			6.6		
12 - 13					1.8	14.4	4.1			32.5		
13 - 14					0.1	2.7	16.0			16.8		
14 - 15						2.9	17.2	0.8	24.7	23.5		
15 - 16						0.8	18.2	29.1	32.7	0.3		
16 - 17							14.7	41.9	42.5			
17 - 18							9.2	8.3	0.2			
18 - 19							10.8	4.7				
19 - 20							5.9	7.1				
20 - 21							0.1	3.8				
21 - 22								4.1				
22 - 23								0.3				
23 - 24												
> 24												
antal	3056	3376	3385	2468	2841	1949	1650	1459	1460	2423	1723	2965

Tabel B.228: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Hjelm Bugt i 6.7 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1	0.7	10.2	6.0									
1 – 2	16.9	24.3	18.1									
2 – 3	38.8	34.2	31.2	1.7								3.8
3 – 4	20.9	28.7	40.9	19.9								17.4
4 – 5	16.0	2.6	3.8	45.2								12.0
5 – 6	6.7			22.1	0.1							32.1
6 – 7				8.3	7.9							18.6
7 – 8				2.8	24.4						35.5	15.7
8 – 9					15.4						35.1	0.5
9 – 10					18.5					10.5	18.5	
10 – 11					14.8	0.7				5.0	4.8	
11 – 12					10.5	7.1	0.1			21.7	5.4	
12 – 13					5.7	18.5	0.4	0.2	6.4	29.2	0.7	
13 – 14					2.6	21.5	0.8	2.8	6.3	17.2		
14 – 15					0.2	17.1	4.3	4.2	12.1	8.7		
15 – 16						22.7	26.9	4.1	32.4	5.9		
16 – 17						11.1	27.3	10.7	12.3	1.7		
17 – 18						1.2	14.7	10.5	5.7			
18 – 19							11.4	28.5	8.2			
19 – 20							9.2	15.9	12.0			
20 – 21							4.5	14.5	4.6			
21 – 22							0.6	8.5				
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2905	2680	2919	2345	2194	2116	2225	2132	2115	2174	1838	2468

Tabel B.229: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Hjelm Bugt i 10.2 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1	1.2	13.6	7.5									
1 – 2	19.5	23.6	18.6									
2 – 3	35.8	30.3	28.9	2.7								3.3
3 – 4	21.2	28.7	43.1	22.0								17.0
4 – 5	15.9	3.8	1.9	49.7								11.2
5 – 6	6.3			20.6	0.2							29.9
6 – 7				2.5	6.7							20.3
7 – 8				2.3	29.4						31.6	15.6
8 – 9				0.3	26.4	0.5				0.6	37.3	2.7
9 – 10					13.8	2.0	0.5	0.4		9.2	17.1	
10 – 11					11.3	6.0	0.9	1.6		6.9	6.4	
11 – 12					6.7	11.5	2.2	1.7		19.2	4.5	
12 – 13					3.9	20.9	4.4	1.6	7.7	26.7	3.2	
13 – 14					0.7	15.1	8.7	2.5	11.0	18.4		
14 – 15					0.7	14.7	15.0	6.2	15.7	11.3		
15 – 16						21.6	37.7	10.2	23.0	5.2		
16 – 17						6.7	23.8	13.6	14.7	2.3		
17 – 18						0.9	6.1	18.0	4.8			
18 – 19							0.7	23.1	6.7			
19 – 20								10.1	13.0			
20 – 21								9.8	3.5			
21 – 22								1.3				
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2901	2679	2919	2344	2194	2113	2225	2108	2115	2174	1838	2467

Tabel B.230: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Hjelm Bugt i 15.4 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
−2 – −1												
−1 – 0												
0 – 1	1.0	12.6	7.0									
1 – 2	11.9	20.3	15.0									
2 – 3	41.0	27.1	37.8	4.5								1.1
3 – 4	21.5	30.5	39.0	26.4								10.3
4 – 5	15.8	8.2	1.2	53.5	1.0							11.4
5 – 6	6.7	0.7		12.8	8.2							27.4
6 – 7	1.9	0.6		0.7	4.1	0.7						25.1
7 – 8	0.1			2.0	38.5	3.4	1.2				20.8	17.0
8 – 9					22.5	8.3	5.4	0.9	0.1	0.2	31.1	7.7
9 – 10					14.4	7.1	7.6	1.2	1.2	5.3	26.7	
10 – 11					8.7	9.6	19.7	3.5	1.3	9.2	11.5	
11 – 12					1.0	15.2	7.8	7.5	1.0	13.7	4.7	
12 – 13					1.5	18.4	8.1	16.7	8.0	22.9	5.1	
13 – 14						19.8	8.1	13.7	14.1	25.9		
14 – 15						8.4	18.3	10.2	15.5	12.1		
15 – 16						6.4	15.9	10.3	24.2	6.5		
16 – 17						2.0	6.0	7.8	17.8	4.0		
17 – 18						0.6	1.8	10.6	2.5			
18 – 19								5.0	4.3			
19 – 20								9.1	9.5			
20 – 21								3.5	0.6			
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2905	2680	2919	2344	2194	2116	2225	2132	2115	2174	1838	2468

Tabel B.231: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Hjelm Bugt i 21.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1	0.3	0.1										
1 – 2	2.5	1.1	5.5									
2 – 3	33.8	27.4	38.3	5.5								
3 – 4	29.5	47.2	54.9	39.6								2.1
4 – 5	7.6	13.2	1.2	54.9	34.8							7.3
5 – 6	10.5	7.8			55.8	9.8						19.2
6 – 7	8.5	3.3			5.7	19.2					0.4	33.8
7 – 8	7.2				3.3	32.9					9.5	17.7
8 – 9					0.4	17.6	4.7				20.9	14.5
9 – 10						9.5	12.8	8.1	2.8		24.9	5.6
10 – 11						9.3	41.0	30.1	1.3	0.9	20.5	
11 – 12						1.3	19.3	25.6	13.5	4.2	9.9	
12 – 13						0.3	10.7	13.1	17.2	28.5	13.9	
13 – 14						0.2	3.4	16.9	17.0	38.8		
14 – 15							6.3	3.8	40.9	22.8		
15 – 16							1.6	1.8	6.9	4.8		
16 – 17								0.4				
17 – 18								0.2	0.1			
18 – 19									0.4			
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2905	2680	2919	2344	2173	2116	2214	2132	2115	2184	1838	2468

Tabel B.232: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Kiel i m dybde. Tallene er givet i %.
Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
−2 – −1												
−1 – 0	1.0	0.1										
0 – 1	12.0	4.2										
1 – 2	12.8	7.3										0.7
2 – 3	6.8	38.5	13.3									11.1
3 – 4	42.2	28.1	29.2	2.2								23.0
4 – 5	23.6	20.1	52.9	14.8							3.9	21.3
5 – 6	1.5	1.6	4.7	33.1							2.4	12.6
6 – 7				29.8	0.9						8.7	16.3
7 – 8				10.4	3.9						17.4	5.2
8 – 9				7.4	13.9					1.0	34.6	9.7
9 – 10				1.9	20.0					6.3	15.8	
10 – 11				0.4	15.7					12.3	11.9	
11 – 12					10.0	1.6				20.4	4.6	
12 – 13					15.3	9.1				35.1	0.7	
13 – 14					14.6	15.0	0.6		10.7	23.1		
14 – 15					5.3	26.2	0.8		26.4	1.8		
15 – 16					0.3	32.2	20.5	3.1	13.1			
16 – 17						12.3	18.4	10.2	21.4			
17 – 18						3.6	19.7	39.5	12.9			
18 – 19						0.2	21.1	13.8	8.1			
19 – 20							13.5	8.2	2.0			
20 – 21							3.1	10.5	3.0			
21 – 22							2.3	8.0	2.4			
22 – 23							0.1	6.7				
23 – 24												
> 24												
antal	3931	3828	3686	3935	4039	3403	3496	3124	2458	2592	3301	3511

Tabel B.233: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Kiel i 1.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
−2 – −1												
−1 – 0	1.0											
0 – 1	11.2	4.0										
1 – 2	13.0	7.1										0.5
2 – 3	6.8	36.9	11.0									10.8
3 – 4	40.9	29.2	29.1	1.7								22.9
4 – 5	23.5	21.2	55.0	15.0							3.7	20.8
5 – 6	3.6	1.5	4.8	32.2							2.6	12.8
6 – 7				30.9	0.8						7.5	15.9
7 – 8				10.4	3.6						17.3	6.2
8 – 9				7.2	14.1					0.9	35.0	10.0
9 – 10				2.0	20.1					6.4	16.3	
10 – 11				0.6	15.6					12.0	11.7	
11 – 12					10.3	1.5				19.9	5.3	
12 – 13					15.1	8.9				35.2	0.7	
13 – 14					14.5	15.1	0.5		10.2	23.7		
14 – 15					5.5	25.6	0.7		26.7	1.9		
15 – 16					0.2	32.5	20.6	2.8	13.3			
16 – 17						12.4	18.6	9.3	21.2			
17 – 18						3.9	19.1	39.4	12.6			
18 – 19						0.1	21.1	14.2	8.7			
19 – 20							14.0	9.1	1.9			
20 – 21							3.1	10.6	2.9			
21 – 22							2.3	7.9	2.6			
22 – 23								6.7				
23 – 24												
> 24												
antal	3935	3834	3693	3938	4044	3397	3496	3123	2458	2588	3298	3512

Tabel B.234: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Kiel i 2.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2	9.7											0.5
2 - 3	7.9	40.7	16.0									11.0
3 - 4	51.2	32.2	23.6	2.8								23.1
4 - 5	29.4	25.2	54.8	14.2							3.6	20.7
5 - 6	1.8	1.8	5.6	32.0							2.7	13.0
6 - 7				28.6	1.2						7.4	15.9
7 - 8				11.2	2.7						17.7	6.0
8 - 9				8.7	10.9					0.9	35.2	9.8
9 - 10				2.2	16.3					6.3	15.7	
10 - 11				0.3	15.0					12.2	12.1	
11 - 12					12.7	1.4				20.2	4.9	
12 - 13					18.0	9.0				34.9	0.7	
13 - 14					16.7	16.0	0.6		10.1	23.6		
14 - 15					6.4	29.1	0.7		26.9	1.9		
15 - 16					0.2	27.3	21.0	2.8	13.2			
16 - 17						12.8	18.4	9.5	21.2			
17 - 18						4.3	19.9	40.2	13.3			
18 - 19						0.2	20.9	13.6	8.0			
19 - 20							13.7	9.0	1.8			
20 - 21							2.8	10.2	2.9			
21 - 22							2.0	8.5	2.6			
22 - 23								6.2				
23 - 24												
> 24												
antal	3244	3177	2986	3222	3297	2705	3495	3124	2461	2585	3301	3514

Tabel B.235: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Kiel i 4.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1	11.7	4.7										
1 - 2	13.7	8.4										0.3
2 - 3	5.1	40.3	13.4									12.3
3 - 4	47.5	33.5	31.0	2.5								27.3
4 - 5	21.9	12.3	52.2	16.1							4.0	23.1
5 - 6		0.7	3.3	31.7							3.5	13.8
6 - 7				32.6	1.5						8.7	12.6
7 - 8				9.7	4.9						17.9	7.7
8 - 9				5.3	14.7					0.8	30.6	2.9
9 - 10				1.9	21.4					6.4	14.6	
10 - 11				0.2	16.8	0.4				11.3	14.3	
11 - 12					10.8	3.3				20.6	5.5	
12 - 13					15.3	7.3				34.0	0.8	
13 - 14					9.6	15.8	0.7		10.1	25.0		
14 - 15					4.9	23.3	1.5		26.9	2.0		
15 - 16					0.1	36.7	23.2	2.9	13.1			
16 - 17						10.8	21.0	10.4	19.4			
17 - 18						2.3	17.0	43.3	15.4			
18 - 19							20.4	10.6	7.6			
19 - 20							12.2	8.8	1.8			
20 - 21							2.9	10.4	3.0			
21 - 22							1.1	8.5	2.6			
22 - 23								5.2				
23 - 24												
> 24												
antal	2929	3237	3229	3651	3697	2813	3440	3106	2449	2566	2546	2683

Tabel B.236: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Kiel i 8.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1	6.6	3.6										
1 - 2	11.6	7.5										
2 - 3	12.8	36.0	12.7									7.4
3 - 4	41.0	29.6	29.9	5.6								24.1
4 - 5	26.2	21.9	56.0	20.6							1.3	19.0
5 - 6	1.9	1.5	1.4	36.9							3.8	13.8
6 - 7				27.5	5.9						5.3	18.7
7 - 8				6.1	10.8	0.4					18.8	7.1
8 - 9				2.7	16.8	1.3					32.3	9.9
9 - 10				0.6	18.8	1.9	0.3			6.9	14.7	
10 - 11					16.9	4.3	0.7	0.1		10.2	14.6	
11 - 12					9.4	10.0	1.6	0.4		21.5	8.0	
12 - 13					12.7	13.6	2.8	1.0		31.1	1.2	
13 - 14					7.5	14.2	8.7	2.7	9.6	28.4		
14 - 15					1.2	24.4	11.0	4.9	30.2	2.1		
15 - 16						28.6	25.8	14.3	12.9			
16 - 17						1.2	17.6	22.7	19.0			
17 - 18						0.1	14.0	23.7	19.7			
18 - 19							11.8	7.0	1.7			
19 - 20							5.6	11.7	4.0			
20 - 21							0.1	9.5	2.9			
21 - 22								1.9				
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	3932	3837	3703	3942	4045	3412	3482	3120	2462	2581	3257	3502

Tabel B.237: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Kiel i 13.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1	0.2											
1 – 2	14.5	9.2	8.3	1.3								2.5
2 – 3	13.6	39.0	15.3	4.3								4.3
3 – 4	43.6	41.1	40.8	30.1	1.4							15.3
4 – 5	23.7	9.9	35.7	24.9	5.4							22.1
5 – 6	4.3	0.8		34.2	16.7						1.9	20.0
6 – 7	0.2			5.3	18.2						8.1	20.1
7 – 8					20.5	11.9	0.6				19.2	9.7
8 – 9					14.2	20.1	4.7	0.2			18.3	5.5
9 – 10					16.1	27.3	10.9	3.6		3.5	23.2	0.7
10 – 11					3.0	21.4	15.1	13.4		14.9	15.9	
11 – 12					1.8	10.2	21.7	10.2	0.4	21.6	13.2	
12 – 13					2.7	4.6	19.2	6.2	1.2	19.3	0.2	
13 – 14						3.2	11.8	13.9	18.9	36.7		
14 – 15						1.4	5.3	22.2	41.8	4.0		
15 – 16							1.3	18.4	18.7			
16 – 17							1.8	8.1	14.7			
17 – 18							3.9	2.7	4.3			
18 – 19							3.7	1.3				
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	3238	3176	2986	3218	3303	2698	3486	3122	2458	2581	3330	3510

Tabel B.238: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Læsø Rende i 6.2 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1	13.0	0.2	0.3									
1 - 2	14.7	15.9	11.2									3.6
2 - 3	10.2	12.4	14.6									9.7
3 - 4	19.8	22.2	42.9	0.6								13.5
4 - 5	30.0	42.2	31.0	33.9	0.1							17.2
5 - 6	11.7	6.8		39.5	3.3						2.1	25.3
6 - 7	0.3	0.5		18.3	6.6						15.4	29.5
7 - 8	0.3			6.8	8.8						8.0	0.5
8 - 9				0.8	17.4	0.1					11.0	0.7
9 - 10					15.0						21.5	
10 - 11					18.7	7.2	0.1				19.9	
11 - 12					20.1	19.2	0.7			8.8	10.3	
12 - 13					6.8	33.7	4.0			35.0	11.8	
13 - 14					3.0	13.2	6.5	0.6	24.8	54.3		
14 - 15					0.3	14.8	19.3	1.1	27.6	1.9		
15 - 16						9.6	22.5	15.3	32.0			
16 - 17						1.8	24.2	36.1	13.1			
17 - 18						0.5	14.4	34.7	2.5			
18 - 19							7.9	12.1				
19 - 20							0.4					
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	660	1299	1397	2118	2212	1420	1338	1298	1382	1091	712	743

Tabel B.239: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Læsø Rende i 10.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1		0.1										
1 – 2	0.8	4.9	2.4									2.3
2 – 3	0.8	3.9	3.5									8.9
3 – 4	9.5	12.3	24.4	0.6								3.6
4 – 5	31.0	41.6	55.5	45.5	7.9							13.5
5 – 6	29.8	26.8	14.2	46.9	21.0						1.5	15.7
6 – 7	27.5	10.6		6.8	27.7						10.1	28.1
7 – 8	0.3			0.2	17.9						9.0	18.7
8 – 9	0.5				7.1						15.0	9.2
9 – 10					4.7	2.5					22.1	
10 – 11					9.6	24.9	5.3			2.1	19.4	
11 – 12					3.7	44.0	19.2			12.8	9.3	
12 – 13					0.4	20.4	27.1	7.6	1.8	38.6	13.6	
13 – 14						6.8	30.2	3.7	29.0	46.3		
14 – 15						1.4	10.2	8.6	27.4	0.2		
15 – 16							4.7	37.3	30.0			
16 – 17							2.9	30.6	11.1			
17 – 18							0.2	12.0	0.7			
18 – 19							0.1	0.2				
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	662	1297	1397	2118	2216	1420	1327	1296	1382	1091	712	743

Tabel B.240: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Læsø Rende i 15.8 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2		2.4										1.2
2 – 3		0.8										5.2
3 – 4	3.2	9.3	9.2	0.2								2.7
4 – 5	28.1	35.6	60.3	44.5	15.6							7.8
5 – 6	22.8	34.1	30.6	55.2	24.7						2.0	7.4
6 – 7	43.4	17.7			33.8						6.5	10.6
7 – 8	1.9				7.9						11.8	27.2
8 – 9	0.6				5.8	2.3					16.4	37.8
9 – 10					4.6	13.7					21.8	
10 – 11					6.6	52.4	16.0			9.3	18.7	
11 – 12					0.9	31.2	32.0	4.1		14.4	8.7	
12 – 13						0.4	38.0	7.0	3.6	33.4	14.2	
13 – 14							12.0	1.0	41.2	43.0		
14 – 15							2.0	21.7	19.8			
15 – 16								39.3	32.3			
16 – 17								26.5	3.1			
17 – 18								0.4				
18 – 19												
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	680	1299	1397	2118	2216	1420	1340	1298	1382	1091	712	743

Tabel B.241: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Læsø Rende i 21.1 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2		2.3										0.1
2 - 3		0.2										1.6
3 - 4	1.7	5.9	4.7	0.4								1.9
4 - 5	28.3	31.9	60.3	50.7	25.3							4.7
5 - 6	19.7	38.0	35.0	48.9	19.0						1.8	11.3
6 - 7	43.7	21.8			34.9						4.2	7.9
7 - 8	5.7				10.3						13.6	18.8
8 - 9	0.9				6.0	13.3					17.8	53.6
9 - 10					2.2	22.3					20.4	
10 - 11					2.2	59.1	36.6			12.3	18.4	
11 - 12					0.1	5.2	20.0			12.4	8.1	
12 - 13							33.4			31.4	15.6	
13 - 14							4.9	0.1	12.2	43.7		
14 - 15							5.0	7.4	21.8	0.2		
15 - 16								50.9	59.7			
16 - 17								41.5	6.3			
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	664	1299	1362	1405	1480	707	595	744	680	1091	712	743

Tabel B.242: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station "Early"Ndr. Røse i 2.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2	7.9	19.3	20.8									1.8
2 - 3	22.5	58.8	10.0									7.4
3 - 4	38.5	21.9	31.6	10.6								14.5
4 - 5	31.1		37.4	34.4								8.5
5 - 6			0.2	22.9							2.6	35.9
6 - 7				27.1	1.6						32.8	25.4
7 - 8				5.0	13.8					5.2	37.7	6.5
8 - 9					24.1					28.2	22.1	
9 - 10					13.7					13.0	4.0	
10 - 11					8.1				0.8	16.8	0.9	
11 - 12					13.8	0.1			13.2	15.2		
12 - 13					16.1	1.4			14.1	10.7		
13 - 14					7.4	6.0	0.8	0.4	18.0	3.4		
14 - 15					1.3	18.9	14.6	9.5	10.0	7.5		
15 - 16						35.8	26.5	37.5	32.5			
16 - 17						27.3	12.4	7.7	7.0			
17 - 18						9.0	12.0	26.9	4.4			
18 - 19						1.0	14.2	14.0				
19 - 20						0.5	16.3	4.0				
20 - 21							3.2					
21 - 22							0.1					
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	743	753	1484	1216	744	1365	1481	1482	1429	1276	1176	739

Tabel B.243: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station "Early"Ndr. Røse i 7.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2		7.9	5.0									
2 - 3		41.1	14.7									
3 - 4		51.0	42.2	15.6								
4 - 5			38.1	44.4								
5 - 6				24.3								
6 - 7				15.5	28.1							
7 - 8				0.2	52.4							
8 - 9					15.8							
9 - 10					3.2							
10 - 11						0.5			7.8			
11 - 12						11.0			38.2			
12 - 13						11.2			17.1			
13 - 14					0.6	14.1	1.8	1.8	30.5			
14 - 15						47.6	49.3	40.1	6.5			
15 - 16						14.4	41.9	56.9				
16 - 17						1.2	6.2	1.2				
17 - 18							0.8					
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	743	202	1189	1216	349	645	737	740	709	1276	1176	739

Tabel B.244: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Ndr. Røse i 2.9 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0	4.3	0.2	6.9									
0 - 1	8.6	7.1	8.2									0.7
1 - 2	11.5	25.2	4.5	2.8								2.9
2 - 3	22.6	38.9	25.7	4.6							0.2	8.6
3 - 4	35.2	23.1	43.8	9.8							0.8	25.5
4 - 5	12.7	5.3	10.7	30.0							5.8	28.2
5 - 6	4.7	0.1	0.3	25.7							7.7	22.7
6 - 7	0.3			17.6	2.2						14.6	7.2
7 - 8				6.3	11.7					0.3	24.6	2.4
8 - 9				1.6	16.7	0.1				5.9	24.1	1.6
9 - 10				1.6	23.3	1.1				8.0	15.1	0.2
10 - 11					18.2	2.9				16.4	6.3	
11 - 12					11.4	5.8	0.6		2.6	33.0	0.7	
12 - 13					10.4	19.6	1.2		5.0	17.8		
13 - 14					4.3	30.0	3.6		3.0	14.7		
14 - 15					1.7	21.1	4.1	1.7	25.3	3.5		
15 - 16						13.4	25.6	12.4	22.5	0.5		
16 - 17						5.3	14.4	15.5	23.1			
17 - 18						0.6	15.3	6.7	10.7			
18 - 19							25.7	12.4	2.2			
19 - 20							6.4	16.2	1.2			
20 - 21							1.9	19.8	4.1			
21 - 22							1.2	9.0	0.1			
22 - 23							0.1	6.0				
23 - 24								0.3				
> 24												
antal	5109	4095	4800	4343	4604	4566	4195	3236	3535	5137	4905	4617

Tabel B.245: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Ndr. Røse i 4.4 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0	1.1		5.0									
0 - 1	6.8	6.9	6.9									0.1
1 - 2	12.9	22.9	6.3	1.5								2.1
2 - 3	25.4	45.3	27.1	5.1							0.1	7.3
3 - 4	32.9	18.3	42.7	10.0							0.9	24.0
4 - 5	11.9	6.4	11.3	31.4							5.1	27.3
5 - 6	8.0	0.2	0.7	26.5							6.3	24.2
6 - 7	0.9			17.2	1.4						13.8	10.3
7 - 8	0.1			5.5	10.8					0.3	21.7	2.1
8 - 9				1.4	19.2	0.1				5.3	29.5	1.8
9 - 10				1.5	22.6	0.6				7.6	13.2	0.9
10 - 11					20.2	3.7				15.8	7.8	0.1
11 - 12					10.5	6.5	0.2		3.1	33.9	1.6	
12 - 13					10.4	20.6	1.4		4.0	19.0		
13 - 14					4.3	28.7	2.6		4.0	13.9		
14 - 15					0.6	19.6	5.6	1.6	25.2	3.4		
15 - 16						14.6	26.0	13.6	22.4	0.8		
16 - 17						5.1	11.9	14.5	22.0			
17 - 18						0.5	13.7	8.5	11.9			
18 - 19							29.5	12.5	2.3			
19 - 20							6.3	15.5	1.7			
20 - 21							2.1	20.7	3.2			
21 - 22							0.6	7.9	0.3			
22 - 23								5.1				
23 - 24												
> 24												
antal	5107	4095	4800	4343	4603	4221	3878	3236	3540	5132	4904	4613

Tabel B.246: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Ndr. Røse i 5.9 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0	1.7		6.5									
0 - 1	6.6	6.6	4.0									0.1
1 - 2	9.8	27.2	10.5	1.5								1.5
2 - 3	28.1	41.1	26.6	5.2							0.1	5.6
3 - 4	27.9	17.8	40.7	16.3							0.7	23.2
4 - 5	12.8	6.5	11.3	30.3							3.7	26.8
5 - 6	9.3	0.6	0.3	26.8							7.7	21.9
6 - 7	2.0			14.9	3.5						13.4	12.8
7 - 8	1.5			2.8	13.8	0.1				0.9	25.3	3.9
8 - 9	0.2			1.0	21.2	0.1				5.9	25.1	2.0
9 - 10				1.3	24.7	2.0				6.2	14.4	1.1
10 - 11					18.6	3.1			0.1	19.3	8.1	1.0
11 - 12					7.9	9.7	0.2		6.3	33.0	1.6	
12 - 13					9.0	23.8	0.8		3.0	20.2		
13 - 14					1.2	26.3	3.2	0.1	5.3	11.2		
14 - 15						18.4	8.1	1.9	28.9	3.1		
15 - 16						12.7	27.0	16.2	19.3	0.2		
16 - 17						3.7	14.6	15.9	23.6			
17 - 18						0.2	19.7	9.7	10.3			
18 - 19							22.5	14.2	1.8			
19 - 20							3.4	17.4	1.4			
20 - 21							0.5	18.8	0.2			
21 - 22								5.5				
22 - 23								0.3				
23 - 24												
> 24												
antal	5110	4095	4800	4343	4604	4566	4191	3234	3538	5138	4904	4616

Tabel B.247: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Ndr. Røse i 7.4 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0	1.4		5.6									
0 - 1	5.0	4.4	2.9									0.1
1 - 2	6.5	21.2	5.7	1.2								1.1
2 - 3	17.9	42.1	27.1	4.0								4.1
3 - 4	34.6	23.6	45.7	15.7							0.5	17.6
4 - 5	16.1	7.1	12.2	34.9							2.2	23.3
5 - 6	8.8	1.2	0.7	27.5	0.8						5.3	22.5
6 - 7	5.2	0.4		13.7	8.3						13.4	15.4
7 - 8	3.2			1.6	19.2	0.3					21.1	8.5
8 - 9	1.3			0.7	22.9	0.2				4.5	28.4	3.7
9 - 10				0.7	23.0	2.5				7.2	16.7	1.2
10 - 11					11.7	6.7			1.5	17.6	9.2	2.3
11 - 12					7.4	13.2	0.1	0.1	6.4	37.3	3.2	
12 - 13					6.3	23.8	0.5	0.8	6.3	20.9		
13 - 14					0.3	23.9	4.0	0.3	9.1	9.9		
14 - 15						18.3	12.8	3.0	28.7	2.5		
15 - 16						9.7	32.1	18.6	20.3	0.1		
16 - 17						1.3	14.8	18.2	21.4			
17 - 18						0.1	16.9	12.8	6.0			
18 - 19							17.3	17.2	0.3			
19 - 20							1.2	18.3	0.1			
20 - 21							0.3	8.9				
21 - 22								1.8				
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	5110	4095	4800	4307	4605	4544	4190	3251	3539	5137	4902	4617

Tabel B.248: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Ndr. Røse i 9.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0	1.4		5.6									
0 - 1	4.2	5.1	1.9									0.2
1 - 2	6.0	19.9	6.5	0.9								1.0
2 - 3	21.5	45.6	29.6	3.1								3.4
3 - 4	28.5	21.9	42.4	16.2							0.4	16.3
4 - 5	15.6	5.9	13.9	40.4							2.1	23.2
5 - 6	9.0	1.2	0.2	28.0	3.7						4.9	21.1
6 - 7	6.8	0.3		9.7	12.4						11.7	15.3
7 - 8	4.8	0.2		0.7	22.9	0.7				0.2	22.1	9.8
8 - 9	2.1			0.3	27.3	1.6				4.2	27.0	4.2
9 - 10				0.8	15.2	4.6			0.1	7.4	16.4	2.3
10 - 11					8.3	10.6		0.2	3.8	22.3	11.6	2.9
11 - 12					4.5	14.1	0.4	1.0	8.6	36.0	3.5	0.4
12 - 13					5.5	21.4	1.7	1.2	8.3	19.0	0.2	
13 - 14					0.2	21.5	8.8	1.4	11.2	8.5		
14 - 15						17.2	21.8	6.6	27.9	2.4		
15 - 16						7.6	28.1	21.9	19.4			
16 - 17						0.7	12.2	18.4	17.2			
17 - 18							16.4	12.3	3.5			
18 - 19							10.3	17.9				
19 - 20							0.3	13.3				
20 - 21								5.0				
21 - 22								1.0				
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	5110	4095	4799	4343	4603	4550	4017	3235	3540	5137	4905	4617

Tabel B.249: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Ndr. Røse i 10.6 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0	0.5		3.6									
0 - 1	2.6	2.0	2.5									
1 - 2	3.8	13.6	3.4									0.4
2 - 3	13.1	39.7	27.0	1.1								2.0
3 - 4	28.9	31.6	40.2	12.1							0.2	9.3
4 - 5	18.4	10.3	20.8	39.1							1.1	17.5
5 - 6	11.5	1.9	2.4	34.8	5.6						3.3	22.0
6 - 7	7.6	0.5		11.2	22.4	0.4					8.1	20.6
7 - 8	9.9	0.5		1.0	27.0	4.0					16.9	12.6
8 - 9	2.9			0.3	23.8	6.1				1.2	28.4	6.9
9 - 10	0.9			0.5	9.1	10.2	0.9	0.1	2.6	7.7	18.9	2.7
10 - 11					5.4	13.7	2.1	1.4	6.6	21.4	12.3	3.8
11 - 12					3.3	12.1	3.6	2.0	8.2	37.4	8.9	2.2
12 - 13					3.4	15.7	8.0	2.0	15.1	20.4	1.9	
13 - 14						19.7	17.3	5.4	12.2	9.4		
14 - 15						14.3	21.5	13.8	21.4	2.2		
15 - 16						3.5	27.1	21.3	17.6	0.2		
16 - 17						0.3	7.7	20.0	12.8			
17 - 18							6.7	14.4	3.6			
18 - 19							5.3	11.1				
19 - 20								5.4				
20 - 21								2.8				
21 - 22								0.3				
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	5132	4095	4800	4676	4899	4381	3463	3473	3669	5093	4900	4617

Tabel B.250: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station North Sea i 3.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5		17.0	40.3									
5 - 6	24.8	81.1	49.1	28.9								
6 - 7	5.9	1.9	10.7	35.6	1.6							0.2
7 - 8	66.1			19.4	19.8							
8 - 9	3.1			14.2	13.3							40.4
9 - 10				1.9	17.3							45.4
10 - 11					24.5							13.9
11 - 12					21.2	2.4					0.4	
12 - 13					2.3	11.7					57.2	
13 - 14						21.9	3.4				26.5	
14 - 15						50.6	14.9			33.8	15.9	
15 - 16						13.5	3.5		33.1	66.2		
16 - 17							25.4	10.7	18.6			
17 - 18							33.2	46.3	43.4			
18 - 19							17.8	21.2	4.9			
19 - 20							1.8	21.8				
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	829	672	795	1258	1008	676	1107	707	878	681	446	416

Tabel B.251: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station North Sea i 12.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5		7.9	23.6									
5 - 6	23.7	49.1	28.8	19.4								
6 - 7	7.7	43.0	47.6	31.1	1.0							0.2
7 - 8	65.5			35.5	13.3							
8 - 9	3.0			13.1	19.4							41.0
9 - 10				0.8	29.1	3.1						45.0
10 - 11					19.9	8.8					6.3	13.8
11 - 12					16.5	7.2					9.1	
12 - 13					0.8	18.9				4.6	64.9	
13 - 14						28.9	8.1			9.0	12.3	
14 - 15						31.0	7.2			27.3	7.4	
15 - 16						2.1	24.6		18.3	57.3		
16 - 17							16.9	7.7	34.0	1.7		
17 - 18							34.3	37.6	34.9			
18 - 19							8.9	30.4	5.3			
19 - 20								14.8	7.4			
20 - 21								4.0				
21 - 22								5.6				
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	894	1156	1339	1949	1846	1331	1443	1434	1586	1373	956	420

Tabel B.252: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station North Sea i 15.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5		6.7	19.6									
5 - 6	23.6	50.3	22.2									
6 - 7	8.4	43.0	58.2	36.6								0.2
7 - 8	64.9			55.4	13.8							
8 - 9	3.1			7.9	20.3							41.0
9 - 10				0.1	25.3	5.1						44.5
10 - 11					27.0	2.0					6.2	14.3
11 - 12					13.3	7.2					9.3	
12 - 13					0.3	22.7				4.8	64.8	
13 - 14						38.9	9.7			8.8	12.2	
14 - 15						24.0	15.3			27.7	7.5	
15 - 16						0.1	29.2	0.1	18.9	57.4		
16 - 17							21.9	8.1	33.5	1.3		
17 - 18							23.3	62.3	35.3			
18 - 19							0.6	21.1	5.0			
19 - 20								8.4	7.4			
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	898	1156	1095	1371	1439	891	1454	1436	1590	1373	953	420

Tabel B.253: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station North Sea i 20.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5		8.4	23.3									
5 - 6	23.6	48.6	29.2	22.2								
6 - 7	7.9	43.0	47.5	46.8	2.5							0.2
7 - 8	65.3			30.6	28.8							
8 - 9	3.2			0.5	18.1	9.3						39.6
9 - 10					32.7	45.4						45.1
10 - 11					12.9	2.3	1.0				6.5	15.1
11 - 12					5.0	3.8	6.2				8.8	
12 - 13						17.7	10.8	0.8		4.8	64.7	
13 - 14						15.9	30.8	10.7		8.8	12.9	
14 - 15						5.6	12.0	10.1	0.1	28.2	7.1	
15 - 16							18.1	9.5	23.0	56.8		
16 - 17							19.4	29.2	39.2	1.4		
17 - 18							1.7	38.2	33.3			
18 - 19								1.5	3.5			
19 - 20									0.8			
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	898	1156	1341	1969	1690	1280	1443	1415	1586	1372	958	417

Tabel B.254: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station North Sea i 25.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5		31.2	23.7									
5 - 6	28.7	25.8	28.7	24.5								
6 - 7	9.1	43.0	47.6	48.3	3.3							
7 - 8	62.2			27.2	36.6	20.1						
8 - 9				0.1	29.5	20.0						
9 - 10					20.5	20.1	0.1					
10 - 11					5.0	0.2	28.9				8.6	
11 - 12					0.7	5.1	13.5	2.9			20.7	
12 - 13					4.5	24.2	18.7	26.8		7.0	64.4	
13 - 14						10.3	19.6	11.9		12.8	6.3	
14 - 15						0.1	3.2	6.5	0.2	40.0		
15 - 16							2.1	4.9	37.7	38.3		
16 - 17							13.7	39.5	43.8	1.9		
17 - 18								7.4	18.3			
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	738	1156	1338	1976	1837	1271	1451	1431	1581	947	725	417

Tabel B.255: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station North Sea i 30.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5		9.9	21.4									
5 - 6	23.7	47.1	30.7	25.2								
6 - 7	8.0	43.0	47.9	48.6	3.5							0.2
7 - 8	65.3			26.2	36.5	22.1						
8 - 9	3.0				42.9	18.0						41.4
9 - 10					12.2	20.3	0.1					35.6
10 - 11							31.1				6.5	22.8
11 - 12						9.2	12.1	10.4			9.0	
12 - 13					5.0	30.4	28.1	24.6		4.7	62.6	
13 - 14							13.0	10.0		8.9	14.1	
14 - 15							7.5	9.5	0.1	25.5	7.8	
15 - 16							4.1	10.6	36.8	60.3		
16 - 17							4.1	21.9	45.6	0.6		
17 - 18								12.9	17.5			
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	893	1156	1330	1971	1843	1265	1455	1429	1585	1373	957	413

Tabel B.256: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Oder i 3.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1	2.6	10.8										3.6
1 - 2	26.1	36.6	1.4								0.3	15.8
2 - 3	52.1	37.3	17.2	0.1							2.1	19.6
3 - 4	19.2	15.3	59.6	4.8							4.9	11.4
4 - 5			18.0	14.0							7.3	30.6
5 - 6			3.2	22.0							8.5	13.3
6 - 7			0.7	33.3						0.2	15.6	5.6
7 - 8				9.2	0.6					0.4	20.4	
8 - 9				10.2	6.1					5.8	23.2	
9 - 10				4.2	10.0					17.8	17.5	
10 - 11				1.7	15.7					18.0		
11 - 12				0.3	18.1	0.3				12.2		
12 - 13				0.1	20.9	6.0				19.6		
13 - 14					11.8	3.5			1.7	22.1		
14 - 15					10.7	11.7	1.4		15.7	3.9		
15 - 16					5.5	33.3	15.0		24.4			
16 - 17					0.4	23.6	14.7		16.3			
17 - 18						16.1	12.9	20.2	16.9			
18 - 19						5.2	15.3	12.6	11.7			
19 - 20						0.3	22.8	14.7	7.4			
20 - 21							11.1	30.3	4.1			
21 - 22							6.3	7.3	1.9			
22 - 23							0.3	11.9				
23 - 24								3.0				
> 24												
antal	1819	1761	1631	2217	2671	3152	2919	2186	2529	2255	1813	2196

Tabel B.257: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Oder i 12.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1		7.4										
1 - 2	20.4	16.5										8.4
2 - 3	40.7	32.2	4.0	1.2								25.1
3 - 4	7.4	15.8	61.9	10.5							0.5	17.5
4 - 5			15.2	13.5							8.6	28.9
5 - 6	0.7		3.0	29.1	0.9						10.7	12.0
6 - 7	15.8	9.0	12.7	40.2	6.9						15.5	8.2
7 - 8	15.0	19.0	3.1	5.4	4.5						19.7	
8 - 9				0.1	18.5					4.2	20.6	
9 - 10					17.7					13.8	18.8	
10 - 11					23.4	3.3				17.1	4.6	
11 - 12					13.2	7.7			0.8	15.8	1.0	
12 - 13					9.1	13.4			3.9	17.4		
13 - 14					2.4	5.9	0.4		2.8	22.1		
14 - 15					3.3	23.2	5.6		18.1	9.5		
15 - 16						27.6	21.6	0.1	24.8			
16 - 17						15.0	26.8	5.4	15.7			
17 - 18						4.0	14.8	36.1	11.2			
18 - 19							12.4	30.5	20.8			
19 - 20							16.9	19.5	1.7			
20 - 21							1.5	8.5				
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	1840	1750	1633	2207	2656	3187	3105	1996	2750	2767	2201	2295

Tabel B.258: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Østerrenden Nord i 3.3 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
−2 – −1												
−1 – 0	0.3											
0 – 1	11.3	39.2	12.2									
1 – 2	32.8	14.4	6.8									1.1
2 – 3	41.5		11.7									16.0
3 – 4	9.3	14.0	38.2									14.4
4 – 5	4.8	29.1	30.3	31.5								5.7
5 – 6		3.3	0.7	38.9							1.4	22.0
6 – 7				13.9							25.6	22.5
7 – 8				15.3	4.2						42.2	17.1
8 – 9				0.4	18.1					7.1	27.1	1.1
9 – 10					12.4					19.2	3.7	
10 – 11					19.0					15.7		
11 – 12					16.1					16.9		
12 – 13					12.5					12.2		
13 – 14					9.4	2.7			1.7	15.4		
14 – 15					7.9	16.2	4.7		12.9	13.5		
15 – 16					0.5	49.4	8.6	0.1	11.1			
16 – 17						25.2	21.4	9.9	40.8			
17 – 18						6.1	27.5	11.1	8.3			
18 – 19						0.3	18.7	25.4	7.0			
19 – 20							11.8	15.5	18.2			
20 – 21							5.7	23.2				
21 – 22							1.6	11.4				
22 – 23								3.2				
23 – 24												
> 24												
antal	1488	1253	1483	1428	1488	1440	1488	1480	1437	1484	1437	1397

Tabel B.259: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Østerrenden Nord i 5.8 m dybde. Tal-
lene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1	6.0	35.6	9.2									
1 - 2	20.8	17.0	7.9									
2 - 3	54.4	1.0	11.9									11.9
3 - 4	13.2	13.6	34.5									17.2
4 - 5	5.5	26.0	36.3	27.4								6.1
5 - 6		6.7	0.2	41.9							0.1	20.4
6 - 7				15.4							18.3	22.8
7 - 8				15.1	6.0						37.2	18.7
8 - 9				0.2	17.5					1.9	37.4	2.9
9 - 10					13.2					17.6	6.9	
10 - 11					18.3					17.4	0.2	
11 - 12					17.6					19.1		
12 - 13					14.2	0.3				13.0		
13 - 14					9.2	7.1				14.7		
14 - 15					3.8	26.0	4.5		11.4	16.2		
15 - 16					0.1	39.3	9.1		13.2			
16 - 17						23.8	19.6	8.4	41.5			
17 - 18						3.4	34.3	12.0	8.1			
18 - 19							13.6	27.1	10.4			
19 - 20							13.0	24.5	15.3			
20 - 21							5.5	16.8				
21 - 22							0.4	9.6				
22 - 23								1.7				
23 - 24												
> 24												
antal	1488	1253	1483	1428	1488	1440	1488	1480	1437	1485	1429	1399

Tabel B.260: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Østerrenden Nord i 9.8 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0			0.2									
0 - 1	1.4	30.4	9.0									
1 - 2	13.2	21.3	6.6									
2 - 3	58.3	1.9	3.6									9.6
3 - 4	20.1	13.2	42.8									12.9
4 - 5	6.5	27.1	37.7	32.1								10.0
5 - 6	0.5	6.1		46.1	0.4						0.1	24.3
6 - 7				15.5	8.9						15.6	20.6
7 - 8				6.3	14.2	0.9					32.1	18.1
8 - 9					21.4	4.7				2.1	39.6	4.4
9 - 10					18.5	5.3				16.7	11.1	0.1
10 - 11					20.1	9.7				16.8	1.5	
11 - 12					10.2	10.0				20.3		
12 - 13					4.4	12.2				12.9		
13 - 14					1.7	14.9	0.7			14.7		
14 - 15					0.2	20.9	8.8	0.3	11.0	16.5		
15 - 16						17.5	16.5	3.0	21.4			
16 - 17						3.8	36.8	17.5	41.9			
17 - 18						0.1	21.2	20.1	12.6			
18 - 19							10.2	33.4	7.9			
19 - 20							5.4	18.5	5.3			
20 - 21							0.4	5.4				
21 - 22								1.8				
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	1488	1253	1483	1428	1488	1440	1488	1480	1437	1485	1432	1402

Tabel B.261: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Østerrenden Nord i 14.9 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1		2.2	0.9									
1 – 2	1.1	25.5	2.4									
2 – 3	39.8	24.3	4.9									2.9
3 – 4	30.2	11.9	27.5									8.4
4 – 5	21.1	27.1	59.7	33.0								7.1
5 – 6	6.7	8.9	4.6	59.0	32.5	1.7					0.1	22.8
6 – 7	1.0			7.7	50.1	22.5					7.3	32.2
7 – 8				0.3	11.6	32.9	0.3				13.4	12.1
8 – 9					3.2	15.0	2.6				32.9	8.4
9 – 10					2.6	5.0	3.4			9.6	22.7	3.7
10 – 11						2.8	6.2			19.0	19.6	2.2
11 – 12						3.2	7.9	0.2		19.8	4.1	
12 – 13						6.1	9.0	3.2	0.1	17.4		
13 – 14						5.9	24.2	15.8	1.6	14.4		
14 – 15						2.6	16.1	23.4	36.9	19.8		
15 – 16						2.1	11.4	12.3	30.7			
16 – 17						0.2	10.2	13.4	29.7			
17 – 18							5.0	18.6	0.8			
18 – 19							3.2	12.6	0.1			
19 – 20							0.3	0.4				
20 – 21								0.1				
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	1488	1253	1483	1428	1488	1440	1488	1459	1377	1482	1394	1399

Tabel B.262: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Romsø Tue Fyr i 7.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4	26.2											
4 - 5	34.9	75.4	46.3									60.2
5 - 6	38.9	24.6	46.9									12.4
6 - 7			6.7	61.6							15.8	27.4
7 - 8				24.9							19.8	
8 - 9				13.0	3.7						2.8	
9 - 10				0.6	18.8		0.1				16.8	
10 - 11					15.0	1.1	0.5				12.4	
11 - 12					15.1	8.5	1.6			30.1	32.2	
12 - 13					35.3	25.8	1.8		0.2	45.8	0.2	
13 - 14					12.0	23.9	2.3		14.3	19.9		
14 - 15					0.1	10.8	14.0	3.6	14.9	4.2		
15 - 16						19.4	25.7	24.0	52.9			
16 - 17						7.7	37.3	41.3	16.7			
17 - 18						2.5	14.1	22.8	1.2			
18 - 19						0.5	2.6	8.0				
19 - 20								0.4				
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	728	655	682	692	835	846	1111	1406	1296	998	469	635

Tabel B.263: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Romsø Tue Fyr i 10.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4	12.1											
4 - 5	40.0	74.4	43.4									54.5
5 - 6	46.0	25.6	49.6									17.6
6 - 7	1.9		7.0	67.9							8.2	27.6
7 - 8				19.1	3.2						25.8	0.3
8 - 9				13.0	22.5	1.9	1.8				3.2	
9 - 10					29.2	6.5	5.1				10.7	
10 - 11					12.2	15.8	3.1				17.9	
11 - 12					17.2	18.0	4.4			25.2	34.2	
12 - 13					13.2	27.1	7.7	0.6	0.2	54.5		
13 - 14					2.5	18.3	10.7	2.7	15.7	15.9		
14 - 15						6.9	17.7	13.6	34.6	4.4		
15 - 16						5.3	21.4	44.9	46.0			
16 - 17						0.2	21.2	26.7	3.5			
17 - 18							6.7	7.9				
18 - 19							0.1	3.4				
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	728	655	682	692	836	846	1037	1392	1297	999	476	635

Tabel B.264: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Romsø Tue Fyr i 12.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2												
2 – 3												
3 – 4												
4 – 5		28.1	44.0									45.0
5 – 6	100.0	71.9	47.7									25.5
6 – 7			8.4	72.1	2.9						5.9	27.7
7 – 8				14.9	26.0	1.1					27.5	1.7
8 – 9				13.0	36.5	15.7	6.5				2.9	
9 – 10					10.0	23.5	13.0				8.2	
10 – 11					13.9	23.4	12.1				19.3	
11 – 12					7.5	17.7	9.9	1.1		28.9	36.1	
12 – 13					3.2	16.1	6.5	5.7	0.1	49.6		
13 – 14						1.5	8.3	17.4	19.0	17.6		
14 – 15						0.9	16.9	28.0	58.2	3.8		
15 – 16							16.8	36.3	21.7			
16 – 17							6.5	8.4	0.9			
17 – 18							3.4	1.7				
18 – 19								1.3				
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	1	128	682	692	836	846	1090	1394	1297	999	476	635

Tabel B.265: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Romsø Tue Fyr i 14.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4	1.9											
4 - 5	20.6	71.5	47.3									40.6
5 - 6	57.0	28.5	46.9									23.9
6 - 7	19.9		5.9	76.6	20.9						4.4	32.9
7 - 8	0.5			14.5	48.0	13.2	1.5				28.6	2.5
8 - 9				9.0	15.9	49.9	18.5				2.9	
9 - 10					8.8	18.2	23.1				6.7	
10 - 11					4.5	11.3	11.1	1.1			19.3	
11 - 12					1.8	5.2	6.7	5.5		25.2	38.0	
12 - 13						2.1	6.0	23.2	0.9	53.2		
13 - 14							11.9	28.2	27.6	19.3		
14 - 15							15.0	25.8	60.8	2.3		
15 - 16							5.1	12.2	10.6			
16 - 17							0.9	3.1				
17 - 18							0.1	0.8				
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	728	655	683	692	837	847	1058	1407	1297	999	476	635

Tabel B.266: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Romsø Tue Fyr i 16.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4	0.3											
4 - 5	10.6	58.9	43.0									31.0
5 - 6	51.4	41.1	50.5	0.7								22.0
6 - 7	31.2		6.4	74.6	43.9						1.7	37.8
7 - 8	6.6			16.8	47.0	54.3	3.1				24.8	9.0
8 - 9				7.9	8.1	35.7	30.1				9.0	0.2
9 - 10					1.0	8.9	27.5				3.6	
10 - 11						1.2	10.3	5.5			18.5	
11 - 12							6.6	17.0		22.2	42.4	
12 - 13							7.4	37.1	2.4	53.1		
13 - 14							10.0	24.7	47.0	22.9		
14 - 15							4.6	9.8	48.0	1.8		
15 - 16							0.5	4.8	2.5			
16 - 17								1.1				
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	728	655	683	692	838	847	1038	1394	1297	999	476	635

Tabel B.267: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Romsø Tue Fyr i 19.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5	4.9	55.3	46.4									28.3
5 - 6	36.4	44.7	51.2	6.2								16.9
6 - 7	38.6		2.3	79.6	92.5	3.3					0.4	33.7
7 - 8	19.9			11.7	7.5	92.8	5.8				20.7	13.5
8 - 9	0.1			2.5		3.9	48.6				12.2	7.4
9 - 10							25.9	0.2			4.9	0.2
10 - 11							5.8	27.5			15.6	
11 - 12							2.9	34.2		21.7	46.2	
12 - 13							5.3	27.6	19.4	54.0		
13 - 14							3.7	7.3	59.1	23.5		
14 - 15							2.1	2.4	21.5	0.8		
15 - 16							0.1	0.7				
16 - 17								0.1				
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	728	655	683	692	838	847	1110	1409	1297	999	474	635

Tabel B.268: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Vesterrenden i 6.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		0.1										
0 - 1		13.7	3.0									
1 - 2		13.0	16.8									
2 - 3	11.0	28.5	19.4									
3 - 4	44.3	22.0	23.7	5.2							0.7	5.0
4 - 5	21.8	20.2	26.1	24.6							2.8	35.6
5 - 6	19.9	2.5	10.6	21.5							1.9	38.8
6 - 7	3.0		0.5	34.9	3.2						13.2	19.9
7 - 8				11.0	11.2						21.9	0.8
8 - 9				2.7	13.7	0.1				4.0	35.6	
9 - 10				0.1	22.4	0.1				14.4	14.4	
10 - 11					23.5	1.4	0.1			13.8	5.4	
11 - 12					15.3	11.0	0.5			27.2	4.1	
12 - 13					9.1	26.0	0.7		6.3	25.1		
13 - 14					1.5	21.1	4.1		17.0	13.2		
14 - 15						19.7	17.6	3.2	29.2	2.3		
15 - 16						8.0	31.0	30.1	31.8			
16 - 17						7.9	25.2	32.1	12.0			
17 - 18						4.4	12.3	19.6	3.7			
18 - 19						0.4	4.9	7.1				
19 - 20							2.9	1.9				
20 - 21							0.7	3.4				
21 - 22								2.7				
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	3688	2867	3653	3485	3618	3836	3056	2920	3890	4396	4150	3627

Tabel B.269: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Vesterrenden i 9.6 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1		11.1										
1 - 2		14.7	14.8									
2 - 3	7.4	32.5	15.1									
3 - 4	44.3	21.4	21.6	4.7							0.1	3.2
4 - 5	22.3	15.7	34.3	21.6							1.8	34.0
5 - 6	20.3	4.7	13.6	21.9	0.3						3.8	37.0
6 - 7	5.2		0.6	38.1	7.0	0.2					11.5	24.2
7 - 8	0.4			11.1	18.9	0.7					23.0	1.5
8 - 9				2.7	14.4	1.0	0.7			1.7	22.5	0.1
9 - 10					27.5	1.9	1.5			10.6	23.8	
10 - 11					18.9	7.8	2.3			11.9	7.4	
11 - 12					8.5	28.4	2.5	0.2		27.1	6.0	
12 - 13					4.1	21.9	6.2	0.4	4.8	23.2		
13 - 14					0.1	16.3	14.1	2.3	14.6	22.0		
14 - 15					0.2	11.3	28.4	12.3	36.4	3.4		
15 - 16						5.7	21.7	52.0	32.8			
16 - 17						4.3	16.1	26.9	10.3			
17 - 18						0.4	5.8	4.9	1.1			
18 - 19							0.5	0.9				
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	3689	3190	2909	2821	2788	3178	3153	2769	3172	3653	3439	3604

Tabel B.270: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Vesterrenden i 11.6 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1		8.8										
1 – 2		14.9	14.2									
2 – 3	5.0	32.5	13.8									
3 – 4	43.9	23.2	20.0	4.6								2.6
4 – 5	22.7	17.1	37.2	24.0	0.1						0.3	29.0
5 – 6	21.8	3.5	14.0	24.4	2.6						2.1	35.9
6 – 7	5.7		0.8	35.1	13.5	1.7					10.3	26.3
7 – 8	0.9			9.2	26.7	3.4	0.1				23.8	5.6
8 – 9				2.8	18.9	7.1	3.0			0.3	19.4	0.5
9 – 10					18.4	14.9	5.0			9.1	25.2	
10 – 11					11.8	17.1	6.0	0.2		12.5	11.1	
11 – 12					5.5	27.8	9.0	1.0		29.6	7.9	
12 – 13					1.5	12.8	13.3	3.2	3.4	24.2		
13 – 14					0.4	10.1	17.0	10.1	18.4	23.0		
14 – 15					0.2	3.8	23.2	31.9	47.2	1.4		
15 – 16					0.3	1.2	13.7	43.1	24.6			
16 – 17						0.2	8.3	9.5	5.7			
17 – 18							1.2	0.8	0.7			
18 – 19							0.1	0.1				
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	3689	3190	2909	2819	2885	3102	3150	2603	3191	3553	3439	3601

Tabel B.271: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Vesterrenden i 13.6 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0		0.2										
0 – 1		10.0										
1 – 2	0.1	17.9	19.1									
2 – 3	6.1	43.0	16.6									
3 – 4	49.7	27.8	23.7	5.5								2.8
4 – 5	22.9	1.0	34.2	33.8	0.8							24.6
5 – 6	13.4		6.4	30.0	14.6						0.3	35.2
6 – 7	6.5			18.4	19.7	5.2					6.6	26.9
7 – 8	1.3			9.5	25.8	8.0	0.1				25.3	9.2
8 – 9				2.8	17.7	31.0	7.5				16.8	1.2
9 – 10					9.1	20.8	13.9	0.1		3.9	21.1	
10 – 11					8.7	15.2	12.1	1.1		14.2	16.0	
11 – 12					2.7	13.2	11.0	5.9		27.8	13.9	
12 – 13					0.6	3.6	11.7	16.2	1.9	26.0		
13 – 14					0.4	3.0	19.6	23.6	25.9	24.5		
14 – 15					0.1		11.6	30.4	50.4	3.7		
15 – 16							9.5	19.4	17.8			
16 – 17							2.7	3.1	3.7			
17 – 18							0.5	0.2	0.3			
18 – 19												
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2957	2540	2187	2358	2884	3180	3158	2844	3180	3653	3439	3602

Tabel B.272: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Vesterrenden i 15.6 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		0.1										
0 - 1		5.9										
1 - 2	0.1	16.2	12.8									
2 - 3	3.1	32.2	12.7									
3 - 4	40.1	22.2	18.3	4.6								3.0
4 - 5	23.0	18.2	35.5	30.9	3.2							23.0
5 - 6	24.2	5.2	19.1	26.2	28.7	0.7						31.9
6 - 7	7.6		1.7	29.2	29.1	8.6					3.5	26.7
7 - 8	1.9			7.2	19.3	34.1	2.9				25.0	13.0
8 - 9				1.8	8.4	33.7	16.4				16.4	2.4
9 - 10				0.1	6.5	12.1	20.2	0.7		2.2	20.4	0.1
10 - 11					4.6	6.6	14.3	4.9		13.7	16.2	
11 - 12					0.2	3.2	12.5	17.7		28.6	18.4	
12 - 13						1.0	11.4	23.8	5.2	27.3		
13 - 14						0.1	10.1	26.6	40.9	25.3		
14 - 15							6.1	18.0	46.0	2.9		
15 - 16							5.6	8.3	7.6			
16 - 17							0.5		0.4			
17 - 18							0.1					
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	3689	3190	2909	2821	2712	3098	3153	2828	3204	3653	3439	3604

Tabel B.273: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Vesterrenden i 18.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1		3.8	0.4									
1 – 2		18.3	12.6									
2 – 3	5.0	31.4	13.6									
3 – 4	32.0	20.5	30.2	5.1								2.5
4 – 5	20.3	19.9	29.7	50.5	8.2							20.7
5 – 6	26.5	6.1	11.4	18.8	55.7	12.6						31.3
6 – 7	12.4		2.0	18.2	28.4	16.3	0.3				0.5	24.0
7 – 8	3.7			6.7	6.8	48.9	10.4				17.3	15.0
8 – 9	0.1			0.7	0.9	13.6	28.0	0.5		0.4	23.5	6.2
9 – 10						3.7	22.7	2.1		5.9	23.6	0.2
10 – 11						4.2	18.0	18.3		11.7	16.3	
11 – 12						0.7	9.6	26.4	1.8	28.6	18.7	
12 – 13							5.1	27.9	23.2	28.8	0.1	
13 – 14							3.2	14.1	53.8	23.1		
14 – 15							2.0	9.0	20.7	1.4		
15 – 16							0.7	1.0	0.5			
16 – 17								0.7				
17 – 18								0.1				
18 – 19												
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	2951	2998	2909	2804	2911	3842	3664	3500	3902	4396	3940	2886

Tabel B.274: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Østerrenden i 7.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2		3.2										
2 - 3	12.6	13.6										
3 - 4	29.0											5.3
4 - 5	20.1	79.4										48.8
5 - 6	37.6	3.7										20.4
6 - 7	0.6										8.5	25.5
7 - 8											18.2	
8 - 9											30.4	
9 - 10										0.2	17.7	
10 - 11										8.6	13.4	
11 - 12					1.5	0.2				27.4	11.9	
12 - 13					49.3	9.4	0.1		3.8	45.3		
13 - 14					42.9	20.7	2.3		12.3	15.6		
14 - 15					6.4	22.9	11.6	2.4	9.5	2.9		
15 - 16						27.1	31.8	23.2	55.0			
16 - 17						12.2	27.4	26.5	11.0			
17 - 18						6.2	18.7	28.8	8.3			
18 - 19						1.3	8.0	18.7				
19 - 20							0.1	0.4				
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	1475	403	2909	2804	203	1099	1196	1418	1343	1448	1357	1304

Tabel B.275: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Østerrenden i 10.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
−2 – −1												
−1 – 0												
0 – 1		29.9										
1 – 2		29.7	30.9									
2 – 3	2.7	7.2	19.4									
3 – 4	39.5		16.7									3.1
4 – 5	19.5	32.6	31.9	5.0								50.2
5 – 6	34.5	0.7	1.2	27.8								21.7
6 – 7	3.8			53.2	7.7						5.4	24.5
7 – 8				14.0	27.9						17.2	0.6
8 – 9					8.9						26.8	
9 – 10					20.2		0.4			0.2	18.9	
10 – 11					10.8	1.5	2.6			8.4	19.7	
11 – 12					4.0	8.2	3.7			29.9	12.2	
12 – 13					12.0	25.5	6.9	0.1	3.6	42.5		
13 – 14					8.1	28.2	7.1	0.3	12.6	16.2		
14 – 15					0.5	22.3	10.1	4.9	15.7	2.8		
15 – 16						12.3	27.9	32.6	54.5			
16 – 17						1.9	22.1	29.5	9.8			
17 – 18						0.2	17.4	24.2	3.8			
18 – 19							1.8	8.5				
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	1475	1005	744	720	807	1099	1233	1419	1341	1448	1357	1370

Tabel B.276: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Østerrenden i 12.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1		26.0										
1 - 2		31.0	31.3									
2 - 3	2.6	9.7	15.3									
3 - 4	36.4		16.1									3.6
4 - 5	20.9	32.4	30.6	2.9								48.8
5 - 6	34.4	0.9	6.6	31.2								21.1
6 - 7	5.6			52.2	7.9						4.7	25.4
7 - 8				13.6	31.8						16.6	1.1
8 - 9					9.5	0.5	0.2				21.1	
9 - 10					21.6	8.1	4.8			0.1	19.1	
10 - 11					8.2	13.9	7.5			8.5	24.7	
11 - 12					6.4	20.3	5.2			26.8	13.9	
12 - 13					8.8	17.3	8.7	0.9	2.8	44.1		
13 - 14					5.7	22.0	9.2	2.5	13.3	17.7		
14 - 15						12.6	11.5	13.9	34.0	2.9		
15 - 16						4.9	21.2	40.9	39.9			
16 - 17						0.4	19.4	22.3	7.2			
17 - 18							12.2	15.2	2.8			
18 - 19							0.2	4.4				
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	1475	1005	744	720	807	1099	1233	1419	1343	1448	1357	1370

Tabel B.277: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Østerrenden i 14.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1		18.5										
1 – 2		36.0	30.9									
2 – 3	2.4	11.7	4.8									
3 – 4	34.0	0.6	20.0									4.2
4 – 5	18.2	31.7	29.2									47.1
5 – 6	38.2	1.6	15.1	36.4								21.4
6 – 7	7.1			55.7	7.8						3.6	25.3
7 – 8	0.1			7.9	33.3	0.3					16.8	2.0
8 – 9					14.7	14.6	2.8				15.0	
9 – 10					24.0	25.9	13.1			0.1	19.5	
10 – 11					6.1	15.6	11.3			10.7	27.9	
11 – 12					5.7	13.6	6.9	1.9		28.6	17.2	
12 – 13					2.4	14.8	9.5	3.9	2.5	56.5		
13 – 14					5.9	7.1	10.1	9.0	16.8	4.2		
14 – 15						4.7	11.8	21.2	45.6			
15 – 16						3.2	14.4	40.6	28.6			
16 – 17						0.1	14.2	14.4	5.1			
17 – 18							6.1	8.1	1.4			
18 – 19								0.8				
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	1475	1004	744	720	807	1100	1233	1419	1343	1179	1357	1370

Tabel B.278: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Østerrenden i 16.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1		10.9										
1 – 2		37.9	28.0									
2 – 3	2.2	15.1	4.3									
3 – 4	32.2	2.7	14.5									4.3
4 – 5	17.5	33.3	31.0									44.9
5 – 6	38.6		22.2	41.8								23.6
6 – 7	9.4			50.8	8.4						3.9	25.3
7 – 8	0.1			7.4	43.0	5.9					15.6	1.9
8 – 9					18.5	58.4	9.2				10.7	
9 – 10					16.9	15.0	26.5				16.5	
10 – 11					2.5	5.7	8.0	0.9		8.6	30.5	
11 – 12					5.5	5.5	6.8	5.9		30.2	22.8	
12 – 13					5.0	5.8	8.9	9.7	2.0	41.4		
13 – 14					0.4	2.4	7.1	18.6	27.9	17.8		
14 – 15						1.3	11.1	30.3	47.6	1.9		
15 – 16							9.3	27.1	19.0			
16 – 17							11.1	6.6	3.1			
17 – 18							2.0	1.0	0.4			
18 – 19												
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	1475	1005	744	720	807	1095	1232	1419	1343	1448	1357	1370

Tabel B.279: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Østerrenden i 19.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1		11.1										
1 – 2		38.2	22.0									
2 – 3	2.4	12.7	4.3									
3 – 4	26.6	4.7	13.0									3.8
4 – 5	13.8	31.8	34.5									41.5
5 – 6	42.8	1.5	26.1	51.4								24.5
6 – 7	13.6			48.5	46.1	1.6					1.5	25.5
7 – 8	0.8			0.1	25.5	68.9	1.7				15.4	4.7
8 – 9					11.0	24.4	26.2				10.0	
9 – 10					14.7	1.8	19.0	0.1			9.1	
10 – 11					2.1	1.5	12.6	11.4		6.6	22.3	
11 – 12					0.2	1.1	7.1	11.8		19.9	41.6	
12 – 13					0.2	0.6	5.6	20.8	4.8	49.2		
13 – 14							6.3	29.4	43.4	21.6		
14 – 15							6.3	21.0	43.0	2.8		
15 – 16							9.2	5.4	8.4			
16 – 17							5.9	0.1	0.4			
17 – 18							0.1					
18 – 19												
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	1475	1004	744	720	807	1098	1233	1418	1322	1448	1356	1370

Tabel B.280: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Langelandsbælt i 7.6 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4	8.0											
4 - 5	37.5	80.5	29.8									54.3
5 - 6	54.5	19.5	62.6									11.0
6 - 7			7.7	56.2							7.8	34.7
7 - 8				30.9							13.8	
8 - 9				12.4	7.1						4.7	
9 - 10				0.4	16.2						15.4	
10 - 11					22.1	0.1					22.5	
11 - 12					19.2	3.9	0.6			5.2	35.8	
12 - 13					26.5	28.9	2.9		1.6	49.3		
13 - 14					8.8	17.4	8.1		14.6	39.1		
14 - 15					0.1	13.7	22.1		9.5	6.4		
15 - 16						19.6	23.4	25.6	57.8			
16 - 17						10.6	28.0	40.7	11.1			
17 - 18						5.1	13.7	27.4	5.3			
18 - 19						0.7	0.9	5.6				
19 - 20							0.4	0.6				
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	523	656	561	692	901	1084	1014	1257	1321	747	383	326

Tabel B.281: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Langelandsbælt i 10.6 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4	10.1	3.4										
4 - 5	40.9	94.5	40.3									55.9
5 - 6	48.9	2.1	58.5	3.0								18.8
6 - 7			1.2	64.0							12.9	25.2
7 - 8				22.0	0.3						10.6	
8 - 9				10.7	20.6	0.1					3.6	
9 - 10				0.3	26.2	0.9	1.7				17.6	
10 - 11					16.3	6.1	1.6				20.2	
11 - 12					22.1	30.3	5.1			18.7	35.1	
12 - 13					12.2	28.4	17.2	0.1	1.7	36.5		
13 - 14					2.2	18.2	18.5	0.6	14.5	38.6		
14 - 15						8.6	14.1	3.7	21.9	6.2		
15 - 16						5.0	12.8	48.6	49.6			
16 - 17						2.1	24.9	30.3	10.7			
17 - 18						0.4	3.4	15.0	1.7			
18 - 19							0.2	1.7				
19 - 20							0.5	0.1				
20 - 21							0.1					
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	523	656	561	692	901	1084	1014	1258	1321	747	387	329

Tabel B.282: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Langelandsbælt i 12.6 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4	7.8	13.8										
4 - 5	38.0	86.2										53.7
5 - 6	54.1		81.3	1.4								11.5
6 - 7			18.7	63.6							5.7	34.2
7 - 8				23.4	2.2						16.0	0.6
8 - 9				11.6	37.3	2.0	1.2				4.1	
9 - 10					20.6	12.3	3.1				11.4	
10 - 11					13.1	27.1	7.9				22.7	
11 - 12					18.9	33.5	14.4			7.0	40.1	
12 - 13					7.9	15.2	22.0	0.6	4.8	51.9		
13 - 14						6.9	9.6	3.2	11.6	34.7		
14 - 15						1.7	8.4	13.1	31.1	6.4		
15 - 16						0.8	12.6	58.3	46.1			
16 - 17						0.5	20.4	19.2	6.3			
17 - 18							0.3	5.3	0.2			
18 - 19							0.1	0.3				
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	523	298	107	692	901	1081	1013	1212	1320	747	387	322

Tabel B.283: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Langelandsbælt i 14.6 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4	3.3											
4 - 5	39.4	82.6	31.7									51.4
5 - 6	57.4	17.4	61.0									12.7
6 - 7			7.3	64.2	1.3						2.8	35.3
7 - 8				24.0	18.0	0.8	0.1				18.7	0.6
8 - 9				11.8	45.8	21.9	4.0				4.6	
9 - 10					8.2	37.2	13.3				2.6	
10 - 11					12.3	23.2	17.0				26.9	
11 - 12					12.5	12.6	16.6	0.5		4.6	44.5	
12 - 13					1.8	3.7	11.5	5.1	0.5	47.4		
13 - 14						0.6	2.0	11.7	16.7	41.4		
14 - 15							6.1	28.2	47.0	6.7		
15 - 16							17.8	49.3	35.0			
16 - 17							11.5	4.6	0.7			
17 - 18								0.6				
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	523	656	561	692	901	1078	1016	1257	1320	747	391	331

Tabel B.284: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Langelandsbælt i 16.6 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4	0.2											
4 - 5	39.8	73.9	25.3									50.6
5 - 6	59.8	26.1	59.5									12.4
6 - 7	0.2		15.2	64.9	11.7						0.5	35.2
7 - 8				23.3	44.6	19.4	0.8				21.0	1.8
8 - 9				11.8	29.3	49.1	12.2				4.6	
9 - 10					7.5	22.5	23.6				1.8	
10 - 11					4.6	7.3	16.0	1.1			23.0	
11 - 12					2.1	1.6	9.8	5.4		4.4	49.1	
12 - 13					0.2	0.1	5.4	15.2	1.1	44.7		
13 - 14							3.6	23.1	27.4	44.7		
14 - 15							13.0	29.8	53.6	6.2		
15 - 16							14.0	24.7	17.8			
16 - 17							1.5	0.6	0.1			
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	523	656	561	692	901	1080	1016	1258	1317	747	391	330

Tabel B.285: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Langelandsbælt i 19.6 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3	0.4											
3 - 4	14.6	13.4										
4 - 5	77.0	80.6	36.7									51.5
5 - 6	7.5	5.9	60.2	3.2	0.3							12.3
6 - 7	0.6		3.0	76.7	53.5	3.1					2.3	33.7
7 - 8				18.8	34.7	78.5	8.1				18.5	2.5
8 - 9				1.3	7.7	16.5	31.1				3.3	
9 - 10					2.9	1.8	18.5	1.1			2.3	
10 - 11					0.9		11.3	24.2			19.7	
11 - 12							6.3	12.0		4.7	53.8	
12 - 13							3.3	18.3	10.2	47.9		
13 - 14							6.0	19.8	48.9	42.3		
14 - 15							15.0	13.2	34.2	5.1		
15 - 16							0.4	11.4	6.8			
16 - 17												
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	521	656	561	692	901	1082	989	736	1316	747	390	326

Tabel B.286: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Saltholm North i 3.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1	0.2	1.3										
1 - 2	3.1	30.2	46.9									
2 - 3	18.3	68.4	27.8	1.7								
3 - 4	71.9		25.3	32.1								16.1
4 - 5	6.5			29.4								13.6
5 - 6				15.3							17.3	55.9
6 - 7				16.8							79.7	14.4
7 - 8				4.2	14.0						3.0	
8 - 9				0.6	29.6							
9 - 10					21.8					10.1		
10 - 11					19.3					24.0		
11 - 12					13.8					8.9		
12 - 13					1.6					28.9		
13 - 14						3.8	4.9	0.3		10.4		
14 - 15						61.7	41.2	10.9	17.7	17.7		
15 - 16						33.6	32.5	38.5	60.6			
16 - 17						0.8	5.5	3.6	16.9			
17 - 18							2.9	25.2	4.9			
18 - 19							1.0	17.9				
19 - 20							11.6	3.5				
20 - 21							0.4	0.1				
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	645	374	744	720	436	473	896	1488	718	537	231	744

Tabel B.287: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Saltholm North i 5.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1		1.1										
1 – 2	2.2	28.3	51.9									
2 – 3	15.7	70.6	19.9	1.0								
3 – 4	69.1		28.2	31.1								13.0
4 – 5	11.6			31.1								15.1
5 – 6	1.4			16.4							10.8	44.4
6 – 7				16.1							81.8	27.6
7 – 8				4.3	11.9						7.4	
8 – 9					28.7							
9 – 10					25.9					7.8		
10 – 11					22.5					24.6		
11 – 12					11.0					9.9		
12 – 13										28.5		
13 – 14						3.0	2.8			8.9		
14 – 15						58.8	39.8	8.2	11.7	18.8		
15 – 16						36.2	35.6	41.2	65.0	1.5		
16 – 17						2.1	6.4	1.5	17.5			
17 – 18							2.6	28.5	5.7			
18 – 19							1.6	17.0				
19 – 20							11.0	3.5				
20 – 21							0.2	0.1				
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	645	374	744	720	436	473	896	1488	718	537	231	744

Tabel B.288: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Saltholm North i 7.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1		0.5										
1 – 2	2.2	29.1	56.3									
2 – 3	13.2	70.3	16.3	1.7								
3 – 4	61.2		27.4	34.7								11.4
4 – 5	18.6			31.7								14.4
5 – 6	4.7			16.1							8.7	40.2
6 – 7	0.2			12.5	1.4						81.0	25.4
7 – 8				3.3	17.0						10.0	8.6
8 – 9					32.3						0.4	
9 – 10					29.4					8.9		
10 – 11					20.0					23.6		
11 – 12										9.7		
12 – 13										26.4		
13 – 14						3.8	2.1			9.7		
14 – 15						69.6	47.1	10.8	22.1	21.4		
15 – 16						25.6	31.7	38.8	58.4	0.2		
16 – 17						1.1	5.9	8.5	19.5			
17 – 18							0.6	29.2				
18 – 19							4.0	12.0				
19 – 20							8.6	0.7				
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	644	374	744	720	436	473	896	1488	718	537	231	744

Tabel B.289: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Saltholm North i 9.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1		2.4										
1 - 2	1.2	26.7	49.2									
2 - 3	7.6	70.9	17.1	1.0								
3 - 4	51.7		33.7	36.0								3.2
4 - 5	22.5			31.5								17.7
5 - 6	13.4			19.2	0.5						2.6	23.9
6 - 7	3.6			11.5	8.0						48.1	28.6
7 - 8				0.8	36.2						44.6	14.1
8 - 9					27.3						4.8	12.4
9 - 10					17.9					4.1		
10 - 11					10.1					21.6		
11 - 12						0.2				15.8		
12 - 13						3.2				22.2		
13 - 14						11.8	1.1	0.1	0.1	9.9		
14 - 15						56.9	50.4	11.6	29.9	26.4		
15 - 16						26.2	33.7	40.6	58.9			
16 - 17						1.7	3.0	15.5	10.9			
17 - 18							2.3	26.5	0.1			
18 - 19							6.6	5.7				
19 - 20							2.8					
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	644	374	744	720	436	473	896	1488	718	537	231	744

Tabel B.290: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Saltholm North i 11.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1		3.2										
1 – 2		27.5	41.9									
2 – 3		69.3	26.6	2.2								
3 – 4	45.3		31.5	55.1								
4 – 5	16.6			28.5	0.9							7.3
5 – 6	20.5			11.1	14.7							16.5
6 – 7	17.2			3.1	33.6	0.6					34.6	32.9
7 – 8	0.3				21.4	2.3					29.4	20.0
8 – 9					12.6	1.1					31.6	22.2
9 – 10					15.6	2.1	0.4			0.2	4.3	1.1
10 – 11					1.1	5.3	0.4	0.1		18.2		
11 – 12						8.9	0.4	0.7	1.1	27.4		
12 – 13						16.9	0.6	2.6	6.5	19.4		
13 – 14						16.7	6.4	6.2	16.6	8.9		
14 – 15						43.6	68.2	37.4	53.6	25.9		
15 – 16						2.5	14.7	26.0	20.6			
16 – 17							3.4	19.0	1.5			
17 – 18							3.0	7.9				
18 – 19							2.5	0.1				
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	644	374	744	720	435	473	894	1486	718	537	231	744

Tabel B.291: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Saltholm North i 13.5 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2		19.3	22.2									
2 - 3		78.3	27.4									
3 - 4	36.0	2.4	50.4	43.1								
4 - 5	9.6			48.9	7.6							
5 - 6	15.5			7.4	45.1	8.0						0.7
6 - 7	26.2			0.7	32.9	9.7					9.5	28.8
7 - 8	12.6				14.5	6.6	2.9				23.8	30.5
8 - 9						6.6	3.0	0.7			43.7	25.0
9 - 10						5.3	1.0	2.2	0.3		19.5	15.1
10 - 11						8.7	0.8	3.6	11.8	3.7	3.5	
11 - 12						13.3	3.1	5.6	17.3	33.3		
12 - 13						16.1	12.8	17.1	13.8	35.8		
13 - 14						7.0	23.0	21.4	17.4	16.2		
14 - 15						18.8	50.8	29.9	36.8	11.0		
15 - 16							2.5	14.7	2.6			
16 - 17								4.7				
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	644	374	744	720	435	473	895	1488	718	537	231	744

Tabel B.292: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Saltholm North i 14.2 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1		0.5										
1 - 2		26.5	27.2									
2 - 3		73.0	33.2	2.1								
3 - 4	41.0		39.7	63.1								
4 - 5	5.4			33.8	45.1	3.6						
5 - 6	15.5			1.1	39.3	13.8						0.8
6 - 7	30.0				15.4	8.7					11.3	27.4
7 - 8	8.1				0.2	11.5	4.6				20.8	33.9
8 - 9						6.2	2.6	1.1			45.0	25.0
9 - 10						6.4	2.2	3.2	2.1		20.8	12.9
10 - 11						11.5	2.2	6.8	12.7	2.4	2.2	
11 - 12						14.2	6.3	10.2	22.3	39.3		
12 - 13						7.4	23.7	22.7	14.6	39.7		
13 - 14						10.6	49.7	24.4	24.7	17.9		
14 - 15						6.2	8.6	23.1	23.7	0.7		
15 - 16							0.1	6.8				
16 - 17								1.8				
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	644	374	744	720	435	471	894	1488	718	537	231	744

Tabel B.293: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Svinbådan i 2.7 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3	54.4											0.9
3 - 4	28.2										2.6	41.2
4 - 5	5.6										9.3	11.7
5 - 6	11.7										7.2	16.4
6 - 7				2.9							16.2	24.0
7 - 8				2.9						13.9	39.2	5.9
8 - 9				76.5	1.9					8.4	11.7	
9 - 10				17.6	29.4					31.1	14.0	
10 - 11					16.4					13.5		
11 - 12					40.0					18.9		
12 - 13					11.4	29.0				7.8		
13 - 14					0.9	47.8			16.3	6.4		
14 - 15						18.1	0.4		30.1			
15 - 16						5.1	11.0		16.7			
16 - 17							17.7		27.6			
17 - 18							10.1	6.9	9.3			
18 - 19							5.0	30.6				
19 - 20							19.9	4.6				
20 - 21							12.4	9.2				
21 - 22							15.2	8.9				
22 - 23							7.0	37.8				
23 - 24							1.3	2.0				
> 24												
antal	957	374	744	34	738	720	744	741	718	1088	1369	1482

Tabel B.294: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Svinbådan i 6.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5					37.5							
5 - 6				69.7	37.5							
6 - 7				30.3	18.8							
7 - 8												
8 - 9					6.2							
9 - 10												
10 - 11												
11 - 12												
12 - 13												
13 - 14												
14 - 15												
15 - 16												
16 - 17												
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	957	374	744	33	48	720	744	741	718	1088	1369	1482

Tabel B.295: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Svinbådan i 7.7 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2	0.2											
2 - 3	22.6											0.3
3 - 4	41.2											28.5
4 - 5	25.7											11.3
5 - 6	10.3			2.9	0.1						0.7	23.5
6 - 7					1.6						11.6	27.1
7 - 8				38.2	9.8					8.8	42.8	7.7
8 - 9				47.1	34.0					8.5	27.8	1.5
9 - 10				11.8	40.7	0.3				34.1	14.0	
10 - 11					9.8	0.6				20.2	2.8	
11 - 12					1.1	1.0				15.5	0.4	
12 - 13					3.0	37.4			2.2	8.0		
13 - 14						51.7	0.9	0.1	39.4	4.9		
14 - 15						8.6	20.7	0.8	10.8			
15 - 16						0.6	19.4	1.6	20.8			
16 - 17							11.6	6.2	19.0			
17 - 18							9.5	22.1	7.6			
18 - 19							10.9	23.1				
19 - 20							23.3	14.7				
20 - 21							3.2	16.0				
21 - 22							0.5	10.5				
22 - 23								4.8				
23 - 24												
> 24												
antal	957	374	744	34	738	720	744	743	720	1091	1369	1482

Tabel B.296: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Svinbådan i 12.9 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0												
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3	3.9											
3 - 4	21.5											9.8
4 - 5	20.4				4.3	0.3						11.8
5 - 6	48.1			100.0	63.1	2.6						12.2
6 - 7	6.2				19.8	3.2					0.2	21.9
7 - 8					8.9	3.5					36.9	30.5
8 - 9					1.4	2.8				13.5	35.6	13.8
9 - 10					1.2	5.4		4.3	3.7	17.7	6.6	
10 - 11					0.9	6.0	0.3	10.5	7.9	15.4	9.1	
11 - 12					0.3	11.8	0.4	9.4	4.7	37.7	11.5	
12 - 13						19.4	14.2	12.7	24.7	7.1		
13 - 14						43.3	37.8	19.7	34.0	8.6		
14 - 15						1.7	27.4	13.3	6.5			
15 - 16							5.8	10.6	5.6			
16 - 17							4.7	5.0	7.4			
17 - 18							3.9	3.9	5.6			
18 - 19							4.6	1.3				
19 - 20							0.9	5.0				
20 - 21								4.3				
21 - 22												
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	957	374	744	33	738	720	744	743	430	1041	1369	1482

Tabel B.297: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Svinbådan i 21.0 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 – -1												
-1 – 0												
0 – 1												
1 – 2												
2 – 3												
3 – 4	6.4											
4 – 5	17.3				15.5	88.9						
5 – 6	15.9				84.5	11.1						0.7
6 – 7	35.7											6.0
7 – 8	14.4							37.0	21.7			15.9
8 – 9	10.3							39.4	24.4		9.2	73.4
9 – 10								18.9	39.3		30.3	4.0
10 – 11								2.9	11.9	2.9	12.7	
11 – 12									0.1	79.2	47.8	
12 – 13								0.2	0.3	14.8		
13 – 14								0.5	2.2	3.1		
14 – 15								0.5				
15 – 16								0.7				
16 – 17												
17 – 18												
18 – 19												
19 – 20												
20 – 21												
21 – 22												
22 – 23												
23 – 24												
> 24												
antal	624	374	744	33	690	18	744	614	720	701	694	744

Tabel B.298: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Valgrundet i 2.7 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		7.7	0.4									
0 - 1		34.2	25.3									
1 - 2		9.2	19.5									
2 - 3	53.9	48.8	41.8									0.9
3 - 4	32.6		12.8	18.7							4.9	29.0
4 - 5	10.6		0.1	37.8							7.0	27.0
5 - 6	2.8			23.8							6.9	15.7
6 - 7				12.3							7.0	23.7
7 - 8				7.1						10.0	47.8	3.8
8 - 9				0.3	18.0					12.1	18.0	
9 - 10					17.0					17.4	8.4	
10 - 11					37.3	0.6				29.5		
11 - 12					27.5	11.0				29.2		
12 - 13					0.1	30.0			0.9	1.8		
13 - 14						45.3	0.9		7.3			
14 - 15						12.5	5.8		30.0			
15 - 16						0.7	16.7		15.2			
16 - 17							14.7	1.3	46.1			
17 - 18							5.5	7.5	0.6			
18 - 19							7.1	38.7				
19 - 20							19.5	3.2				
20 - 21							8.1	1.2				
21 - 22							12.2	7.7				
22 - 23							8.1	35.1				
23 - 24							1.5	5.2				
> 24												
antal	1129	672	696	706	694	720	744	744	534	1228	1394	1488

Tabel B.299: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Valgrundet i 4.7 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		1.2										
0 - 1		39.3	25.9									
1 - 2		8.5	15.2									
2 - 3	39.2	51.0	40.9									0.1
3 - 4	43.7		17.1	13.5							2.2	24.3
4 - 5	9.7		0.9	43.6							7.2	27.1
5 - 6	7.4			23.1							4.6	17.3
6 - 7				14.3	0.4						7.2	23.7
7 - 8				5.4	2.3					8.9	50.5	7.5
8 - 9				0.1	22.6	1.1				10.8	19.9	
9 - 10					16.9	1.4				17.7	7.1	
10 - 11					39.6	2.8				27.3	1.1	
11 - 12					18.2	9.4				33.5	0.3	
12 - 13						33.6			0.9	1.8		
13 - 14						40.0	0.5		6.6			
14 - 15						11.1	6.6		28.5			
15 - 16						0.6	18.0		18.2			
16 - 17							16.3	2.4	45.5			
17 - 18							3.4	12.5	0.4			
18 - 19							9.9	34.0				
19 - 20							17.5	4.3				
20 - 21							10.9	3.6				
21 - 22							12.0	11.8				
22 - 23							4.7	29.0				
23 - 24							0.3	2.3				
> 24												
antal	1128	672	696	706	694	720	744	744	534	1230	1394	1488

Tabel B.300: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Valgrundet i 6.8 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.


T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		2.8	0.1									
0 - 1		29.9	25.0									
1 - 2		12.8	1.4									
2 - 3	41.1	49.7	36.1									
3 - 4	37.2	4.5	31.3	21.1							0.6	19.8
4 - 5	10.5	0.3	6.0	36.4	0.1						5.2	20.4
5 - 6	10.4			26.2	3.9						5.1	20.0
6 - 7	0.8			12.2	5.2	1.4					3.0	23.3
7 - 8				4.1	7.2	2.1				6.8	50.4	14.4
8 - 9					21.9	2.5				10.2	25.0	2.1
9 - 10					15.7	2.1				20.0	8.0	
10 - 11					38.9	1.9		0.1	0.2	32.5	0.9	
11 - 12					7.1	12.5		0.1	0.4	28.6	1.6	
12 - 13						35.3			1.7	1.8		
13 - 14						32.4	0.5	0.1	9.2			
14 - 15						9.9	10.5	2.6	30.9			
15 - 16							21.0	3.2	17.8			
16 - 17							16.3	7.4	39.9			
17 - 18							1.6	15.2				
18 - 19							16.4	31.6				
19 - 20							15.5	2.6				
20 - 21							8.3	3.6				
21 - 22							8.5	13.3				
22 - 23							1.5	20.2				
23 - 24												
> 24												
antal	1129	672	696	706	694	720	744	744	534	1230	1394	1488

Tabel B.301: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Valgrundet i 8.8 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.


T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		7.9	6.0									
0 - 1		23.7	14.0									
1 - 2		17.3	3.3									
2 - 3	55.2	40.6	40.7	1.4								8.7
3 - 4	21.2	4.3	19.1	25.8								25.9
4 - 5	12.9	6.2	16.9	41.1	7.6						7.5	17.5
5 - 6	9.8			17.4	8.6	3.1					5.6	8.5
6 - 7	0.8			11.8	5.3	3.9					1.7	8.3
7 - 8				2.5	7.2	0.6		0.5		1.9	42.3	29.7
8 - 9					26.9	1.8		0.8	1.7	14.2	31.2	1.3
9 - 10					19.6	1.7		0.5	1.1	20.1	6.2	
10 - 11					23.9	5.1		0.8	1.3	43.3	1.4	
11 - 12					0.7	22.8	0.4	2.3	4.9	19.2	4.1	
12 - 13						34.7	2.2	5.4	6.4	1.4		
13 - 14						19.0	4.6	5.5	21.2			
14 - 15						6.9	14.7	5.9	20.4			
15 - 16						0.4	29.4	5.8	18.7			
16 - 17							4.6	11.0	24.3			
17 - 18							8.2	10.6				
18 - 19							16.5	23.0				
19 - 20							11.8	2.0				
20 - 21							2.3	3.6				
21 - 22							5.4	11.4				
22 - 23								10.8				
23 - 24												
> 24												
antal	744	672	698	706	694	720	744	744	534	1230	880	744

Tabel B.302: Hyppighedsfordeling af temperaturen for station Valgrundet i 10.9 m dybde. Tallene er givet i %. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.


T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
-2 - -1												
-1 - 0		1.3	1.3									
0 - 1		17.6	15.5									
1 - 2		12.8	0.9									
2 - 3	26.2	49.4	21.7									
3 - 4	28.3	5.8	30.2	15.6								12.0
4 - 5	16.3	12.5	30.5	46.7	8.9	0.7					2.9	11.0
5 - 6	17.5	0.6		29.0	22.4	5.1					3.7	18.3
6 - 7	9.5			8.5	8.3	3.1					0.4	19.2
7 - 8	2.2			0.2	19.1	1.0				2.3	17.6	25.1
8 - 9					26.0	2.4				9.1	50.4	14.4
9 - 10					9.5	4.6				23.3	14.9	
10 - 11					6.0	13.3	1.5	1.8		47.9	6.7	
11 - 12						18.9	6.0	33.3		17.5	3.3	
12 - 13						25.0	8.7	7.0				
13 - 14						14.9	12.4	33.3				
14 - 15						10.3	11.2	5.3				
15 - 16						0.8	22.0	10.5				
16 - 17							10.2	1.8				
17 - 18							8.6	3.5				
18 - 19							13.0	1.8				
19 - 20							3.5	1.8				
20 - 21							1.2					
21 - 22							1.6					
22 - 23												
23 - 24												
> 24												
antal	1109	672	696	493	666	720	744	57	534	1203	1394	1488




Figur B.38: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Århus Bugt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.39: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Århus Bugt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.40: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Århus Bugt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.41: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Århus Bugt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.42: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Darss Sill . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.43: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Darss Sill . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.44: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Darss Sill . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.45: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Darss Sill . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.46: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Deutsche Bucht . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.47: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Deutsche Bucht . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.48: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Deutsche Bucht . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.49: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Deutsche Bucht . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.50: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Drogden . Øverst i højre hjørne ses farveko- den for dybderne.




Figur B.51: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Drogden . Øverst i højre hjørne ses farveko- den for dybderne.




Figur B.52: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Drogden . Øverst i højre hjørne ses farveko- den for dybderne.




Figur B.53: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Drogden . Øverst i højre hjørne ses farveko- den for dybderne.




Figur B.54: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Elbe . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.55: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Elbe . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.56: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Elbe . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.57: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Elbe . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.58: Hyppighedsfordeling af temperatur for station EMS . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.59: Hyppighedsfordeling af temperatur for station EMS . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.60: Hyppighedsfordeling af temperatur for station EMS . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.61: Hyppighedsfordeling af temperatur for station EMS . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.62: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Farø. Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.63: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Farø. Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.64: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Farø. Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.65: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Farø. Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.66: Hyppighedsfordeling af temperatur for station "Early"Flinten . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.67: Hyppighedsfordeling af temperatur for station "Early"Flinten . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.68: Hyppighedsfordeling af temperatur for station "Early"Flinten . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.69: Hyppighedsfordeling af temperatur for station "Early"Flinten . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.70: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Flinten . Øverst i højre hjørne ses farveko-
den for dybderne.




Figur B.71: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Flinten . Øverst i højre hjørne ses farveko- den for dybderne.




Figur B.72: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Flinten . Øverst i højre hjørne ses farveko- den for dybderne.




Figur B.73: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Flinten . Øverst i højre hjørne ses farveko- den for dybderne.




Figur B.74: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Gamle Bro . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.75: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Gamle Bro . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.76: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Gamle Bro . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.77: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Gamle Bro . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.78: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Hjelm Bugt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.79: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Hjelm Bugt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.80: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Hjelm Bugt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.81: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Hjelm Bugt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.82: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Kiel . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.83: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Kiel . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.84: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Kiel . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.85: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Kiel . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.86: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Læsø Rende . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.87: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Læsø Rende . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.88: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Læsø Rende . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.89: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Læsø Rende . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.90: Hyppighedsfordeling af temperatur for station "Early"Ndr. Røse. Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.91: Hyppighedsfordeling af temperatur for station "Early"Ndr. Røse. Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.92: Hyppighedsfordeling af temperatur for station "Early"Ndr. Røse. Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.93: Hyppighedsfordeling af temperatur for station "Early"Ndr. Røse. Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.94: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Ndr. Røse . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.95: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Ndr. Røse . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.96: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Ndr. Røse . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.97: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Ndr. Røse . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.98: Hyppighedsfordeling af temperatur for station North Sea . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.99: Hyppighedsfordeling af temperatur for station North Sea . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.100: Hyppighedsfordeling af temperatur for station North Sea . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.101: Hyppighedsfordeling af temperatur for station North Sea . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.102: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Oder . Øverst i højre hjørne ses farveko-
den for dybderne.




Figur B.103: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Oder . Øverst i højre hjørne ses farveko- den for dybderne.




Figur B.104: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Oder . Øverst i højre hjørne ses farveko- den for dybderne.




Figur B.105: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Oder . Øverst i højre hjørne ses farveko- den for dybderne.




Figur B.106: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Østerrenden Nord . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.107: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Østerrenden Nord . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.108: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Østerrenden Nord . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.109: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Østerrenden Nord . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.110: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Romsø Tue Fyr . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.111: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Romsø Tue Fyr . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.112: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Romsø Tue Fyr . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.113: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Romsø Tue Fyr . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.114: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Vesterrenden . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.115: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Vesterrenden . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.116: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Vesterrenden . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.117: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Vesterrenden . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.118: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Østerrenden . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.119: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Østerrenden . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.120: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Østerrenden . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.121: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Østerrenden . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.122: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Langelandsbælt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.123: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Langelandsbælt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.124: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Langelandsbælt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.125: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Langelandsbælt . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.126: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Saltholm North . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.127: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Saltholm North . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.128: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Saltholm North . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.129: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Saltholm North . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.130: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Svinbådan . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.131: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Svinbådan . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.132: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Svinbådan . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.133: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Svinbådan . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.




Figur B.134: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Valgrundet . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.



Figur B.135: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Valgrundet . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.



Figur B.136: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Valgrundet . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.



Figur B.137: Hyppighedsfordeling af temperatur for station Valgrundet . Øverst i højre hjørne ses farvekoden for dybderne.

Tabel B.303: Dag til dag ændring i temperatur for station Århus Bugt dybde 4.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9					1.7	1.7						
1.0 – 1.4					1.7	6.9	3.5	3.3				3.3
0.5 – 0.9	3.2	3.6	6.7	13.8	22.4	13.8	12.3	10.0		4.0	4.3	
0 – 0.4	25.8	40.0	55.0	63.8	36.2	34.5	43.9	28.3	41.4	12.0	21.7	33.3
–0.5 – –0.1	61.3	52.7	38.3	19.0	19.0	29.3	40.4	46.7	55.2	68.0	73.9	60.0
–1.0 – –0.6	6.5	3.6		3.4	17.2	6.9		3.3	3.4	16.0		3.3
–1.5 – –1.1	3.2					1.7		5.0				
–2.0 – –1.6						3.4		1.7				
–2.5 – –2.1					1.7	1.7						
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6								1.7				
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	31	55	60	58	58	58	57	60	29	25	23	30

Tabel B.304: Dag til dag ændring i temperatur for station Århus Bugt dybde 9.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4					1.7	1.7						
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4						1.7						
2.5 – 2.9					1.7	1.7	1.8					
2.0 – 2.4					1.7			5.0				
1.5 – 1.9			1.7	3.4		1.7	3.5	1.7				
1.0 – 1.4		1.8	1.7	3.4	3.4	6.9	12.3	3.3				3.3
0.5 – 0.9	3.2	1.8	3.3	5.2	10.3	17.2	8.8	11.7		4.0	4.8	
0 – 0.4	22.6	45.5	61.7	58.6	39.7	24.1	36.8	31.7	31.0	32.0	38.1	33.3
–0.5 – –0.1	67.7	40.0	25.0	20.7	27.6	20.7	22.8	15.0	65.5	40.0	52.4	56.7
–1.0 – –0.6	6.5	10.9	3.3	6.9	1.7	10.3	7.0	16.7	3.4	16.0		6.7
–1.5 – –1.1			3.3		5.2	3.4	3.5	8.3		8.0	4.8	
–2.0 – –1.6				1.7	1.7	3.4		1.7				
–2.5 – –2.1					1.7	3.4	1.8	1.7				
–3.0 – –2.6					1.7	3.4		1.7				
–3.5 – –3.1					1.7		1.8					
–4.0 – –3.6								1.7				
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	31	55	60	58	58	58	57	60	29	25	21	30

Tabel B.305: Dag til dag ændring i temperatur for station Århus Bugt dybde 14.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4											4.3	
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9			1.7					1.7			4.3	
2.0 – 2.4	3.2				1.7	1.7						
1.5 – 1.9	3.2				1.7	1.7	3.5				4.3	
1.0 – 1.4		1.8	1.7	1.7		3.4	3.5	5.0	3.4		8.7	
0.5 – 0.9	6.5	1.8	5.0	3.4	1.7	6.9	19.3	15.0	6.9			6.7
0 – 0.4	22.6	29.1	41.7	67.2	70.7	51.7	36.8	33.3	48.3	24.0	13.0	30.0
–0.5 – –0.1	45.2	60.0	43.3	24.1	20.7	25.9	19.3	26.7	37.9	64.0	47.8	43.3
–1.0 – –0.6	6.5	7.3	5.0	1.7		5.2	12.3	10.0		8.0	4.3	13.3
–1.5 – –1.1	6.5		1.7	1.7	1.7	1.7	3.5	6.7	3.4		4.3	6.7
–2.0 – –1.6	6.5				1.7		1.8	1.7				
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6											4.3	
–3.5 – –3.1						1.7				4.0		
–4.0 – –3.6											4.3	
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	31	55	60	58	58	58	57	60	29	25	23	30

Tabel B.306: Dag til dag ændring i temperatur for station Darss Sill dybde 2.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6							1.2					
5.5 – 5.9							1.2					
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4								1.4				
3.5 – 3.9								1.4				
3.0 – 3.4									1.5			
2.5 – 2.9							1.2	2.9	1.5			
2.0 – 2.4						1.9			1.5			
1.5 – 1.9					4.9	3.8	4.8	1.4	1.5			
1.0 – 1.4				5.0	8.2	7.7	4.8	4.3	3.0	5.1	1.4	
0.5 – 0.9	5.6			6.7	18.0	17.3	10.7	8.6	9.1	1.7	5.4	6.4
0 – 0.4	40.8	50.7	71.1	50.0	36.1	25.0	31.0	34.3	24.2	37.3	27.0	28.2
–0.5 – –0.1	45.1	49.3	28.9	30.0	26.2	21.2	25.0	21.4	31.8	42.4	45.9	53.8
–1.0 – –0.6	5.6			6.7	1.6	13.5	8.3	5.7	10.6	10.2	13.5	9.0
–1.5 – –1.1	1.4			1.7	1.6	3.8	6.0	5.7	6.1	1.7	5.4	2.6
–2.0 – –1.6					1.6	3.8	2.4	8.6	6.1	1.7		
–2.5 – –2.1						1.9		1.4				
–3.0 – –2.6					1.6		1.2					
–3.5 – –3.1	1.4							1.4	1.5			
–4.0 – –3.6									1.5			
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6								1.4			1.4	
–5.5 – –5.1												
< –5.6							2.4					
antal	71	69	83	60	61	52	84	70	66	59	74	78

Tabel B.307: Dag til dag ændring i temperatur for station Darss Sill dybde 5.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6							1.2					
5.5 – 5.9							1.2					
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9								1.5				
4.0 – 4.4								3.0				
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4							2.3		1.5			
2.5 – 2.9					1.5				1.5			
2.0 – 2.4							2.3		2.9			
1.5 – 1.9					6.0	7.7	1.2	1.5				
1.0 – 1.4				1.7	4.5	7.7	4.7	7.5	1.5	3.4		
0.5 – 0.9	1.7			8.6	16.4	15.4	16.3	10.4	11.8		2.7	7.6
0 – 0.4	46.6	51.0	75.0	56.9	37.3	25.6	26.7	26.9	20.6	35.6	26.7	22.8
–0.5 – –0.1	48.3	49.0	25.0	24.1	23.9	24.4	24.4	23.9	36.8	49.2	57.3	58.2
–1.0 – –0.6	3.4			8.6	3.0	9.0	4.7	9.0	8.8	6.8	9.3	8.9
–1.5 – –1.1					3.0	5.1	8.1	3.0	2.9	3.4	4.0	2.5
–2.0 – –1.6					1.5	2.6	2.3	6.0	7.4			
–2.5 – –2.1						1.3	1.2	1.5	1.5	1.7		
–3.0 – –2.6					3.0		1.2	3.0				
–3.5 – –3.1						1.3		3.0	1.5			
–4.0 – –3.6									1.5			
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6							2.3					
antal	58	49	56	58	67	78	86	67	68	59	75	79

Tabel B.308: Dag til dag ændring i temperatur for station Darss Sill dybde 7.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6							2.9	1.4				
5.5 – 5.9							1.0					
5.0 – 5.4						1.0	1.0					
4.5 – 4.9							1.9	2.9				
4.0 – 4.4							1.0					
3.5 – 3.9									3.9			
3.0 – 3.4					0.8	1.9	3.8		1.3			
2.5 – 2.9						1.0	1.0	1.4	2.6			
2.0 – 2.4					2.5	1.9	3.8		1.3			
1.5 – 1.9					4.1	4.9	3.8	1.4	2.6			
1.0 – 1.4				1.2	5.0	5.8	4.8	4.3		3.1		1.3
0.5 – 0.9		4.1		10.7	15.7	13.6	12.4	12.9	10.4	1.5	5.3	6.5
0 – 0.4	49.2	45.2	64.6	53.6	36.4	25.2	17.1	21.4	18.2	38.5	28.9	26.0
–0.5 – –0.1	44.6	49.3	35.4	27.4	19.8	23.3	21.0	24.3	33.8	46.2	51.3	53.2
–1.0 – –0.6	4.6	1.4		7.1	9.1	9.7	7.6	14.3	6.5	4.6	9.2	11.7
–1.5 – –1.1	1.5				4.1	3.9	3.8	4.3	5.2	4.6	3.9	1.3
–2.0 – –1.6					0.8	1.9	2.9	2.9	5.2			
–2.5 – –2.1						1.0	1.9	1.4	2.6	1.5	1.3	
–3.0 – –2.6						1.9		2.9	1.3			
–3.5 – –3.1					0.8		1.0	1.4				
–4.0 – –3.6					0.8	1.0	1.9	1.4	1.3			
–4.5 – –4.1						1.9	1.0		1.3			
–5.0 – –4.6									2.6			
–5.5 – –5.1												
< –5.6							3.8	1.4				
antal	65	73	99	84	121	103	105	70	77	65	76	77

Tabel B.309: Dag til dag ændring i temperatur for station Darss Sill dybde 12.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6							4.0	1.5				
5.5 – 5.9								1.5				
5.0 – 5.4							2.0	1.5				
4.5 – 4.9					0.8	1.0						
4.0 – 4.4							2.0	1.5				
3.5 – 3.9							2.0		1.5			
3.0 – 3.4						1.0	3.0		1.5			
2.5 – 2.9					2.5	2.0		6.2				
2.0 – 2.4					1.7	2.0	7.1		3.0			
1.5 – 1.9					4.2	10.0	5.1	1.5	3.0			1.4
1.0 – 1.4				3.0	6.7	8.0	10.1	7.7	7.6	3.3	2.8	
0.5 – 0.9		5.5	2.6	4.0	12.6	10.0	6.1	9.2	13.6	5.0	6.9	5.6
0 – 0.4	44.6	42.5	54.8	57.0	32.8	19.0	12.1	15.4	21.2	35.0	19.4	26.4
–0.5 – –0.1	51.8	49.3	41.7	33.0	21.0	16.0	14.1	27.7	27.3	46.7	47.2	47.2
–1.0 – –0.6	1.8	2.7	0.9	1.0	9.2	15.0	5.1		4.5	6.7	16.7	16.7
–1.5 – –1.1	1.8			2.0	4.2	4.0	10.1	7.7	6.1	1.7	5.6	2.8
–2.0 – –1.6					0.8	6.0	4.0	3.1	1.5			
–2.5 – –2.1					1.7	2.0	1.0	3.1		1.7	1.4	
–3.0 – –2.6						1.0	2.0		1.5			
–3.5 – –3.1					0.8			4.6	3.0			
–4.0 – –3.6					0.8	1.0						
–4.5 – –4.1						1.0	2.0	4.6	1.5			
–5.0 – –4.6						1.0	2.0	3.1	1.5			
–5.5 – –5.1							1.0		1.5			
< –5.6							5.1					
antal	56	73	115	100	119	100	99	65	66	60	72	72

Tabel B.310: Dag til dag ændring i temperatur for station Darss Sill dybde 17.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6							1.0	1.6				
5.5 – 5.9								1.6				
5.0 – 5.4							1.0					
4.5 – 4.9									2.7			
4.0 – 4.4						2.1	1.9	1.6				
3.5 – 3.9							1.0					
3.0 – 3.4						2.1	1.0		1.4			
2.5 – 2.9					2.6	1.1	1.9	1.6				
2.0 – 2.4						3.2	3.8	3.2			1.4	
1.5 – 1.9	1.9				0.9	2.1	2.9	4.8	6.8	4.7		2.9
1.0 – 1.4				1.1	2.6	6.3	5.8	17.7	4.1	1.6	1.4	1.4
0.5 – 0.9	3.8	2.8		3.2	17.1	11.6	11.5	9.7	13.5	6.2	4.2	8.7
0 – 0.4	42.3	47.9	58.6	63.4	41.0	20.0	19.2	12.9	23.0	32.8	23.6	33.3
–0.5 – –0.1	46.2	46.5	41.4	29.0	18.8	27.4	18.3	14.5	21.6	39.1	48.6	29.0
–1.0 – –0.6	3.8	1.4		2.2	12.0	8.4	12.5	8.1	9.5	12.5	12.5	11.6
–1.5 – –1.1	1.9	1.4		1.1	4.3	8.4	6.7	6.5	2.7	3.1	5.6	5.8
–2.0 – –1.6					0.9	1.1	5.8	4.8	6.8		1.4	4.3
–2.5 – –2.1						2.1	1.0	3.2				2.9
–3.0 – –2.6							1.0	1.6	4.1			
–3.5 – –3.1						2.1	1.0		1.4		1.4	
–4.0 – –3.6						1.1	1.0	3.2	1.4			
–4.5 – –4.1						1.1						
–5.0 – –4.6								1.6				
–5.5 – –5.1								1.6				
< –5.6							1.9		1.4			
antal	52	71	116	93	117	95	104	62	74	64	72	69

Tabel B.311: Dag til dag ændring i temperatur for station Darss Sill dybde 19.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6							1.1					
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4								1.5				
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4						2.2		1.5	1.3			
2.5 – 2.9							3.2	2.9	1.3			
2.0 – 2.4					1.7	2.2	1.1	2.9	2.6	1.5		
1.5 – 1.9	1.9				0.8	1.1	5.3	7.4			1.3	
1.0 – 1.4		1.3		1.0	4.2	4.3	3.2	2.9	3.9	3.0		1.7
0.5 – 0.9				1.0	10.0	10.8	12.6	17.6	14.3	3.0	4.0	8.6
0 – 0.4	46.3	46.8	58.7	67.7	50.0	35.5	21.1	17.6	22.1	33.3	36.0	36.2
–0.5 – –0.1	48.1	49.4	39.7	28.1	22.5	29.0	31.6	22.1	32.5	43.9	42.7	29.3
–1.0 – –0.6	3.7	2.6	1.7	2.1	9.2	5.4	11.6	8.8	10.4	12.1	8.0	13.8
–1.5 – –1.1						3.2	5.3	1.5		1.5	6.7	5.2
–2.0 – –1.6					1.7	2.2	2.1	2.9	6.5	1.5		3.4
–2.5 – –2.1						3.2		4.4	2.6			1.7
–3.0 – –2.6						1.1	1.1	1.5				
–3.5 – –3.1								2.9	1.3			
–4.0 – –3.6								1.5	1.3			
–4.5 – –4.1											1.3	
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1							1.1					
< –5.6												
antal	54	77	121	96	120	93	95	68	77	66	75	58

Tabel B.312: Dag til dag ændring i temperatur for station Deutsche Bucht dybde 3.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4						0.8						
1.5 – 1.9					1.0						0.8	
1.0 – 1.4	0.8	0.8			3.8	1.7	4.4	1.8				
0.5 – 0.9		1.6		5.6	18.3	15.1	11.5	4.4			1.6	2.9
0 – 0.4	40.2	49.2	66.4	62.9	46.2	46.2	47.8	45.6	35.2	13.1	19.7	22.9
–0.5 – –0.1	56.1	47.6	33.6	30.3	19.2	25.2	25.7	40.4	62.9	82.2	68.0	69.5
–1.0 – –0.6	2.3	0.8		1.1	7.7	8.4	8.0	6.1	1.9	3.7	9.0	3.8
–1.5 – –1.1	0.8				1.9	1.7	2.7	1.8		0.9		1.0
–2.0 – –1.6					1.0	0.8					0.8	
–2.5 – –2.1					1.0							
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	132	124	122	89	104	119	113	114	105	107	122	105

Tabel B.313: Dag til dag ændring i temperatur for station Deutsche Bucht dybde 6.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4							0.9					
1.5 – 1.9					1.0		0.9	2.7			0.8	
1.0 – 1.4	0.7	0.8			2.9	4.2	2.7					
0.5 – 0.9				3.3	17.3	14.3	9.7	4.4			0.8	0.9
0 – 0.4	37.7	48.4	66.9	67.4	50.0	42.0	46.0	49.6	36.7	13.7	18.9	29.1
–0.5 – –0.1	59.6	50.0	33.1	29.3	18.3	32.8	30.1	37.2	62.5	82.3	70.5	65.5
–1.0 – –0.6	2.1	0.8			7.7	2.5	7.1	2.7	0.8	3.2	8.2	3.6
–1.5 – –1.1					1.0	3.4	1.8	3.5		0.8		0.9
–2.0 – –1.6					1.0	0.8	0.9				0.8	
–2.5 – –2.1					1.0							
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	146	124	124	92	104	119	113	113	120	124	122	110

Tabel B.314: Dag til dag ændring i temperatur for station Deutsche Bucht dybde 10.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4						0.8	0.9	0.9				
1.5 – 1.9	0.7				1.2	0.8	0.9					
1.0 – 1.4					6.1	1.7	1.8					
0.5 – 0.9		1.6		1.2	11.0	12.6	8.8	8.0			4.1	1.9
0 – 0.4	40.1	51.2	72.6	77.1	48.8	47.9	48.7	51.3	38.7	10.9	16.3	28.7
–0.5 – –0.1	56.5	46.3	27.4	20.5	26.8	27.7	32.7	36.3	60.5	84.9	70.7	63.9
–1.0 – –0.6	2.0	0.8		1.2	3.7	4.2	3.5	3.5	0.8	3.4	7.3	3.7
–1.5 – –1.1					1.2	3.4	1.8			0.8	0.8	1.9
–2.0 – –1.6					1.2	0.8					0.8	
–2.5 – –2.1	0.7						0.9					
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	147	123	124	83	82	119	113	113	119	119	123	108

Tabel B.315: Dag til dag ændring i temperatur for station Deutsche Bucht dybde 15.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4					1.2							
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4						0.8						
1.5 – 1.9					1.2							
1.0 – 1.4						0.8	0.9					
0.5 – 0.9	1.4				9.8	12.6	4.4	3.6			1.6	0.9
0 – 0.4	35.9	54.1	65.9	76.1	67.1	52.1	61.9	65.2	41.0	11.5	17.1	26.9
–0.5 – –0.1	60.0	45.1	34.1	23.9	20.7	28.6	31.0	30.4	58.1	85.2	75.6	66.7
–1.0 – –0.6	2.1	0.8				3.4	1.8	0.9	0.9	3.3	5.7	3.7
–1.5 – –1.1	0.7					1.7						1.9
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	145	122	123	92	82	119	113	112	117	122	123	108

Tabel B.316: Dag til dag ændring i temperatur for station Deutsche Bucht dybde 20.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9						0.8						
1.0 – 1.4						1.7	0.9					
0.5 – 0.9	1.4			1.2	5.0	9.3	5.3	2.7	0.8	0.8		0.9
0 – 0.4	34.5	56.6	73.8	86.0	75.2	57.6	65.5	67.0	37.5	13.4	18.9	25.2
–0.5 – –0.1	62.1	43.4	26.2	12.8	19.8	25.4	27.4	28.6	60.8	82.4	77.9	70.1
–1.0 – –0.6	1.4					5.1	0.9	1.8	0.8	3.4	3.3	1.9
–1.5 – –1.1												1.9
–2.0 – –1.6	0.7											
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	145	122	122	86	101	118	113	112	120	119	122	107

Tabel B.317: Dag til dag ændring i temperatur for station Deutsche Bucht dybde 25.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9						0.9						
1.0 – 1.4						0.9						
0.5 – 0.9					2.9	6.8	2.7	0.9	0.8			
0 – 0.4	33.1	55.7	74.2	91.3	84.6	68.4	74.3	73.2	35.6	12.9	16.7	25.2
–0.5 – –0.1	66.9	44.3	25.8	8.7	12.5	21.4	23.0	25.0	63.6	84.7	79.2	70.1
–1.0 – –0.6						1.7		0.9		2.4	4.2	3.7
–1.5 – –1.1												0.9
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	145	122	124	92	104	117	113	112	118	124	120	107

Tabel B.318: Dag til dag ændring i temperatur for station Deutsche Bucht dybde 30.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9						0.9						
1.0 – 1.4						1.7						
0.5 – 0.9	0.7				2.9	6.8	2.7	0.9				
0 – 0.4	30.3	56.2	73.2	90.2	80.8	65.0	76.1	73.7	35.7	8.2	12.4	25.2
–0.5 – –0.1	68.3	43.8	26.8	9.8	16.3	24.8	21.2	25.4	63.4	89.1	83.5	70.1
–1.0 – –0.6	0.7					0.9			0.9	2.7	4.1	3.7
–1.5 – –1.1												0.9
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	145	121	123	92	104	117	113	114	112	110	121	107

Tabel B.319: Dag til dag ændring i temperatur for station Drogden dybde 2.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9							1.4					
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9							1.4					
2.0 – 2.4					1.2		1.4	1.2				
1.5 – 1.9					1.2	2.4	1.4	1.2				
1.0 – 1.4	3.0	1.1		4.3	8.2	7.2	7.0	2.4	2.4			2.6
0.5 – 0.9	6.0	5.4	2.9	14.9	23.5	10.8	19.7	11.9	1.2	8.0	8.3	6.4
0 – 0.4	39.0	44.1	59.8	46.8	31.8	39.8	19.7	34.5	50.0	32.2	27.4	26.9
–0.5 – –0.1	44.0	43.0	36.3	27.7	16.5	28.9	25.4	32.1	37.8	48.3	56.0	50.0
–1.0 – –0.6	6.0	6.5	1.0	5.3	11.8	6.0	11.3	7.1	4.9	9.2	7.1	9.0
–1.5 – –1.1	2.0			1.1	4.7	3.6	7.0	6.0	2.4	2.3	1.2	3.8
–2.0 – –1.6					1.2		2.8	2.4	1.2			1.3
–2.5 – –2.1						1.2	1.4					
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1								1.2				
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	100	93	102	94	85	83	71	84	82	87	84	78

Tabel B.320: Dag til dag ændring i temperatur for station Drogden dybde 4.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4							1.4					
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4							1.4					
2.5 – 2.9						1.2						
2.0 – 2.4					2.3		1.4	1.2				
1.5 – 1.9		1.0			1.1	3.5	4.1	2.3	1.2			
1.0 – 1.4	3.0			3.2	4.5	5.9	6.8	1.2	1.2	1.7		3.8
0.5 – 0.9	8.0	4.2	4.8	12.6	25.0	14.1	17.8	16.3	2.4	11.9	5.0	2.5
0 – 0.4	34.0	44.8	63.5	51.6	37.5	31.8	19.2	23.3	44.0	25.4	30.0	29.1
–0.5 – –0.1	44.0	45.8	29.8	26.3	15.9	31.8	23.3	38.4	40.5	39.0	60.0	51.9
–1.0 – –0.6	9.0	4.2	1.9	6.3	5.7	5.9	11.0	8.1	8.3	18.6	5.0	6.3
–1.5 – –1.1	2.0				4.5	1.2	5.5	5.8	1.2	3.4		5.1
–2.0 – –1.6					2.3	3.5	2.7	2.3	1.2			1.3
–2.5 – –2.1							1.4					
–3.0 – –2.6					1.1	1.2	2.7					
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6							1.4	1.2				
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	100	96	104	95	88	85	73	86	84	59	60	79

Tabel B.321: Dag til dag ændring i temperatur for station Drogden dybde 6.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9							1.4					
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9						1.2						
2.0 – 2.4					4.5		2.7	2.4				
1.5 – 1.9	1.0	1.0				4.7	5.5		1.2			1.3
1.0 – 1.4	2.0		1.0	3.2	4.5	5.9	6.8	4.7	1.2	3.4	2.4	1.3
0.5 – 0.9	10.0	3.1	4.8	10.5	22.7	14.1	15.1	12.9	2.3	3.4	4.7	2.5
0 – 0.4	36.0	46.9	60.6	53.7	30.7	24.7	19.2	31.8	45.3	33.0	30.6	27.8
–0.5 – –0.1	36.0	43.8	29.8	27.4	22.7	35.3	24.7	29.4	38.4	44.3	49.4	57.0
–1.0 – –0.6	13.0	5.2	2.9	5.3	5.7	8.2	11.0	11.8	5.8	13.6	10.6	3.8
–1.5 – –1.1	1.0		1.0		4.5	2.4	8.2	3.5	4.7	2.3	2.4	5.1
–2.0 – –1.6					2.3	1.2	1.4	1.2	1.2			1.3
–2.5 – –2.1	1.0				2.3	1.2		1.2				
–3.0 – –2.6						1.2						
–3.5 – –3.1							2.7					
–4.0 – –3.6								1.2				
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1							1.4					
< –5.6												
antal	100	96	104	95	88	85	73	85	86	88	85	79

Tabel B.322: Dag til dag ændring i temperatur for station Drogden dybde 8.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4							1.4					
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9					1.1		1.4	1.2				
2.0 – 2.4					1.1		1.4					
1.5 – 1.9	5.1	1.0			3.4	5.9	4.1	1.2				1.3
1.0 – 1.4	2.0		1.0	1.1	4.5	4.7	6.8	6.0	1.2	1.1	3.5	1.3
0.5 – 0.9	9.2	4.2	3.9	11.6	22.7	14.1	16.4	10.7	3.5	4.5	3.5	6.3
0 – 0.4	28.6	49.0	56.3	58.9	30.7	30.6	20.5	29.8	39.5	40.4	36.5	24.1
–0.5 – –0.1	38.8	38.5	35.9	25.3	20.5	31.8	21.9	33.3	44.2	43.8	41.2	54.4
–1.0 – –0.6	10.2	6.2	2.9	3.2	8.0	9.4	8.2	10.7	7.0	10.1	14.1	7.6
–1.5 – –1.1	2.0	1.0			4.5	1.2	11.0	3.6	2.3		1.2	3.8
–2.0 – –1.6	2.0				2.3	1.2	2.7	1.2	1.2			
–2.5 – –2.1	2.0				1.1			1.2				1.3
–3.0 – –2.6							2.7		1.2			
–3.5 – –3.1						1.2						
–4.0 – –3.6								1.2				
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6							1.4					
antal	98	96	103	95	88	85	73	84	86	89	85	79

Tabel B.323: Dag til dag ændring i temperatur for station Drogden dybde 10.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4							1.4					
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9					1.1		2.7					
2.0 – 2.4	2.0							1.2				
1.5 – 1.9	1.0	1.1				4.7	1.4	1.2				
1.0 – 1.4	2.0	1.1	2.0		8.0	4.7	8.2	4.8	1.2		1.2	1.3
0.5 – 0.9	9.0	2.1	2.0	12.8	19.5	12.9	15.1	12.0	2.3	3.4	9.4	5.1
0 – 0.4	35.0	45.3	53.9	57.4	36.8	34.1	27.4	34.9	47.7	40.4	28.2	25.3
–0.5 – –0.1	35.0	42.1	40.2	28.7	20.7	31.8	21.9	27.7	38.4	49.4	47.1	60.8
–1.0 – –0.6	14.0	4.2	2.0	1.1	9.2	9.4	4.1	9.6	7.0	6.7	11.8	3.8
–1.5 – –1.1		2.1			2.3	1.2	13.7	4.8	2.3		2.4	3.8
–2.0 – –1.6	2.0	1.1			2.3		1.4	1.2				
–2.5 – –2.1		1.1						1.2				
–3.0 – –2.6							1.4		1.2			
–3.5 – –3.1						1.2						
–4.0 – –3.6								1.2				
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6							1.4					
antal	100	95	102	94	87	85	73	83	86	89	85	79

Tabel B.324: Dag til dag ændring i temperatur for station Elbe dybde 3.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4											1.8	
2.5 – 2.9								1.4				
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4		1.9			3.6	6.0	3.4	1.4			3.5	
0.5 – 0.9	3.7	1.9	1.7	5.3	17.9	12.0	5.7	2.9	1.3	4.0	8.8	5.1
0 – 0.4	40.7	50.0	64.4	59.6	41.1	42.2	49.4	43.5	43.6	25.3	26.3	37.3
–0.5 – –0.1	55.6	46.3	32.2	35.1	28.6	30.1	34.5	44.9	52.6	52.0	38.6	45.8
–1.0 – –0.6			1.7		3.6	8.4	6.9	4.3	1.3	17.3	14.0	10.2
–1.5 – –1.1					3.6	1.2			1.3	1.3		1.7
–2.0 – –1.6					1.8			1.4			1.8	
–2.5 – –2.1											1.8	
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6											3.5	
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	27	54	59	57	56	83	87	69	78	75	57	59

Tabel B.325: Dag til dag ændring i temperatur for station Elbe dybde 6.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4											1.7	
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9						1.2	1.2	1.4				
1.0 – 1.4					5.4	3.5	1.2	1.4			3.4	
0.5 – 0.9	3.7	1.9		3.5	16.1	9.4	4.7		1.3	4.0	6.9	5.0
0 – 0.4	51.9	55.6	74.6	61.4	35.7	43.5	54.7	53.6	43.6	26.7	24.1	40.0
–0.5 – –0.1	44.4	42.6	25.4	35.1	32.1	36.5	33.7	37.7	52.6	52.0	43.1	43.3
–1.0 – –0.6					10.7	5.9	3.5	4.3	1.3	17.3	13.8	10.0
–1.5 – –1.1							1.2	1.4	1.3			1.7
–2.0 – –1.6											1.7	
–2.5 – –2.1											1.7	
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1											1.7	
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1											1.7	
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	27	54	59	57	56	85	86	69	78	75	58	60

Tabel B.326: Dag til dag ændring i temperatur for station Elbe dybde 10.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4											1.7	
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9						1.2		1.4				
1.0 – 1.4					1.8						1.7	
0.5 – 0.9	3.7	1.9		5.3	10.7	11.8	8.0	2.9	2.5	4.0	1.7	1.7
0 – 0.4	48.1	56.6	81.4	61.4	58.9	49.4	56.3	49.3	38.0	28.0	34.5	40.0
–0.5 – –0.1	48.1	39.6	18.6	33.3	19.6	34.1	33.3	43.5	55.7	54.7	39.7	53.3
–1.0 – –0.6		1.9			7.1	3.5	2.3	2.9	2.5	12.0	12.1	5.0
–1.5 – –1.1					1.8				1.3	1.3	1.7	
–2.0 – –1.6											1.7	
–2.5 – –2.1											3.4	
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6											1.7	
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	27	53	59	57	56	85	87	69	79	75	58	60

Tabel B.327: Dag til dag ændring i temperatur for station Elbe dybde 15.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4											1.8	
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9						1.2						
1.0 – 1.4						1.2	1.1	1.4			1.8	
0.5 – 0.9	3.7				5.4	9.4	5.7	1.4	2.6	4.0	1.8	
0 – 0.4	48.1	54.7	78.0	75.4	67.9	47.1	58.6	47.8	42.3	30.7	31.6	41.7
–0.5 – –0.1	48.1	45.3	22.0	22.8	25.0	38.8	33.3	47.8	51.3	46.7	47.4	53.3
–1.0 – –0.6				1.8	1.8	2.4	1.1	1.4	2.6	17.3	7.0	5.0
–1.5 – –1.1									1.3	1.3	1.8	
–2.0 – –1.6											5.3	
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6											1.8	
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	27	53	59	57	56	85	87	69	78	75	57	60

Tabel B.328: Dag til dag ændring i temperatur for station Elbe dybde 20.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4											1.8	
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9						1.2						
1.0 – 1.4						1.2	1.1	1.4		1.3	1.8	
0.5 – 0.9	3.7			1.8	5.4	8.2	5.7	1.4	1.3	1.3	1.8	1.7
0 – 0.4	44.4	56.6	79.7	66.7	67.9	52.9	57.5	49.3	38.5	30.7	35.7	33.3
–0.5 – –0.1	48.1	41.5	20.3	29.8	25.0	34.1	34.5	46.4	56.4	46.7	46.4	60.0
–1.0 – –0.6	3.7	1.9		1.8	1.8	2.4	1.1	1.4	2.6	18.7	3.6	5.0
–1.5 – –1.1									1.3	1.3	1.8	
–2.0 – –1.6											5.4	
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6											1.8	
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	27	53	59	57	56	85	87	69	78	75	56	60

Tabel B.329: Dag til dag ændring i temperatur for station EMS dybde 3.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9					0.8	1.6						
1.0 – 1.4				1.2	1.6	2.3						1.0
0.5 – 0.9	0.9			6.1	13.6	7.0	9.3					
0 – 0.4	28.2	54.3	55.6	61.0	54.4	58.6	53.7	58.9	34.0	17.4	9.2	26.0
–0.5 – –0.1	70.0	43.6	43.3	26.8	23.2	25.0	34.3	39.3	66.0	81.7	86.8	69.0
–1.0 – –0.6	0.9	2.1	1.1	3.7	4.0	4.7	2.8	1.8		0.9	3.9	4.0
–1.5 – –1.1				1.2	2.4							
–2.0 – –1.6						0.8						
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	110	94	90	82	125	128	108	56	100	115	76	100

Tabel B.330: Dag til dag ændring i temperatur for station EMS dybde 6.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9					1.0	0.8	0.8					
1.0 – 1.4				1.8	1.0		1.7					1.1
0.5 – 0.9	1.0		5.4	3.6	11.5	5.4	9.2					1.1
0 – 0.4	28.3	51.0	50.0	70.9	52.9	65.1	52.5	57.9	39.6	18.8	11.2	24.2
–0.5 – –0.1	69.7	45.1	42.9	18.2	26.0	25.6	30.0	42.1	60.4	81.2	84.7	68.4
–1.0 – –0.6	1.0	3.9	1.8	3.6	5.8	3.1	5.0				4.1	5.3
–1.5 – –1.1				1.8	1.9		0.8					
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	99	51	56	55	104	129	120	57	101	117	98	95

Tabel B.331: Dag til dag ændring i temperatur for station EMS dybde 10.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4					1.6							
1.5 – 1.9					1.6		2.5					
1.0 – 1.4				1.2	0.8	2.3	0.8					
0.5 – 0.9	0.9		1.1	4.8	7.4	5.5	5.0	1.8				1.7
0 – 0.4	27.0	53.7	57.8	65.1	59.8	66.4	52.1	58.2	37.6	17.1	13.3	23.5
–0.5 – –0.1	71.3	44.2	40.0	26.5	23.0	23.4	35.5	40.0	62.4	82.1	82.7	72.3
–1.0 – –0.6	0.9	2.1	1.1	1.2	4.9	0.8	4.1			0.9	4.1	2.5
–1.5 – –1.1				1.2		1.6						
–2.0 – –1.6					0.8							
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	115	95	90	83	122	128	121	55	101	117	98	119

Tabel B.332: Dag til dag ændring i temperatur for station EMS dybde 15.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9						0.9						
1.0 – 1.4					2.4		0.9					
0.5 – 0.9	1.9		2.5	4.9	5.6	2.7	1.9	1.8				
0 – 0.4	31.8	50.7	60.5	68.3	64.5	77.9	66.4	62.5	36.0	19.0	12.0	24.4
–0.5 – –0.1	61.7	46.3	37.0	25.6	25.8	17.7	29.9	35.7	64.0	80.2	81.5	74.8
–1.0 – –0.6	4.7	3.0		1.2	0.8	0.9	0.9			0.9	6.5	0.8
–1.5 – –1.1					0.8							
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	107	67	81	82	124	113	107	56	100	116	92	119

Tabel B.333: Dag til dag ændring i temperatur for station EMS dybde 20.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4						1.6	0.8					
0.5 – 0.9	0.9		3.0	1.6	5.8	2.3	1.7	1.8				
0 – 0.4	25.2	50.7	59.1	73.8	76.0	79.7	72.5	61.4	36.4	13.8	11.5	22.9
–0.5 – –0.1	72.9	47.8	36.4	24.6	18.3	15.6	25.0	36.8	63.6	86.2	85.4	75.4
–1.0 – –0.6	0.9	1.4	1.5			0.8					3.1	1.7
–1.5 – –1.1												
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	107	69	66	61	104	128	120	57	99	116	96	118

Tabel B.334: Dag til dag ændring i temperatur for station EMS dybde 25.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4						1.6	0.8					1.7
0.5 – 0.9	0.9		2.2		6.7	2.4	1.7	5.3			1.0	
0 – 0.4	29.6	51.6	53.9	75.8	78.8	77.6	72.7	64.9	36.4	15.5	13.4	21.0
–0.5 – –0.1	68.7	47.4	42.7	24.2	14.4	18.4	24.8	29.8	63.6	84.5	81.4	72.3
–1.0 – –0.6	0.9	1.1	1.1								3.1	4.2
–1.5 – –1.1											1.0	0.8
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	115	95	89	62	104	125	121	57	99	116	97	119

Tabel B.335: Dag til dag ændring i temperatur for station EMS dybde 30.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4						0.8						
0.5 – 0.9	1.0		1.4	1.9	8.9	2.3	2.5	5.3				
0 – 0.4	33.3	44.2	54.9	79.6	74.3	81.4	72.7	61.4	38.4	17.9	10.4	20.2
–0.5 – –0.1	63.7	54.7	43.7	18.5	15.8	15.5	24.8	33.3	61.6	82.1	85.4	79.0
–1.0 – –0.6	2.0	1.2			1.0						4.2	0.8
–1.5 – –1.1												
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	102	86	71	54	101	129	121	57	99	117	96	119

Tabel B.336: Dag til dag ændring i temperatur for station Farødybde 2.8 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4								3.3				
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4	1.7				6.7	9.1	3.6					
0.5 – 0.9		18.5	3.3	10.3	16.7	9.1	3.6	3.3	3.4	1.8	5.2	10.0
0 – 0.4	48.3	51.9	53.3	69.0	40.0	50.0	42.9	43.3	48.3	23.6	27.6	38.3
–0.5 – –0.1	46.6	22.2	40.0	17.2	30.0	22.7	42.9	30.0	44.8	65.5	58.6	36.7
–1.0 – –0.6		3.7	3.3	3.4		4.5	3.6	16.7	3.4	9.1	8.6	13.3
–1.5 – –1.1	3.4	3.7				4.5	3.6	3.3				1.7
–2.0 – –1.6					6.7							
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	58	27	30	29	30	22	28	30	29	55	58	60

Tabel B.337: Dag til dag ændring i temperatur for station Farødybde 5.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4								3.3				
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4	1.7				3.3	9.1	3.7					1.7
0.5 – 0.9		22.2	3.3	13.8	13.3	9.1	3.7	3.3	3.4	1.8	5.2	6.7
0 – 0.4	53.4	51.9	53.3	62.1	53.3	54.5	40.7	40.0	51.7	27.3	24.1	38.3
–0.5 – –0.1	41.4	18.5	36.7	20.7	20.0	22.7	40.7	30.0	41.4	61.8	58.6	36.7
–1.0 – –0.6		3.7	6.7	3.4	3.3		7.4	20.0	3.4	7.3	12.1	16.7
–1.5 – –1.1	3.4	3.7			3.3	4.5	3.7	3.3		1.8		
–2.0 – –1.6					3.3							
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	58	27	30	29	30	22	27	30	29	55	58	60

Tabel B.338: Dag til dag ændring i temperatur for station Farødybde 8.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4								3.3				
1.5 – 1.9					3.3							
1.0 – 1.4						13.6	3.8					
0.5 – 0.9		22.2	3.3	13.8	16.7	9.1	3.8	3.3	3.4	1.9	5.3	6.7
0 – 0.4	51.7	55.6	50.0	65.5	53.3	50.0	38.5	43.3	51.7	29.6	29.8	40.0
–0.5 – –0.1	46.6	14.8	40.0	13.8	16.7	22.7	46.2	30.0	41.4	57.4	54.4	38.3
–1.0 – –0.6		3.7	6.7	6.9	3.3		3.8	16.7	3.4	9.3	10.5	15.0
–1.5 – –1.1	1.7				3.3	4.5	3.8	3.3		1.9		
–2.0 – –1.6		3.7			3.3							
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	58	27	30	29	30	22	26	30	29	54	57	60

Tabel B.339: Dag til dag ændring i temperatur for station Farødybde 11.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4								3.3				
1.5 – 1.9					3.3							
1.0 – 1.4						13.6	4.0					
0.5 – 0.9	1.8	22.2		17.9	13.3	9.1	12.0	3.3	3.4		5.3	6.7
0 – 0.4	57.9	55.6	56.7	57.1	53.3	45.5	32.0	43.3	51.7	34.0	31.6	46.7
–0.5 – –0.1	36.8	14.8	33.3	21.4	20.0	27.3	44.0	33.3	41.4	52.8	50.9	33.3
–1.0 – –0.6	3.5	3.7	10.0	3.6	3.3		4.0	10.0	3.4	11.3	12.3	13.3
–1.5 – –1.1					3.3	4.5	4.0	6.7		1.9		
–2.0 – –1.6		3.7			3.3							
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	57	27	30	28	30	22	25	30	29	53	57	60

Tabel B.340: Dag til dag ændring i temperatur for station Farødybde 14.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4					3.3			3.3				
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4						13.6	4.0					
0.5 – 0.9	3.5	14.8	3.3	14.3	13.3	9.1	8.0	3.3	3.4		5.3	6.8
0 – 0.4	47.4	55.6	53.3	60.7	53.3	45.5	36.0	46.7	51.7	32.1	31.6	39.0
–0.5 – –0.1	43.9	22.2	30.0	21.4	23.3	22.7	44.0	26.7	41.4	50.9	50.9	40.7
–1.0 – –0.6	5.3	3.7	13.3	3.6		9.1	4.0	16.7	3.4	15.1	12.3	13.6
–1.5 – –1.1					3.3		4.0	3.3		1.9		
–2.0 – –1.6		3.7			3.3							
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	57	27	30	28	30	22	25	30	29	53	57	59

Tabel B.341: Dag til dag ændring i temperatur for station Farødybde 21.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9								3.3				
2.0 – 2.4					3.3							
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4						9.1	4.0					
0.5 – 0.9	6.5	14.8	3.3	14.3	13.3	13.6	8.0	6.7	3.4		5.3	10.2
0 – 0.4	38.7	55.6	53.3	60.7	56.7	50.0	36.0	36.7	44.8	32.1	33.3	37.3
–0.5 – –0.1	48.4	25.9	33.3	21.4	13.3	18.2	40.0	36.7	48.3	50.9	49.1	35.6
–1.0 – –0.6	3.2		10.0	3.6	6.7	9.1	8.0	13.3	3.4	15.1	12.3	16.9
–1.5 – –1.1	3.2				3.3		4.0			1.9		
–2.0 – –1.6		3.7			3.3			3.3				
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	31	27	30	28	30	22	25	30	29	53	57	59

Tabel B.342: Dag til dag ændring i temperatur for station "Early"Flinten dybde 1.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9	3.3											
1.0 – 1.4					3.3	1.9	3.3					
0.5 – 0.9		3.7		2.7	26.7	22.2	10.0	8.3	7.0	4.8	22.2	6.7
0 – 0.4	30.0	55.6	66.7	70.3	43.3	42.6	41.7	48.3	47.4	23.8	22.2	40.0
–0.5 – –0.1	60.0	37.0	33.3	27.0	23.3	25.9	30.0	31.7	33.3	57.1	33.3	50.0
–1.0 – –0.6	6.7	3.7			3.3	1.9	8.3	11.7	8.8	14.3	11.1	3.3
–1.5 – –1.1						1.9	5.0		3.5		11.1	
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1						3.7	1.7					
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	30	27	30	37	30	54	60	60	57	21	9	30

Tabel B.343: Dag til dag ændring i temperatur for station "Early"Flinten dybde 7.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4												
0.5 – 0.9								17.2	14.3			
0 – 0.4							64.3	44.8	35.7			
–0.5 – –0.1							35.7	20.7	32.1			
–1.0 – –0.6								17.2	10.7			
–1.5 – –1.1									7.1			
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	0	0	0	0	0	0	14	29	28	0	0	0

Tabel B.344: Dag til dag ændring i temperatur for station Flinten dybde 3.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4		0.6						0.7				
4.5 – 4.9		0.6										
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4								0.7	0.6			
2.5 – 2.9	0.5		0.6		1.1						0.6	0.6
2.0 – 2.4		0.6	0.6			0.6						
1.5 – 1.9				0.6	0.5	1.2		0.7	0.6	0.7	0.6	
1.0 – 1.4	3.3	1.1	0.6	2.5	5.4	4.9	5.2	1.4	1.2	2.0	4.2	3.4
0.5 – 0.9	6.0	5.6	2.2	6.8	10.3	19.5	19.0	6.3	3.7	8.1	4.8	5.1
0 – 0.4	33.3	49.2	64.1	60.2	51.1	37.2	40.5	53.1	35.2	26.2	28.5	34.5
–0.5 – –0.1	45.4	33.0	28.2	25.5	22.8	24.4	21.6	25.9	46.3	52.3	38.2	39.5
–1.0 – –0.6	7.7	5.6	2.8	2.5	4.3	7.3	11.1	6.3	8.0	8.7	18.8	12.4
–1.5 – –1.1	2.7	0.6		1.2	2.7	3.7		1.4	1.2	1.3	2.4	3.4
–2.0 – –1.6	0.5	1.7		0.6	1.6	0.6	2.0	1.4	1.2		1.2	
–2.5 – –2.1		1.1	1.1			0.6	0.7	0.7		0.7	0.6	0.6
–3.0 – –2.6								0.7	0.6			0.6
–3.5 – –3.1	0.5	0.6						0.7	0.6			
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1									0.6			
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	183	179	181	161	184	164	153	143	162	149	165	177

Tabel B.345: Dag til dag ændring i temperatur for station Flinten dybde 4.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9								0.7				
5.0 – 5.4								0.7				
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4								0.7				0.6
3.5 – 3.9	0.5				0.5							
3.0 – 3.4		1.1	0.6							0.6		
2.5 – 2.9								0.7			0.6	
2.0 – 2.4	0.5	1.1			1.1	0.6		0.7				0.6
1.5 – 1.9	2.2	1.1	0.6	1.9	0.5	0.6	0.6	1.4	0.7		0.6	3.4
1.0 – 1.4	4.9	1.7	1.1	1.2	4.8	6.7	5.1	2.8	4.0	3.8	2.9	2.8
0.5 – 0.9	6.6	2.8	2.2	6.2	11.8	19.4	18.6	7.0	6.0	5.1	5.3	6.2
0 – 0.4	29.5	46.3	60.0	59.0	48.4	31.5	40.4	47.6	35.1	27.8	28.8	27.7
–0.5 – –0.1	39.3	35.0	32.2	26.1	23.7	29.7	18.6	24.5	37.7	48.7	42.4	37.9
–1.0 – –0.6	9.3	5.6	1.7	4.3	5.9	7.9	12.2	5.6	9.3	11.4	13.5	14.1
–1.5 – –1.1	2.7	1.7		0.6	2.2	3.0	1.3	2.1	2.6	1.3	3.5	4.5
–2.0 – –1.6	2.2	1.1	1.1	0.6			2.6		0.7	0.6	2.4	0.6
–2.5 – –2.1	0.5	0.6	0.6		1.1	0.6	0.6	2.1	2.0			1.1
–3.0 – –2.6		1.1						0.7	0.7			0.6
–3.5 – –3.1	0.5	0.6						0.7		0.6		
–4.0 – –3.6	0.5								0.7			
–4.5 – –4.1								1.4				
–5.0 – –4.6								0.7				
–5.5 – –5.1	0.5								0.7			
< –5.6												
antal	183	177	180	161	186	165	156	143	151	158	170	177

Tabel B.346: Dag til dag ændring i temperatur for station Flinten dybde 6.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6								0.7				
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4								0.7				
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4					0.5							0.6
3.5 – 3.9		0.6	0.6					0.7				
3.0 – 3.4		0.6										
2.5 – 2.9	0.5				0.5						1.2	
2.0 – 2.4	1.6	1.1				0.6	0.7	2.1	1.3			1.1
1.5 – 1.9	3.8	1.7		0.6	1.1	1.2		0.7	2.6	1.2		4.0
1.0 – 1.4	4.4	1.1	1.1		3.8	6.1	6.6	4.9	2.6	3.1	2.9	4.0
0.5 – 0.9	6.0	3.4	2.8	8.7	10.2	16.4	15.8	9.9	5.9	4.9	7.6	5.6
0 – 0.4	29.5	49.2	58.6	60.9	52.7	37.6	44.7	39.4	31.6	29.6	27.1	25.4
–0.5 – –0.1	35.0	31.1	34.3	25.5	21.0	24.8	16.4	25.4	40.8	48.8	40.6	38.4
–1.0 – –0.6	10.9	7.3	1.1	2.5	6.5	6.7	9.9	5.6	7.2	9.9	15.3	14.1
–1.5 – –1.1	3.3	1.1	1.1	1.2	2.7	5.5	2.0	4.2	2.6	0.6	3.5	2.8
–2.0 – –1.6	2.2	1.1	0.6	0.6		0.6	1.3			1.2	1.2	1.1
–2.5 – –2.1	1.6				1.1	0.6	2.0	0.7	2.0	0.6		1.7
–3.0 – –2.6		0.6					0.7	0.7	1.3			0.6
–3.5 – –3.1	0.5	0.6						1.4				0.6
–4.0 – –3.6	0.5	0.6						0.7	0.7		0.6	
–4.5 – –4.1								1.4				
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1									0.7			
< –5.6								0.7	0.7			
antal	183	177	181	161	186	165	152	142	152	162	170	177

Tabel B.347: Dag til dag ændring i temperatur for station Flinten dybde 7.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4								0.7	0.7			
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4					0.5			1.4				
3.5 – 3.9	1.1	1.1							0.7			
3.0 – 3.4											1.2	
2.5 – 2.9	0.5				0.5							1.1
2.0 – 2.4	0.5	1.7	0.6				0.6	1.4	0.7			1.7
1.5 – 1.9	2.7	1.1	1.1	0.6	0.5	3.7	1.3	1.4	2.7	0.6	0.6	4.0
1.0 – 1.4	4.4	1.1	1.1	0.6	3.2	6.1	5.8	5.7	1.3	4.3	2.4	2.3
0.5 – 0.9	6.0	4.0	3.9	7.1	13.4	15.2	16.7	5.7	6.7	5.6	8.2	7.3
0 – 0.4	26.2	45.5	53.6	60.9	50.5	37.8	42.9	46.1	32.7	31.1	24.7	27.1
–0.5 – –0.1	40.4	33.0	35.4	27.6	19.4	23.8	16.7	23.4	37.3	44.1	42.9	33.3
–1.0 – –0.6	9.3	8.5	2.8	1.9	7.5	9.1	9.6	5.7	9.3	11.8	14.1	16.4
–1.5 – –1.1	3.8	1.1	1.1	1.3	3.8	2.4	3.2	2.8	2.7	1.2	4.1	2.3
–2.0 – –1.6	1.6	1.1	0.6			0.6	0.6			1.2	1.2	1.7
–2.5 – –2.1	1.6				0.5	0.6	1.3	0.7	1.3		0.6	1.7
–3.0 – –2.6	0.5	0.6					0.6	0.7	1.3			0.6
–3.5 – –3.1		0.6				0.6	0.6	2.1				
–4.0 – –3.6	0.5							1.4	0.7			0.6
–4.5 – –4.1	0.5	0.6										
–5.0 – –4.6								0.7	0.7			
–5.5 – –5.1									0.7			
< –5.6									0.7			
antal	183	176	181	156	186	164	156	141	150	161	170	177

Tabel B.348: Dag til dag ændring i temperatur for station Flinten dybde 9.1 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6									0.6			
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9								1.4				
4.0 – 4.4					0.6							
3.5 – 3.9	1.1	1.1										
3.0 – 3.4											1.2	0.6
2.5 – 2.9						0.7		1.4				0.6
2.0 – 2.4	1.1	1.7	1.1			0.7			1.9	0.6		1.7
1.5 – 1.9	3.3	1.7		0.6	0.6	2.8	1.3	2.1	2.5	1.2	0.6	4.0
1.0 – 1.4	3.8	0.6	0.6	0.6	3.8	4.1	6.5	5.6	1.9	3.1	4.1	3.4
0.5 – 0.9	6.0	4.5	3.9	8.1	13.5	17.9	16.1	6.2	6.2	6.2	7.1	5.6
0 – 0.4	28.4	46.0	53.3	60.9	51.9	37.2	42.6	47.9	30.6	29.6	28.2	27.1
–0.5 – –0.1	39.3	31.2	36.1	26.1	20.5	25.5	18.1	21.5	38.1	43.2	38.2	31.1
–1.0 – –0.6	8.2	9.1	3.9	2.5	5.1	5.5	9.0	4.2	10.0	13.0	14.1	19.8
–1.5 – –1.1	3.8	1.1	1.1	1.2	2.6	3.4	3.2	2.8	2.5	1.9	5.3	1.1
–2.0 – –1.6	1.6	0.6			0.6	0.7	0.6	2.1	0.6	1.2	0.6	2.3
–2.5 – –2.1	1.6	0.6			0.6		1.3	1.4	1.2		0.6	1.1
–3.0 – –2.6	0.5	0.6				0.7	0.6	0.7	1.2			0.6
–3.5 – –3.1						0.7	0.6	0.7				0.6
–4.0 – –3.6		0.6						1.4				0.6
–4.5 – –4.1	0.5	0.6						0.7	0.6			
–5.0 – –4.6	0.5								0.6			
–5.5 – –5.1									0.6			
< –5.6									0.6			
antal	183	176	180	161	156	145	155	144	160	162	170	177

Tabel B.349: Dag til dag ændring i temperatur for station Gamle Bro dybde 5.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9					0.7							
3.0 – 3.4							0.9					
2.5 – 2.9						1.9	0.9					
2.0 – 2.4					0.7	2.8	0.9	1.7				
1.5 – 1.9	1.6				0.7	1.9	2.7	0.8	0.9			
1.0 – 1.4					5.7	12.1	6.3	2.5	0.9			
0.5 – 0.9	4.9	1.5	1.5	3.1	16.4	13.1	23.4	9.2	0.9			2.0
0 – 0.4	34.1	42.2	68.4	77.6	45.0	29.9	27.9	37.8	31.3	26.3	28.0	22.0
–0.5 – –0.1	56.1	52.6	30.1	18.4	17.9	18.7	18.9	26.9	58.3	71.2	67.2	70.0
–1.0 – –0.6	2.4	3.7		1.0	4.3	5.6	8.1	13.4	6.1	2.5	4.0	6.0
–1.5 – –1.1	0.8				3.6	2.8	5.4	5.0	0.9		0.8	
–2.0 – –1.6					2.9	2.8	1.8	2.5	0.9			
–2.5 – –2.1					1.4	3.7	0.9					
–3.0 – –2.6						2.8						
–3.5 – –3.1						0.9	1.8					
–4.0 – –3.6					0.7	0.9						
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	123	135	136	98	140	107	111	119	115	118	125	150

Tabel B.350: Dag til dag ændring i temperatur for station Gamle Bro dybde 10.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9						1.9						
3.0 – 3.4					0.7	0.9						
2.5 – 2.9				1.0	0.7	0.9		0.8				
2.0 – 2.4					0.7	2.8	1.8	1.7				
1.5 – 1.9	1.7				3.6	3.7	4.5	0.8	0.9			
1.0 – 1.4	0.8				4.3	12.1	5.4	2.5	0.9			0.7
0.5 – 0.9	4.1	1.5	0.7	6.1	20.7	10.3	24.3	13.4	2.6			2.0
0 – 0.4	33.1	45.2	66.2	71.4	35.7	29.0	27.9	28.6	27.8	27.7	32.2	20.7
–0.5 – –0.1	54.5	50.4	33.1	19.4	15.7	15.9	18.0	29.4	60.0	69.7	64.4	70.7
–1.0 – –0.6	5.0	3.0		1.0	10.0	6.5	4.5	11.8	5.2	2.5	3.4	6.0
–1.5 – –1.1	0.8				2.9	3.7	7.2	9.2	1.7			
–2.0 – –1.6				1.0		1.9	4.5	1.7	0.9			
–2.5 – –2.1					1.4	4.7						
–3.0 – –2.6					2.1	2.8	0.9					
–3.5 – –3.1							0.9					
–4.0 – –3.6						2.8						
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6					0.7							
–5.5 – –5.1					0.7							
< –5.6												
antal	121	135	136	98	140	107	111	119	115	119	118	150

Tabel B.351: Dag til dag ændring i temperatur for station Gamle Bro dybde 15.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4						1.9						
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9					1.4	2.8		0.8				
2.0 – 2.4					2.9	2.8	1.8	2.5				
1.5 – 1.9	0.8				2.9	7.5	5.4	2.5	0.9			
1.0 – 1.4	1.6			2.0	3.6	8.4	6.3	0.8	0.9			
0.5 – 0.9	4.9	2.2	1.5	4.1	18.8	15.0	22.5	15.1	4.3		0.8	3.3
0 – 0.4	34.1	42.2	67.6	70.4	33.3	28.0	29.7	29.4	27.8	25.4	29.4	22.0
–0.5 – –0.1	53.7	52.6	30.1	21.4	16.7	12.1	18.0	23.5	60.0	72.0	61.1	68.7
–1.0 – –0.6	4.1	3.0	0.7	2.0	6.5	4.7	4.5	13.4	3.5	2.5	7.9	6.0
–1.5 – –1.1	0.8				4.3	5.6	7.2	5.9	0.9		0.8	
–2.0 – –1.6					2.9	2.8	0.9	4.2	1.7			
–2.5 – –2.1					2.2	2.8	0.9	0.8				
–3.0 – –2.6					0.7	1.9	0.9	0.8				
–3.5 – –3.1					1.4	0.9	0.9					
–4.0 – –3.6					1.4							
–4.5 – –4.1						0.9						
–5.0 – –4.6						0.9						
–5.5 – –5.1						0.9						
< –5.6					0.7		0.9					
antal	123	135	136	98	138	107	111	119	115	118	126	150

Tabel B.352: Dag til dag ændring i temperatur for station Gamle Bro dybde 20.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4						1.0						
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4					0.7	1.0						
2.5 – 2.9					0.7	1.9						
2.0 – 2.4					1.4	1.0		3.8				
1.5 – 1.9	0.8				3.6	2.9	5.9	5.7				
1.0 – 1.4	1.6			2.0	5.7	12.4	7.8					
0.5 – 0.9	5.7	0.7	1.5	5.1	15.7	17.1	20.6	13.2	3.8		1.0	3.0
0 – 0.4	32.5	48.9	71.3	68.4	35.7	30.5	32.4	32.1	32.4	26.8	29.9	21.1
–0.5 – –0.1	54.5	45.9	26.5	21.4	12.1	11.4	15.7	20.8	56.2	69.5	62.9	69.2
–1.0 – –0.6	4.1	4.4	0.7	2.0	10.0	5.7	8.8	8.5	5.7	3.7	5.2	6.8
–1.5 – –1.1	0.8			1.0	5.7	5.7	4.9	8.5			1.0	
–2.0 – –1.6					1.4	1.9		6.6	1.9			
–2.5 – –2.1					4.3	4.8						
–3.0 – –2.6					0.7	1.0	1.0					
–3.5 – –3.1						1.0	1.0	0.9				
–4.0 – –3.6					1.4							
–4.5 – –4.1							1.0					
–5.0 – –4.6					0.7		1.0					
–5.5 – –5.1						1.0						
< –5.6												
antal	123	135	136	98	140	105	102	106	105	82	97	133

Tabel B.353: Dag til dag ændring i temperatur for station Gamle Bro dybde 22.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4					0.9	1.3						
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9								1.7				
2.0 – 2.4					1.7	1.3						
1.5 – 1.9	0.8				5.2	5.1	1.5					
1.0 – 1.4	1.6			3.1	6.0	7.7	6.1	1.7	1.8			0.8
0.5 – 0.9	7.3	1.5	2.2	4.1	14.7	24.4	18.2	20.3	1.8	1.0	2.9	1.7
0 – 0.4	31.7	46.7	67.6	66.3	28.4	29.5	39.4	30.5	38.6	28.1	30.9	28.0
–0.5 – –0.1	51.2	46.7	29.4	24.5	17.2	11.5	16.7	27.1	49.1	64.6	57.4	59.3
–1.0 – –0.6	6.5	5.2	0.7	1.0	11.2	3.8	10.6	8.5	8.8	5.2	8.8	10.2
–1.5 – –1.1	0.8			1.0	6.9	6.4	6.1	5.1		1.0		
–2.0 – –1.6					2.6	2.6		1.7				
–2.5 – –2.1					1.7	2.6	1.5	1.7				
–3.0 – –2.6					0.9	1.3						
–3.5 – –3.1					1.7	1.3		1.7				
–4.0 – –3.6					0.9							
–4.5 – –4.1						1.3						
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	123	135	136	98	116	78	66	59	57	96	68	118

Tabel B.354: Dag til dag ændring i temperatur for station Hjelm Bugt dybde 6.7 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4					1.1							
2.5 – 2.9					1.1							
2.0 – 2.4						2.3						
1.5 – 1.9							1.1	3.5				
1.0 – 1.4				1.1	7.9	9.2	4.4	3.5	2.4		1.4	
0.5 – 0.9	3.4	0.9	1.7	4.2	19.1	12.6	14.4	9.4	1.2	1.2	1.4	1.0
0 – 0.4	39.8	45.3	59.3	69.5	40.4	35.6	42.2	41.2	31.8	30.2	37.0	28.3
–0.5 – –0.1	54.2	52.8	38.1	24.2	19.1	27.6	25.6	28.2	54.1	61.6	47.9	60.6
–1.0 – –0.6	2.5	0.9	0.8	1.1	3.4	8.0	4.4	3.5	8.2	5.8	11.0	9.1
–1.5 – –1.1					2.2	2.3	4.4	5.9	1.2	1.2	1.4	1.0
–2.0 – –1.6					3.4	1.1	1.1	2.4				
–2.5 – –2.1					1.1		1.1	1.2	1.2			
–3.0 – –2.6					1.1		1.1					
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6								1.2				
–4.5 – –4.1						1.1						
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	118	106	118	95	89	87	90	85	85	86	73	99

Tabel B.355: Dag til dag ændring i temperatur for station Hjelm Bugt dybde 10.2 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6								2.4				
5.5 – 5.9								1.2				
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4						1.1	1.1	1.2				
3.5 – 3.9							1.1	1.2				
3.0 – 3.4						1.1	1.1	2.4				
2.5 – 2.9					2.2	2.3	3.3	3.6				
2.0 – 2.4					1.1	2.3	3.3	3.6				
1.5 – 1.9				1.1	1.1	3.4	2.2	1.2	1.2	1.2		
1.0 – 1.4	0.8			2.1	12.4	6.9	4.4		2.4	1.2	1.4	1.0
0.5 – 0.9	3.4	3.8	3.4	4.2	15.7	14.9	11.1	10.7	7.1	2.3	4.1	5.1
0 – 0.4	34.7	42.5	53.4	64.2	29.2	24.1	25.6	31.0	31.8	27.9	34.2	28.3
–0.5 – –0.1	58.5	52.8	42.4	25.3	19.1	20.7	21.1	14.3	34.1	53.5	47.9	48.5
–1.0 – –0.6	1.7	0.9	0.8	2.1	9.0	9.2	8.9	4.8	17.6	10.5	8.2	16.2
–1.5 – –1.1				1.1	4.5	5.7	4.4	11.9	4.7	2.3	2.7	
–2.0 – –1.6	0.8				2.2	2.3	4.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.0
–2.5 – –2.1					3.4	2.3	2.2					
–3.0 – –2.6						3.4	2.2	4.8				
–3.5 – –3.1							1.1					
–4.0 – –3.6								2.4				
–4.5 – –4.1							2.2					
–5.0 – –4.6								1.2				
–5.5 – –5.1												
< –5.6								1.2				
antal	118	106	118	95	89	87	90	84	85	86	73	99

Tabel B.356: Dag til dag ændring i temperatur for station Hjelm Bugt dybde 15.4 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6						2.3		1.2	1.2			
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9					1.1	1.1						
4.0 – 4.4						1.1	1.1		1.2			
3.5 – 3.9					1.1			1.2				
3.0 – 3.4						2.3		1.2				
2.5 – 2.9					1.1	3.4	3.3	3.5		1.2	1.4	
2.0 – 2.4	0.8			1.1	3.4	4.6	1.1	4.7	2.4	1.2		
1.5 – 1.9					1.1	8.0	6.7	3.5		1.2	1.4	
1.0 – 1.4	1.7	2.8	0.8	2.1	2.2	5.7	7.8	5.9	9.4	2.3		5.1
0.5 – 0.9	6.8	6.6	3.4	7.4	16.9	8.0	11.1	9.4	12.9	3.5	5.5	3.0
0 – 0.4	35.6	36.8	54.2	55.8	29.2	17.2	15.6	24.7	24.7	26.7	27.4	30.3
–0.5 – –0.1	42.4	41.5	38.1	29.5	23.6	13.8	22.2	14.1	22.4	48.8	42.5	38.4
–1.0 – –0.6	10.2	9.4	3.4	2.1	9.0	10.3	8.9	16.5	15.3	9.3	16.4	16.2
–1.5 – –1.1	1.7	1.9		1.1	4.5	5.7	10.0	2.4	1.2	2.3	5.5	3.0
–2.0 – –1.6					1.1	2.3	6.7	4.7	3.5	1.2		3.0
–2.5 – –2.1	0.8	0.9		1.1	1.1	2.3	2.2	1.2	1.2			1.0
–3.0 – –2.6					2.2	1.1	1.1	2.4		2.3		
–3.5 – –3.1					1.1	3.4	1.1		2.4			
–4.0 – –3.6					1.1	2.3		1.2	1.2			
–4.5 – –4.1								2.4				
–5.0 – –4.6						2.3	1.1					
–5.5 – –5.1						1.1						
< –5.6						1.1			1.2			
antal	118	106	118	95	89	87	90	85	85	86	73	99

Tabel B.357: Dag til dag ændring i temperatur for station Hjelm Bugt dybde 21.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6						1.1	1.1					
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9									1.2		1.4	
3.0 – 3.4					1.1		2.2					
2.5 – 2.9	0.8											
2.0 – 2.4		0.9			1.1			1.2				
1.5 – 1.9	0.8						2.2	3.5	1.2	1.2		2.0
1.0 – 1.4	2.5				1.1	3.4	3.4	2.4	1.2	2.3	4.1	2.0
0.5 – 0.9	6.8	3.8	3.4	1.1		8.0	10.1	5.9	5.9	4.7	1.4	4.0
0 – 0.4	41.5	44.3	54.2	76.8	79.5	52.9	28.1	37.6	40.0	37.2	30.1	32.3
–0.5 – –0.1	35.6	44.3	39.0	21.1	13.6	26.4	40.4	36.5	38.8	45.3	42.5	45.5
–1.0 – –0.6	5.9	5.7	3.4	1.1		5.7	5.6	9.4	9.4	4.7	12.3	8.1
–1.5 – –1.1	5.1				1.1	1.1	2.2	2.4	1.2	2.3	5.5	3.0
–2.0 – –1.6					1.1		2.2		1.2	1.2	1.4	
–2.5 – –2.1	0.8						1.1	1.2		1.2		3.0
–3.0 – –2.6											1.4	
–3.5 – –3.1					1.1		1.1					
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1		0.9				1.1						
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	118	106	118	95	88	87	89	85	85	86	73	99

Tabel B.358: Dag til dag ændring i temperatur for station Kiel dybde m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4					0.6							
1.5 – 1.9					1.9	2.3		0.8				
1.0 – 1.4				1.3	4.5	2.3	2.2	0.8				0.7
0.5 – 0.9	4.5	0.6	2.0	6.4	18.8	14.4	17.0	10.1		2.1	0.8	2.2
0 – 0.4	43.9	55.5	60.0	61.8	38.3	43.2	40.0	42.0	40.8	26.3	26.7	33.8
–0.5 – –0.1	47.8	43.9	37.3	28.7	24.7	28.0	30.4	37.0	45.9	63.2	62.6	53.2
–1.0 – –0.6	3.8		0.7	1.3	7.8	8.3	7.4	5.0	12.2	8.4	9.9	8.6
–1.5 – –1.1				0.6	1.3		2.2	2.5	1.0			1.4
–2.0 – –1.6					1.3	0.8	0.7	0.8				
–2.5 – –2.1					0.6	0.8						
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1								0.8				
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	157	155	150	157	154	132	135	119	98	95	131	139

Tabel B.359: Dag til dag ændring i temperatur for station Kiel dybde 1.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4					0.7							
1.5 – 1.9				0.6	1.3	2.3		0.8				
1.0 – 1.4				0.6	5.2	2.3	2.2	0.8				0.7
0.5 – 0.9	3.2	0.6	2.0	7.1	19.6	14.4	17.0	9.2		2.1	0.8	1.4
0 – 0.4	47.8	55.2	58.4	62.6	39.2	43.9	39.3	43.7	40.8	23.2	25.4	35.3
–0.5 – –0.1	44.6	44.2	39.6	27.7	22.9	27.3	30.4	36.1	45.9	66.3	67.7	55.4
–1.0 – –0.6	4.5			0.6	7.8	8.3	8.1	5.0	12.2	8.4	6.2	6.5
–1.5 – –1.1				0.6	1.3		2.2	2.5	1.0			0.7
–2.0 – –1.6					1.3	0.8	0.7	0.8				
–2.5 – –2.1					0.7	0.8						
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1								0.8				
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	157	154	149	155	153	132	135	119	98	95	130	139

Tabel B.360: Dag til dag ændring i temperatur for station Kiel dybde 2.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9					2.4	1.9		0.8				
1.0 – 1.4				1.6	6.5	1.0	3.0					0.7
0.5 – 0.9	3.9	0.8	2.5	8.6	17.9	14.4	15.6	10.9		1.0	0.8	1.4
0 – 0.4	47.3	50.8	57.4	59.4	38.2	45.2	40.7	43.7	40.8	25.0	22.9	33.1
–0.5 – –0.1	45.7	48.4	39.3	28.9	24.4	27.9	31.1	35.3	45.9	66.7	71.0	56.1
–1.0 – –0.6	3.1		0.8	0.8	6.5	7.7	6.7	5.0	12.2	7.3	5.3	7.9
–1.5 – –1.1				0.8	1.6		2.2	2.5	1.0			0.7
–2.0 – –1.6					1.6	1.0	0.7	0.8				
–2.5 – –2.1					0.8	1.0						
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1								0.8				
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	129	128	122	128	123	104	135	119	98	96	131	139

Tabel B.361: Dag til dag ændring i temperatur for station Kiel dybde 4.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4						1.9						
2.5 – 2.9							0.8					
2.0 – 2.4					0.7							
1.5 – 1.9				1.4	2.1	2.8	0.8	1.7				
1.0 – 1.4				2.8	5.7	1.9	3.0	1.7				
0.5 – 0.9	6.9	0.8	1.5	4.2	20.0	13.0	13.5	8.5	1.0	1.1		2.9
0 – 0.4	42.2	53.5	60.0	62.5	36.4	42.6	42.9	42.4	38.8	23.2	29.0	29.1
–0.5 – –0.1	45.7	45.7	37.7	27.1	25.0	24.1	24.8	35.6	49.0	66.3	56.0	58.3
–1.0 – –0.6	5.2		0.8	0.7	6.4	10.2	10.5	5.9	9.2	9.5	14.0	8.7
–1.5 – –1.1				1.4	1.4	1.9	2.3	2.5	2.0			1.0
–2.0 – –1.6					1.4	0.9	1.5	0.8			1.0	
–2.5 – –2.1					0.7	0.9						
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1								0.8				
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	116	129	130	144	140	108	133	118	98	95	100	103

Tabel B.362: Dag til dag ændring i temperatur for station Kiel dybde 8.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4						0.8						
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9								0.8				
3.0 – 3.4							0.7					
2.5 – 2.9				1.3		2.3	2.2					
2.0 – 2.4				0.6	1.3	0.8	3.0	0.8				
1.5 – 1.9					2.6	1.5	1.5	2.5	1.0			
1.0 – 1.4				0.6	7.8	3.0	8.1	6.7	2.0		0.8	
0.5 – 0.9	2.5	0.6	0.7	5.1	13.1	9.8	14.1	10.1	1.0		0.8	2.9
0 – 0.4	45.9	51.0	56.7	60.5	34.0	39.4	24.4	32.8	35.7	26.3	27.1	32.6
–0.5 – –0.1	48.4	47.7	42.0	30.6	27.5	28.8	27.4	24.4	46.9	66.3	63.6	55.1
–1.0 – –0.6	2.5	0.6	0.7	1.3	6.5	7.6	7.4	11.8	8.2	6.3	7.0	8.0
–1.5 – –1.1	0.6				5.2	0.8	5.9	5.9	4.1	1.1		0.7
–2.0 – –1.6					2.0	2.3	0.7	0.8	1.0		0.8	0.7
–2.5 – –2.1						0.8	1.5	3.4				
–3.0 – –2.6						0.8	0.7					
–3.5 – –3.1						1.5	1.5					
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1							0.7					
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	157	155	150	157	153	132	135	119	98	95	129	138

Tabel B.363: Dag til dag ændring i temperatur for station Kiel dybde 13.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9						1.0						
5.0 – 5.4					0.8		0.7					
4.5 – 4.9						1.0						
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9					0.8	1.0	0.7					
3.0 – 3.4								0.8	1.0			
2.5 – 2.9					0.8	1.0	0.7					
2.0 – 2.4					0.8	2.9	4.4	1.7	1.0			
1.5 – 1.9					2.4	3.9	3.7	5.9	2.0			1.4
1.0 – 1.4	0.8				4.9	6.8	4.4	5.0			3.8	1.4
0.5 – 0.9	7.8	0.8		7.0	17.9	8.7	14.1	15.1	10.2		8.3	6.5
0 – 0.4	40.6	54.7	58.2	57.8	26.8	26.2	23.0	27.7	29.6	32.3	24.2	30.2
–0.5 – –0.1	39.1	43.8	41.8	32.8	27.6	15.5	21.5	20.2	40.8	62.5	47.0	46.0
–1.0 – –0.6	10.9	0.8		2.3	6.5	13.6	13.3	8.4	10.2	2.1	8.3	7.2
–1.5 – –1.1	0.8				5.7	12.6	5.9	5.0	4.1	2.1	4.5	5.0
–2.0 – –1.6					4.1	2.9	3.7	5.0		1.0	3.8	0.7
–2.5 – –2.1					0.8	1.0	2.2	4.2	1.0			0.7
–3.0 – –2.6						1.9		0.8				0.7
–3.5 – –3.1							0.7					
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1							0.7					
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	128	128	122	128	123	103	135	119	98	96	132	139

Tabel B.364: Dag til dag ændring i temperatur for station Læsø Rende dybde 6.2 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4		2.0										
3.5 – 3.9				1.2	1.1		1.9					
3.0 – 3.4					2.3							3.3
2.5 – 2.9					4.6							
2.0 – 2.4					2.3	1.8		1.9				
1.5 – 1.9	4.0		3.7		3.4	1.8	7.7	3.8			6.9	
1.0 – 1.4	8.0		1.9	4.8	8.0	1.8	3.8	1.9			3.4	
0.5 – 0.9	12.0	7.8	1.9	9.6	10.3	14.3	23.1	5.7	1.8	2.4	3.4	3.3
0 – 0.4	20.0	43.1	48.1	44.6	27.6	41.1	21.2	37.7	27.3	38.1	20.7	26.7
–0.5 – –0.1	44.0	23.5	37.0	30.1	21.8	32.1	19.2	35.8	63.6	50.0	24.1	46.7
–1.0 – –0.6	8.0	21.6	7.4	7.2	9.2	5.4	9.6	7.5	7.3	9.5	27.6	16.7
–1.5 – –1.1	4.0			1.2	1.1	1.8	3.8	3.8			6.9	
–2.0 – –1.6							5.8	1.9			6.9	
–2.5 – –2.1				1.2	1.1							
–3.0 – –2.6					1.1		1.9					
–3.5 – –3.1		2.0					1.9					3.3
–4.0 – –3.6					2.3							
–4.5 – –4.1					1.1							
–5.0 – –4.6					1.1							
–5.5 – –5.1					1.1							
< –5.6												
antal	25	51	54	83	87	56	52	53	55	42	29	30

Tabel B.365: Dag til dag ændring i temperatur for station Læsø Rende dybde 10.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9					1.1							
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4						1.8						
2.5 – 2.9		2.0	1.9		2.3							3.3
2.0 – 2.4			3.7		1.1	1.8	1.9					
1.5 – 1.9		2.0		1.2	1.1	1.8	3.8	1.9		2.4	6.9	6.7
1.0 – 1.4	4.2				5.7	5.4	5.8	7.5	3.6	4.8		13.3
0.5 – 0.9	20.8	9.8	9.3	4.8	12.5	12.5	17.3	11.3	3.6	2.4	6.9	6.7
0 – 0.4	12.5	31.4	35.2	54.2	36.4	17.9	30.8	37.7	30.9	45.2	20.7	13.3
–0.5 – –0.1	45.8	35.3	37.0	34.9	26.1	35.7	25.0	30.2	50.9	28.6	31.0	33.3
–1.0 – –0.6	16.7	11.8	9.3	1.2	6.8	17.9	3.8	7.5	9.1	14.3	17.2	6.7
–1.5 – –1.1		3.9	1.9	3.6	3.4	3.6	5.8	3.8		2.4	6.9	6.7
–2.0 – –1.6		3.9			2.3	1.8	3.8				10.3	
–2.5 – –2.1			1.9				1.9					
–3.0 – –2.6									1.8			3.3
–3.5 – –3.1					1.1							
–4.0 – –3.6												3.3
–4.5 – –4.1												3.3
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	24	51	54	83	88	56	52	53	55	42	29	30

Tabel B.366: Dag til dag ændring i temperatur for station Læsø Rende dybde 15.8 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9		2.0										
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												3.3
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9					2.3							
2.0 – 2.4	3.8									2.4		
1.5 – 1.9					1.1			1.9			6.9	6.7
1.0 – 1.4		2.0	1.9		4.5	3.6	1.9	3.8			3.4	
0.5 – 0.9	7.7	3.9	9.3		5.7	10.7	5.7	5.7	5.5	7.1	3.4	3.3
0 – 0.4	30.8	39.2	38.9	66.3	53.4	39.3	49.1	50.9	36.4	47.6	20.7	30.0
–0.5 – –0.1	38.5	37.3	42.6	33.7	28.4	32.1	39.6	32.1	49.1	31.0	34.5	30.0
–1.0 – –0.6	15.4	5.9	5.6		2.3	12.5	3.8	3.8	5.5	9.5	13.8	16.7
–1.5 – –1.1		7.8	1.9		1.1	1.8			1.8	2.4	10.3	3.3
–2.0 – –1.6		2.0			1.1			1.9			6.9	
–2.5 – –2.1									1.8			
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6	3.8											6.7
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	26	51	54	83	88	56	53	53	55	42	29	30

Tabel B.367: Dag til dag ændring i temperatur for station Læsø Rende dybde 21.1 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9		2.0										
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												3.3
2.5 – 2.9	4.0											
2.0 – 2.4												3.3
1.5 – 1.9											6.9	
1.0 – 1.4		2.0	1.9		5.1					2.4	6.9	
0.5 – 0.9	4.0	3.9	5.6		8.5	7.4	8.7	10.0		2.4		
0 – 0.4	36.0	33.3	42.6	71.4	59.3	55.6	56.5	60.0	33.3	50.0	17.2	50.0
–0.5 – –0.1	36.0	47.1	42.6	28.6	25.4	18.5	34.8	23.3	55.6	42.9	34.5	26.7
–1.0 – –0.6	16.0	5.9	5.6		1.7	14.8		6.7	7.4		13.8	6.7
–1.5 – –1.1		2.0	1.9			3.7			3.7	2.4	13.8	3.3
–2.0 – –1.6		2.0									6.9	3.3
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1	4.0	2.0										
–4.0 – –3.6												3.3
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	25	51	54	56	59	27	23	30	27	42	29	30

Tabel B.368: Dag til dag ændring i temperatur for station "Early"Ndr. Røse dybde 2.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9							1.7					
2.0 – 2.4						1.8	1.7				2.1	
1.5 – 1.9						3.6	1.7			4.0		
1.0 – 1.4	3.3			2.1	3.3	3.6	1.7				2.1	
0.5 – 0.9	16.7	3.4	1.7	20.8	30.0	16.4	20.3	10.0	1.7	8.0	10.6	17.2
0 – 0.4	23.3	48.3	63.3	39.6	26.7	34.5	27.1	41.7	51.7	16.0	29.8	31.0
–0.5 – –0.1	46.7	44.8	33.3	31.2	30.0	23.6	23.7	33.3	37.9	46.0	40.4	24.1
–1.0 – –0.6	10.0	3.4	1.7	6.2	10.0	10.9	11.9	13.3	8.6	18.0	6.4	24.1
–1.5 – –1.1						3.6	5.1	1.7		4.0	4.3	
–2.0 – –1.6										2.0	2.1	3.4
–2.5 – –2.1						1.8	3.4			2.0		
–3.0 – –2.6											2.1	
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6							1.7					
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	30	29	60	48	30	55	59	60	58	50	47	29

Tabel B.369: Dag til dag ændring i temperatur for station "Early"Ndr. Røse dybde 7.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9						3.8						
1.0 – 1.4		14.3		4.2	21.4	15.4						
0.5 – 0.9			2.1	12.5	7.1	7.7	13.8	6.7				
0 – 0.4		57.1	55.3	47.9	28.6	34.6	41.4	46.7	48.3			
–0.5 – –0.1		28.6	40.4	25.0	21.4	19.2	27.6	36.7	41.4			
–1.0 – –0.6			2.1	8.3	7.1	7.7	17.2	6.7	10.3			
–1.5 – –1.1				2.1	14.3	7.7		3.3				
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1						3.8						
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	0	7	47	48	14	26	29	30	29	0	0	0

Tabel B.370: Dag til dag ændring i temperatur for station Ndr. Røse dybde 2.9 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												0.5
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4						0.6						
1.5 – 1.9	0.5											1.6
1.0 – 1.4	1.0	1.8	1.0	2.9	4.8	2.8	2.4	2.3	0.7	0.5	1.5	1.6
0.5 – 0.9	8.3	4.3	2.6	12.1	14.0	16.8	17.3	12.5	2.9	4.4	4.1	7.0
0 – 0.4	36.9	46.0	58.0	56.6	45.7	41.9	40.5	41.4	42.4	28.6	28.6	29.7
–0.5 – –0.1	40.8	41.7	35.2	23.1	24.7	29.1	28.0	32.8	42.4	56.8	52.0	41.1
–1.0 – –0.6	10.2	4.3	2.6	3.5	7.5	6.1	9.5	7.8	7.9	9.2	10.7	15.1
–1.5 – –1.1	1.9	1.2	0.5	1.7	2.7	2.8	1.2	0.8	1.4	0.5	3.1	1.6
–2.0 – –1.6					0.5		1.2	2.3	0.7			1.1
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6	0.5											0.5
–3.5 – –3.1									0.7			
–4.0 – –3.6		0.6										
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1									0.7			
< –5.6												
antal	206	163	193	173	186	179	168	128	139	206	196	185

Tabel B.371: Dag til dag ændring i temperatur for station Ndr. Røse dybde 4.4 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												0.5
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												0.5
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4			0.5					0.8				1.1
1.5 – 1.9	1.5			0.6	1.1	0.6				0.5	0.5	0.5
1.0 – 1.4	3.4	1.8	0.5	3.5	2.7	0.6	3.9	3.1	1.4	0.5	2.1	2.2
0.5 – 0.9	7.3	4.3	3.6	9.2	14.5	21.1	13.0	13.3	3.6	4.9	4.6	9.2
0 – 0.4	35.9	48.5	61.7	58.4	45.2	41.0	44.8	35.9	41.0	26.2	31.8	25.9
–0.5 – –0.1	36.4	40.5	29.0	25.4	27.4	27.1	27.9	35.2	41.0	55.8	45.1	38.4
–1.0 – –0.6	11.2	4.3	4.1	2.3	6.5	6.6	8.4	7.8	10.1	11.2	12.8	17.3
–1.5 – –1.1	2.9	0.6		0.6	1.6	3.0	1.3	0.8	0.7	1.0	1.5	1.6
–2.0 – –1.6	1.0		0.5		0.5			2.3			1.0	1.6
–2.5 – –2.1					0.5				0.7		0.5	0.5
–3.0 – –2.6	0.5							0.8	0.7			0.5
–3.5 – –3.1							0.6					
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6									0.7			
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	206	163	193	173	186	166	154	128	139	206	195	185

Tabel B.372: Dag til dag ændring i temperatur for station Ndr. Røse dybde 5.9 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6								0.8				
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9									0.7			
4.0 – 4.4	0.5				0.5							0.5
3.5 – 3.9	0.5							0.8				1.1
3.0 – 3.4	0.5											1.6
2.5 – 2.9	0.5								0.7		1.0	
2.0 – 2.4	1.0		0.5		2.2	1.1	0.6		0.7		0.5	1.1
1.5 – 1.9	2.4			0.6	1.6	0.6	0.6		2.9	0.5	0.5	3.8
1.0 – 1.4	1.9	2.5	1.0	2.9	5.4	3.4	4.2	6.2	1.4	1.9	2.6	2.2
0.5 – 0.9	9.2	3.7	6.7	11.0	9.7	20.1	14.3	13.3	5.0	4.9	8.2	10.8
0 – 0.4	29.6	46.6	52.8	56.1	43.5	34.1	33.9	33.6	33.1	27.7	28.1	18.4
–0.5 – –0.1	35.0	39.3	33.2	25.4	22.0	29.6	29.8	26.6	39.6	53.4	39.3	33.0
–1.0 – –0.6	9.7	6.1	5.2	2.9	8.1	6.7	13.7	9.4	8.6	8.3	11.7	15.7
–1.5 – –1.1	5.8	1.2		1.2	3.2	4.5	1.8	3.9	0.7	1.9	5.6	5.4
–2.0 – –1.6	1.9	0.6			2.2		1.2	3.1	1.4	1.0	1.5	0.5
–2.5 – –2.1	1.0		0.5		1.1			0.8	1.4	0.5		3.2
–3.0 – –2.6	0.5										1.0	1.6
–3.5 – –3.1								0.8				1.1
–4.0 – –3.6									1.4			
–4.5 – –4.1								0.8				
–5.0 – –4.6					0.5				1.4			
–5.5 – –5.1												
< –5.6									0.7			
antal	206	163	193	173	186	179	168	128	139	206	196	185

Tabel B.373: Dag til dag ændring i temperatur for station Ndr. Røse dybde 7.4 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6	0.5											0.5
5.5 – 5.9					0.5							
5.0 – 5.4					0.5							
4.5 – 4.9									0.7			
4.0 – 4.4	0.5											
3.5 – 3.9					0.5	0.6	0.6	0.8	0.7			1.1
3.0 – 3.4	1.0				0.5						0.5	1.6
2.5 – 2.9	1.0		0.5	1.2	1.1	0.6	0.6					2.2
2.0 – 2.4	2.9		1.0			1.1		1.6	2.9	0.5	1.5	2.7
1.5 – 1.9	1.9	1.8	1.0		2.7	1.7	3.0	3.1	2.2		1.0	2.7
1.0 – 1.4	3.9	2.5	1.6	1.7	4.3	7.3	6.5	5.5	3.6	1.0	4.6	2.7
0.5 – 0.9	7.8	3.7	4.7	8.1	12.9	16.9	15.5	11.7	6.5	7.8	6.1	6.5
0 – 0.4	25.7	44.8	48.7	57.6	37.6	31.5	33.9	31.2	34.5	27.7	25.5	18.9
–0.5 – –0.1	31.6	36.8	35.2	27.9	19.9	25.8	19.6	24.2	28.1	49.0	40.3	28.6
–1.0 – –0.6	11.2	7.4	4.7	1.7	8.6	9.0	10.7	10.2	7.2	11.7	10.2	18.4
–1.5 – –1.1	5.3	0.6	0.5	1.2	5.4	2.2	4.8	2.3	3.6	1.5	6.6	4.3
–2.0 – –1.6	3.9	2.5	1.0		1.6	2.2	1.8	3.1	3.6		2.0	3.2
–2.5 – –2.1	1.5			0.6	1.6		1.8	4.7	2.9	1.0		2.7
–3.0 – –2.6	0.5		1.0		1.1	0.6	0.6	0.8	0.7		1.0	2.2
–3.5 – –3.1	0.5				0.5	0.6	0.6		0.7			1.6
–4.0 – –3.6	0.5				0.5				1.4		0.5	
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6								0.8				
–5.5 – –5.1												
< –5.6									0.7			
antal	206	163	193	172	186	178	168	128	139	206	196	185

Tabel B.374: Dag til dag ændring i temperatur for station Ndr. Røse dybde 9.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6							0.6					
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4					0.5				0.7			
4.5 – 4.9						0.6						0.5
4.0 – 4.4	1.5								0.7		0.5	
3.5 – 3.9	0.5				0.5	1.1	1.2	0.8				1.1
3.0 – 3.4	0.5			0.6	0.5	0.6						1.6
2.5 – 2.9	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6		0.8			1.5	2.7
2.0 – 2.4	2.9				1.1	1.1	1.9	3.1	0.7	0.5	1.0	1.6
1.5 – 1.9	3.4	0.6	2.1		3.8	5.0	2.5	3.1	5.8		1.0	4.9
1.0 – 1.4	3.9	3.1	0.5	2.3	4.3	6.1	3.8	5.5	2.2	3.4	2.6	2.2
0.5 – 0.9	10.2	8.6	6.2	8.7	11.3	14.0	13.8	14.1	7.9	6.8	10.2	8.1
0 – 0.4	22.8	41.7	50.3	53.8	33.9	31.8	35.6	28.1	27.3	28.2	24.0	20.5
–0.5 – –0.1	28.2	33.1	33.7	27.7	24.2	18.4	14.4	18.8	30.2	47.1	36.2	23.2
–1.0 – –0.6	13.6	7.4	4.1	4.6	7.5	9.5	13.8	10.2	10.1	10.7	12.2	17.3
–1.5 – –1.1	3.9	1.8	1.0	1.7	8.1	6.1	6.2	3.1	5.0	2.4	6.6	7.0
–2.0 – –1.6	4.4	1.2			1.1	1.7	1.9	7.8	2.9	0.5	1.5	3.8
–2.5 – –2.1	0.5	1.8	1.0		0.5	2.2	2.5		4.3		1.5	2.2
–3.0 – –2.6	2.4		0.5		2.2		1.2	2.3	1.4		0.5	0.5
–3.5 – –3.1						0.6	0.6	0.8	0.7			1.1
–4.0 – –3.6						0.6		0.8		0.5	0.5	1.1
–4.5 – –4.1	0.5											
–5.0 – –4.6	0.5											
–5.5 – –5.1								0.8				
< –5.6												0.5
antal	206	163	193	173	186	179	160	128	139	206	196	185

Tabel B.375: Dag til dag ændring i temperatur for station Ndr. Røse dybde 10.6 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6	0.5								0.7			
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4	0.5											0.5
4.5 – 4.9						0.6	0.7	0.7			0.5	
4.0 – 4.4					0.5							
3.5 – 3.9	0.5			0.5		2.3	0.7					0.5
3.0 – 3.4	1.0	0.6				1.2		0.7			1.0	1.6
2.5 – 2.9	1.0		0.5		0.5	1.7	2.9	2.2	0.7	0.5	1.0	3.2
2.0 – 2.4	2.4	0.6	0.5		2.0	2.3	4.3	2.2	2.8			2.7
1.5 – 1.9	1.9	0.6	1.0	0.5	2.0	5.2	2.2	2.2	1.4	2.0	1.5	2.2
1.0 – 1.4	6.8	4.9	1.6	1.6	6.1	11.0	5.1	5.1	4.1	1.0	2.1	5.4
0.5 – 0.9	9.7	9.2	6.7	7.4	10.7	11.0	15.9	15.2	8.3	5.9	9.2	8.1
0 – 0.4	21.3	33.7	48.2	55.3	33.5	19.7	27.5	26.1	26.2	31.2	28.7	21.1
–0.5 – –0.1	32.4	36.2	32.6	30.9	25.9	17.3	14.5	15.2	33.8	44.4	32.3	24.3
–1.0 – –0.6	7.7	9.8	5.7	2.7	10.2	13.9	11.6	14.5	9.0	11.7	13.8	12.4
–1.5 – –1.1	6.8	0.6	1.6		4.6	5.2	5.1	5.1	4.8	2.4	5.1	5.9
–2.0 – –1.6	1.9	1.2		1.1	1.0	4.6	2.2	2.2	4.8	0.5	1.0	4.9
–2.5 – –2.1	2.4	1.8	1.0		2.0	2.3	4.3	2.2	2.1		2.1	3.8
–3.0 – –2.6	1.9	0.6			1.0	1.7		0.7	1.4		1.0	1.1
–3.5 – –3.1			0.5					3.6			0.5	1.1
–4.0 – –3.6							1.4	1.4		0.5		0.5
–4.5 – –4.1	0.5						0.7	0.7				
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1							0.7					
< –5.6	1.0											0.5
antal	207	163	193	188	197	173	138	138	145	205	195	185

Tabel B.376: Dag til dag ændring i temperatur for station North Sea dybde 3.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4					2.4							
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4							2.3					
1.5 – 1.9							2.3					
1.0 – 1.4						3.7						
0.5 – 0.9			3.3	4.1	9.8	18.5	4.7	3.6				
0 – 0.4	43.8	55.6	66.7	59.2	58.5	33.3	53.5	57.1	48.5	33.3	15.8	15.4
–0.5 – –0.1	56.2	40.7	26.7	32.7	26.8	37.0	30.2	28.6	51.5	66.7	84.2	84.6
–1.0 – –0.6		3.7	3.3	4.1	2.4	3.7	7.0	7.1				
–1.5 – –1.1						3.7						
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1								3.6				
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	32	27	30	49	41	27	43	28	33	27	19	13

Tabel B.377: Dag til dag ændring i temperatur for station North Sea dybde 12.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4						3.8		1.8				
1.5 – 1.9					1.3	1.9		1.8				
1.0 – 1.4					1.3	5.8	3.4					
0.5 – 0.9			2.0	1.3	4.0	5.8	5.2	7.3	1.6			
0 – 0.4	39.4	55.3	66.0	63.6	70.7	44.2	60.3	52.7	37.1	27.3	23.1	16.7
–0.5 – –0.1	60.6	42.6	30.0	33.8	20.0	25.0	25.9	23.6	59.7	72.7	76.9	83.3
–1.0 – –0.6		2.1	2.0	1.3	2.7	7.7	3.4	7.3	1.6			
–1.5 – –1.1						3.8	1.7	3.6				
–2.0 – –1.6						1.9						
–2.5 – –2.1								1.8				
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	33	47	50	77	75	52	58	55	62	55	39	12

Tabel B.378: Dag til dag ændring i temperatur for station North Sea dybde 15.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9							1.7					
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4				1.8	1.8	3.0	3.4	5.5				
0.5 – 0.9			2.5	3.6	9.1	9.1	8.5	1.8	3.2		2.5	
0 – 0.4	33.3	51.1	52.5	60.7	67.3	51.5	42.4	60.0	30.6	27.3	25.0	16.7
–0.5 – –0.1	66.7	46.8	42.5	28.6	18.2	33.3	40.7	25.5	64.5	72.7	72.5	83.3
–1.0 – –0.6		2.1	2.5	5.4	3.6	3.0	1.7	5.5	1.6			
–1.5 – –1.1							1.7					
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1								1.8				
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	33	47	40	56	55	33	59	55	62	55	40	12

Tabel B.379: Dag til dag ændring i temperatur for station North Sea dybde 20.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9							1.7					
2.0 – 2.4								1.9	1.6			
1.5 – 1.9						2.0	3.4					
1.0 – 1.4					1.5	3.9	5.2	3.7				
0.5 – 0.9			2.0	1.3	7.4	2.0	6.9	9.3	6.5			
0 – 0.4	33.3	55.3	68.0	64.1	69.1	49.0	43.1	40.7	37.1	25.5	22.5	8.3
–0.5 – –0.1	66.7	42.6	28.0	34.6	19.1	33.3	25.9	33.3	51.6	74.5	77.5	91.7
–1.0 – –0.6		2.1	2.0		2.9	7.8	6.9	3.7	3.2			
–1.5 – –1.1						2.0	3.4	3.7				
–2.0 – –1.6							1.7	3.7				
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6							1.7					
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	33	47	50	78	68	51	58	54	62	55	40	12

Tabel B.380: Dag til dag ændring i temperatur for station North Sea dybde 25.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9							1.7					
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9					1.4							
1.0 – 1.4					1.4	4.1	3.4	1.9	1.6			
0.5 – 0.9			2.0	1.3	2.8	4.1		7.4	3.3			
0 – 0.4	46.2	53.2	66.0	71.8	62.5	61.2	66.1	48.1	41.0	18.8	25.0	
–0.5 – –0.1	53.8	44.7	30.0	26.9	29.2	24.5	23.7	37.0	52.5	81.2	75.0	
–1.0 – –0.6		2.1	2.0		1.4	4.1	3.4	1.9	1.6			
–1.5 – –1.1					1.4	2.0	1.7	3.7				
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	26	47	50	78	72	49	59	54	61	32	28	0

Tabel B.381: Dag til dag ændring i temperatur for station North Sea dybde 30.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9								1.9				
2.0 – 2.4							1.7					
1.5 – 1.9									1.6			
1.0 – 1.4							1.7					
0.5 – 0.9			2.0	1.3	1.4		1.7	5.6	4.8			
0 – 0.4	33.3	55.3	66.0	70.9	74.0	71.4	66.1	48.1	37.1	25.5	22.5	16.7
–0.5 – –0.1	66.7	42.6	32.0	27.8	24.7	28.6	27.1	38.9	51.6	74.5	77.5	75.0
–1.0 – –0.6		2.1							4.8			8.3
–1.5 – –1.1							1.7	5.6				
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	33	47	50	79	73	49	59	54	62	55	40	12

Tabel B.382: Dag til dag ændring i temperatur for station Oder dybde 3.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9										2.3		
2.0 – 2.4					1.9							
1.5 – 1.9					1.9	0.8	0.9					
1.0 – 1.4					3.8	3.2	2.7	1.2				
0.5 – 0.9	1.4	1.5	4.8	19.1	20.8	18.3	14.2	7.3	1.1			1.2
0 – 0.4	45.7	63.6	53.2	52.8	35.8	38.9	46.9	42.7	23.4	28.4	17.6	35.3
–0.5 – –0.1	50.0	31.8	40.3	22.5	23.6	27.0	29.2	41.5	63.8	55.7	66.2	51.8
–1.0 – –0.6	2.9	3.0	1.6	4.5	4.7	7.9	4.4	2.4	6.4	10.2	13.2	9.4
–1.5 – –1.1				1.1	4.7	4.0	0.9		5.3	1.1		2.4
–2.0 – –1.6							0.9	3.7		1.1	1.5	
–2.5 – –2.1					1.9			1.2			1.5	
–3.0 – –2.6					0.9							
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6										1.1		
antal	70	66	62	89	106	126	113	82	94	88	68	85

Tabel B.383: Dag til dag ændring i temperatur for station Oder dybde 12.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4					1.0	1.6						
2.5 – 2.9					2.9	0.8	0.8					
2.0 – 2.4				1.1	1.9	0.8	0.8					
1.5 – 1.9					1.9		1.7					
1.0 – 1.4			3.2		3.8	4.8	1.7	4.0				
0.5 – 0.9	1.4	4.5	1.6	4.5	8.7	6.4	6.7	1.3	4.0	0.9		3.3
0 – 0.4	50.0	56.1	57.1	55.1	38.5	42.4	40.8	41.3	22.8	32.4	25.0	31.9
–0.5 – –0.1	45.8	36.4	33.3	36.0	34.6	35.2	44.2	45.3	55.4	55.9	64.3	49.5
–1.0 – –0.6	2.8	3.0	3.2	3.4	2.9	5.6	1.7	5.3	10.9	9.9	6.0	14.3
–1.5 – –1.1			1.6		1.9	1.6	0.8	2.7	6.9	0.9	3.6	1.1
–2.0 – –1.6					1.0		0.8					
–2.5 – –2.1					1.0	0.8					1.2	
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	72	66	63	89	104	125	120	75	101	111	84	91

Tabel B.384: Dag til dag ændring i temperatur for station Østerrenden Nord dybde 3.3 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4						1.7						
1.5 – 1.9					1.7							
1.0 – 1.4					6.7	6.9	5.0	3.4				
0.5 – 0.9	13.3		1.7	8.6	15.0	10.3	8.3	11.9			8.6	3.7
0 – 0.4	43.3	40.0	66.7	56.9	41.7	36.2	53.3	33.9	45.6	33.3	31.0	35.2
–0.5 – –0.1	36.7	60.0	31.7	34.5	26.7	31.0	25.0	35.6	38.6	53.3	51.7	50.0
–1.0 – –0.6	3.3				8.3	6.9	5.0	11.9	14.0	13.3	8.6	11.1
–1.5 – –1.1	3.3					3.4	3.3	1.7	1.8			
–2.0 – –1.6						1.7						
–2.5 – –2.1						1.7		1.7				
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	60	50	60	58	60	58	60	59	57	60	58	54

Tabel B.385: Dag til dag ændring i temperatur for station Østerrenden Nord dybde 5.8 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4						1.7						
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4					1.7	1.7						
1.5 – 1.9						3.4	1.7					
1.0 – 1.4	3.3				3.3	6.9	3.3	5.1				
0.5 – 0.9	15.0		3.3	5.2	20.0	15.5	21.7	10.2	1.8	1.7	1.7	5.4
0 – 0.4	41.7	48.0	60.0	63.8	41.7	25.9	38.3	33.9	36.8	30.0	46.6	28.6
–0.5 – –0.1	30.0	52.0	36.7	31.0	23.3	25.9	21.7	32.2	43.9	53.3	44.8	57.1
–1.0 – –0.6	6.7				6.7	6.9	8.3	15.3	15.8	15.0	6.9	7.1
–1.5 – –1.1	1.7				3.3	5.2	5.0	1.7	1.8			1.8
–2.0 – –1.6						3.4						
–2.5 – –2.1						3.4		1.7				
–3.0 – –2.6	1.7											
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	60	50	60	58	60	58	60	59	57	60	58	56

Tabel B.386: Dag til dag ændring i temperatur for station Østerrenden Nord dybde 9.8 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9						1.7						
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9						1.7						
4.0 – 4.4					1.7	3.4						
3.5 – 3.9					3.3							
3.0 – 3.4					1.7	3.4						
2.5 – 2.9	1.7		1.7		3.3	3.4	1.7					
2.0 – 2.4								1.7				
1.5 – 1.9	1.7			1.7	5.0	10.3	1.7		3.5		1.7	1.8
1.0 – 1.4	3.3	2.0	3.3		5.0	3.4	5.0	10.2	5.3			3.6
0.5 – 0.9	11.7	8.0	5.0	5.2	15.0	12.1	21.7	11.9	3.5	3.3	10.3	7.1
0 – 0.4	33.3	30.0	46.7	56.9	11.7	19.0	26.7	20.3	28.1	26.7	31.0	25.0
–0.5 – –0.1	33.3	52.0	38.3	32.8	20.0	15.5	20.0	30.5	36.8	53.3	43.1	46.4
–1.0 – –0.6	6.7	8.0	1.7	3.4	16.7	5.2	15.0	13.6	14.0	15.0	8.6	14.3
–1.5 – –1.1	3.3		1.7		3.3	5.2	3.3	3.4	5.3	1.7		
–2.0 – –1.6	1.7		1.7		5.0	6.9	3.3	5.1	3.5		3.4	
–2.5 – –2.1	3.3					1.7	1.7	1.7			1.7	
–3.0 – –2.6					5.0	3.4						1.8
–3.5 – –3.1								1.7				
–4.0 – –3.6					1.7							
–4.5 – –4.1					1.7							
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6						3.4						
antal	60	50	60	58	60	58	60	59	57	60	58	56

Tabel B.387: Dag til dag ændring i temperatur for station Østerrenden Nord dybde 14.9 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9							3.3					
4.0 – 4.4					1.7	1.7						
3.5 – 3.9								1.7				
3.0 – 3.4						1.7	1.7	1.7				
2.5 – 2.9							6.7		1.9			
2.0 – 2.4	1.7		3.3		1.7	5.2	1.7	5.2				
1.5 – 1.9	5.0			1.7		1.7	5.0	3.4	1.9			1.8
1.0 – 1.4	1.7		1.7		1.7	13.8	5.0	5.2	3.7		12.5	5.4
0.5 – 0.9	8.3	10.0	5.0	1.7	11.7	19.0	8.3	6.9	9.3	3.3	7.1	5.4
0 – 0.4	35.0	44.0	41.7	48.3	28.3	17.2	23.3	19.0	33.3	33.3	30.4	33.9
–0.5 – –0.1	31.7	38.0	41.7	46.6	40.0	22.4	20.0	25.9	27.8	46.7	25.0	26.8
–1.0 – –0.6	3.3	8.0	5.0		6.7	5.2	6.7	13.8	13.0	11.7	16.1	17.9
–1.5 – –1.1	5.0				3.3	3.4	3.3	5.2	3.7	3.3	1.8	5.4
–2.0 – –1.6	5.0		1.7	1.7		5.2	3.3	5.2	5.6	1.7	5.4	1.8
–2.5 – –2.1	1.7				3.3	1.7	5.0	3.4			1.8	
–3.0 – –2.6	1.7						3.3	1.7				1.8
–3.5 – –3.1								1.7				
–4.0 – –3.6					1.7							
–4.5 – –4.1							1.7					
–5.0 – –4.6							1.7					
–5.5 – –5.1												
< –5.6						1.7						
antal	60	50	60	58	60	58	60	58	54	60	56	56

Tabel B.388: Dag til dag ændring i temperatur for station Romsø Tue Fyr dybde 7.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4						3.0						
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9					5.9		2.5					
2.0 – 2.4					2.9	3.0	2.5					
1.5 – 1.9						3.0	5.0					
1.0 – 1.4					2.9	6.1	5.0	5.6				
0.5 – 0.9	10.3				5.9	12.1	5.0	7.4	3.9		5.9	
0 – 0.4	41.4	59.3	71.4	71.4	44.1	30.3	37.5	35.2	39.2	34.2	17.6	33.3
–0.5 – –0.1	48.3	40.7	28.6	28.6	11.8	27.3	30.0	29.6	45.1	57.9	52.9	66.7
–1.0 – –0.6					23.5	6.1	2.5	16.7	7.8	5.3	17.6	
–1.5 – –1.1						3.0	2.5	3.7	3.9	2.6		
–2.0 – –1.6					2.9	6.1	2.5	1.9				
–2.5 – –2.1							2.5					
–3.0 – –2.6											5.9	
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6							2.5					
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	29	27	28	28	34	33	40	54	51	38	17	24

Tabel B.389: Dag til dag ændring i temperatur for station Romsø Tue Fyr dybde 10.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9							2.5					
4.0 – 4.4							2.5					
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4						3.0	5.0					
2.5 – 2.9					5.9		2.5	1.9				
2.0 – 2.4					5.9	6.1	7.5					
1.5 – 1.9					2.9	3.0	2.5					
1.0 – 1.4	3.4				5.9		2.5	9.4				
0.5 – 0.9	17.2				11.8	18.2	7.5	9.4	7.8		5.9	
0 – 0.4	24.1	59.3	71.4	75.0	17.6	30.3	20.0	28.3	35.3	34.2	23.5	45.8
–0.5 – –0.1	41.4	40.7	28.6	25.0	26.5	21.2	20.0	26.4	49.0	60.5	47.1	50.0
–1.0 – –0.6	13.8				14.7	12.1	7.5	15.1	5.9	2.6	17.6	4.2
–1.5 – –1.1					2.9		2.5	3.8	2.0	2.6		
–2.0 – –1.6					2.9		5.0	1.9				
–2.5 – –2.1					2.9		5.0	3.8				
–3.0 – –2.6						3.0	2.5				5.9	
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1						3.0	5.0					
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	29	27	28	28	34	33	40	53	51	38	17	24

Tabel B.390: Dag til dag ændring i temperatur for station Romsø Tue Fyr dybde 12.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4							2.5					
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4					2.9	3.0	5.0					
2.5 – 2.9					2.9			3.8				
2.0 – 2.4								1.9				
1.5 – 1.9					11.8	6.1	7.5	3.8				
1.0 – 1.4						3.0	2.5	11.3	2.0			4.2
0.5 – 0.9				3.6	5.9	9.1	15.0	15.1	5.9		5.9	4.2
0 – 0.4		50.0	67.9	57.1	23.5	27.3	25.0	11.3	39.2	36.8	35.3	29.2
–0.5 – –0.1		50.0	32.1	39.3	23.5	18.2	15.0	18.9	43.1	60.5	35.3	50.0
–1.0 – –0.6					23.5	12.1	12.5	15.1	7.8		17.6	8.3
–1.5 – –1.1					5.9	18.2	10.0	5.7		2.6		4.2
–2.0 – –1.6							2.5	5.7	2.0			
–2.5 – –2.1								5.7				
–3.0 – –2.6						3.0						
–3.5 – –3.1							2.5	1.9			5.9	
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	0	4	28	28	34	33	40	53	51	38	17	24

Tabel B.391: Dag til dag ændring i temperatur for station Romsø Tue Fyr dybde 14.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9					5.7							
3.0 – 3.4							5.0					
2.5 – 2.9							5.0	3.7				
2.0 – 2.4						3.0		3.7				
1.5 – 1.9					2.9	3.0	2.5	1.9	2.0			
1.0 – 1.4	3.4					9.1	5.0	9.3	3.9			4.2
0.5 – 0.9	10.3			3.6	2.9	6.1	10.0	5.6	7.8		5.9	12.5
0 – 0.4	41.4	55.6	71.4	57.1	31.4	24.2	35.0	16.7	27.5	47.4	35.3	20.8
–0.5 – –0.1	27.6	44.4	28.6	39.3	37.1	30.3	20.0	31.5	43.1	50.0	41.2	50.0
–1.0 – –0.6	13.8				14.3	15.2	10.0	13.0	9.8		11.8	12.5
–1.5 – –1.1	3.4					6.1	2.5	5.6	3.9	2.6		
–2.0 – –1.6					5.7		2.5	1.9				
–2.5 – –2.1								5.6	2.0			
–3.0 – –2.6						3.0		1.9				
–3.5 – –3.1											5.9	
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1							2.5					
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	29	27	28	28	35	33	40	54	51	38	17	24

Tabel B.392: Dag til dag ændring i temperatur for station Romsø Tue Fyr dybde 16.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4							2.5					
2.5 – 2.9								1.9				
2.0 – 2.4							2.5					
1.5 – 1.9							2.5	5.7	2.0			4.2
1.0 – 1.4	10.3				5.7	3.0	5.0	3.8				
0.5 – 0.9	6.9			3.6		3.0	12.5	11.3	7.8			4.2
0 – 0.4	24.1	51.9	71.4	60.7	45.7	51.5	35.0	18.9	41.2	44.7	29.4	29.2
–0.5 – –0.1	34.5	48.1	28.6	32.1	42.9	30.3	35.0	26.4	41.2	52.6	52.9	54.2
–1.0 – –0.6	20.7			3.6	2.9	9.1	2.5	17.0	3.9		11.8	8.3
–1.5 – –1.1	3.4				2.9	3.0		11.3	3.9	2.6		
–2.0 – –1.6							2.5	3.8				
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6											5.9	
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	29	27	28	28	35	33	40	53	51	38	17	24

Tabel B.393: Dag til dag ændring i temperatur for station Romsø Tue Fyr dybde 19.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9							2.5					
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9	3.4						5.0	1.9	2.0			
1.0 – 1.4	3.4							7.4				8.3
0.5 – 0.9	17.2			7.1		6.1	17.5	9.3	7.8			8.3
0 – 0.4	17.2	55.6	78.6	57.1	51.4	45.5	47.5	35.2	41.2	47.4	41.2	33.3
–0.5 – –0.1	34.5	44.4	21.4	28.6	48.6	39.4	22.5	25.9	35.3	47.4	35.3	37.5
–1.0 – –0.6	20.7			7.1		9.1	2.5	7.4	7.8	2.6	11.8	8.3
–1.5 – –1.1							2.5	9.3	5.9	2.6	5.9	
–2.0 – –1.6	3.4							3.7				4.2
–2.5 – –2.1											5.9	
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	29	27	28	28	35	33	40	54	51	38	17	24

Tabel B.394: Dag til dag ændring i temperatur for station Vesterrenden dybde 6.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4							0.8					
2.5 – 2.9					0.7	0.6						
2.0 – 2.4					1.4	1.9	0.8	1.8				
1.5 – 1.9					0.7	1.3	3.3	0.9				
1.0 – 1.4				0.7	4.2	3.8	7.5	2.7	0.6			
0.5 – 0.9	1.4	3.5	1.4	5.1	17.4	14.7	11.7	10.0	1.9	0.6	1.8	2.8
0 – 0.4	43.8	48.7	68.3	67.4	34.0	34.0	31.7	32.7	33.8	27.1	33.3	40.0
–0.5 – –0.1	50.7	44.2	30.3	25.4	27.1	28.8	31.7	35.5	54.5	68.4	57.0	52.4
–1.0 – –0.6	4.1	2.7		1.4	9.0	9.0	5.0	7.3	7.1	4.0	7.3	4.8
–1.5 – –1.1					3.5	4.5	5.8	6.4	1.9		0.6	
–2.0 – –1.6					2.1	0.6		1.8				
–2.5 – –2.1						0.6	0.8	0.9				
–3.0 – –2.6		0.9										
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6							0.8					
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	146	113	145	138	144	156	120	110	154	177	165	145

Tabel B.395: Dag til dag ændring i temperatur for station Vesterrenden dybde 9.6 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6							0.8					
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4						0.8	0.8					
3.5 – 3.9					0.9		0.8					
3.0 – 3.4					0.9	0.8		1.9				
2.5 – 2.9						1.6	3.2	1.9				
2.0 – 2.4	0.7				1.8	3.9	3.2	0.9			0.7	
1.5 – 1.9	0.7				4.5	3.1		0.9				0.7
1.0 – 1.4	2.1	0.8		0.9	4.5	3.1	6.4	9.4	1.6		2.9	2.8
0.5 – 0.9	3.4	1.6	4.3	4.5	11.6	10.9	14.4	10.4	3.2	1.4	2.2	2.8
0 – 0.4	34.9	41.7	60.0	64.3	29.5	34.1	25.6	24.5	34.1	30.6	31.4	32.4
–0.5 – –0.1	52.1	53.5	34.8	29.5	26.8	19.4	16.8	26.4	54.0	63.9	45.3	53.1
–1.0 – –0.6	3.4	2.4	0.9	0.9	9.8	7.8	8.8	9.4	6.3	2.7	13.1	6.2
–1.5 – –1.1	2.1				7.1	9.3	11.2	6.6		0.7	3.6	2.1
–2.0 – –1.6	0.7				1.8	1.6	5.6	2.8	0.8	0.7	0.7	
–2.5 – –2.1						0.8	1.6	0.9				
–3.0 – –2.6						1.6	0.8	0.9				
–3.5 – –3.1					0.9	1.6		1.9				
–4.0 – –3.6								0.9				
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	146	127	115	112	112	129	125	106	126	147	137	145

Tabel B.396: Dag til dag ændring i temperatur for station Vesterrenden dybde 11.6 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6							1.6					
5.5 – 5.9							0.8					
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9					0.9							
4.0 – 4.4						2.4						
3.5 – 3.9					0.9	1.6	0.8					
3.0 – 3.4	0.7					1.6		2.0				
2.5 – 2.9							0.8	1.0				0.7
2.0 – 2.4	0.7				0.9	0.8	2.4	1.0	0.8		1.5	
1.5 – 1.9	1.4	0.8			1.7	2.4	3.2	9.1				2.1
1.0 – 1.4	2.1		0.9	0.9	6.1	3.2	9.6	3.0	2.4	1.4	3.6	1.4
0.5 – 0.9	3.4	3.1	4.3	4.5	13.9	12.0	7.2	16.2	4.8	2.1	3.6	4.1
0 – 0.4	33.6	43.3	63.5	62.5	29.6	28.0	22.4	11.1	33.3	26.6	25.5	28.3
–0.5 – –0.1	45.2	48.0	28.7	30.4	29.6	21.6	26.4	26.3	48.4	62.2	44.5	51.7
–1.0 – –0.6	10.3	4.7	1.7	1.8	10.4	12.8	11.2	17.2	6.3	6.3	14.6	6.9
–1.5 – –1.1	2.1		0.9		3.5	4.0	5.6	6.1	2.4	0.7	3.6	4.1
–2.0 – –1.6					1.7	3.2	4.0	3.0	0.8	0.7	2.2	
–2.5 – –2.1					0.9	1.6	2.4	3.0	0.8		0.7	0.7
–3.0 – –2.6	0.7					0.8						
–3.5 – –3.1						2.4	1.6					
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1						1.6						
–5.0 – –4.6								1.0				
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	146	127	115	112	115	125	125	99	126	143	137	145

Tabel B.397: Dag til dag ændring i temperatur for station Vesterrenden dybde 13.6 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4							1.6					
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4							0.8					
3.5 – 3.9	0.9						1.6					
3.0 – 3.4						2.3		1.9	0.8			0.7
2.5 – 2.9						2.3		1.9				
2.0 – 2.4					1.7	1.6	2.4	1.9	1.6			
1.5 – 1.9	0.9	1.0			1.7	3.1	2.4	5.6				1.4
1.0 – 1.4			1.1	2.2	6.1	2.3	8.8	8.3	1.6	0.7	2.9	2.8
0.5 – 0.9	5.1	4.0	3.4	3.2	9.6	15.5	10.4	11.1	7.1	3.4	5.8	6.2
0 – 0.4	32.5	41.6	60.9	60.2	39.1	27.1	24.8	20.4	32.5	32.0	27.7	26.9
–0.5 – –0.1	49.6	45.5	32.2	31.2	29.6	20.2	20.0	18.5	44.4	54.4	43.1	46.2
–1.0 – –0.6	8.5	6.9		2.2	6.1	12.4	15.2	13.9	5.6	8.2	15.3	9.7
–1.5 – –1.1	0.9	1.0	2.3	1.1	4.3	4.7	4.0	5.6	1.6	0.7	3.6	5.5
–2.0 – –1.6					0.9	3.1	0.8	7.4	4.0		0.7	
–2.5 – –2.1					0.9	1.6	4.8	0.9		0.7	0.7	
–3.0 – –2.6	1.7					3.1	1.6	1.9	0.8			
–3.5 – –3.1						0.8	0.8	0.9				0.7
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	117	101	87	93	115	129	125	108	126	147	137	145

Tabel B.398: Dag til dag ændring i temperatur for station Vesterrenden dybde 15.6 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9							0.8					
4.0 – 4.4							0.8					
3.5 – 3.9							1.6					
3.0 – 3.4					0.9	0.8		0.9	0.8			
2.5 – 2.9							0.8	1.9	0.8			
2.0 – 2.4							3.2	4.7	0.8			0.7
1.5 – 1.9	2.1	0.8				0.8	2.4				0.7	1.4
1.0 – 1.4	3.4	2.4	0.9		4.6	4.8	8.8	9.3	2.4	2.7	4.4	4.1
0.5 – 0.9	4.8	3.9	6.1	4.5	4.6	13.6	9.6	16.8	7.9	3.4	3.6	5.5
0 – 0.4	29.5	38.6	59.1	62.5	50.0	31.2	22.4	22.4	33.1	31.3	27.0	23.4
–0.5 – –0.1	49.3	47.2	32.2	29.5	32.4	32.0	26.4	12.1	40.2	49.7	48.2	47.6
–1.0 – –0.6	6.2	5.5	0.9	3.6	4.6	9.6	11.2	15.9	7.1	10.9	9.5	11.7
–1.5 – –1.1	2.7	1.6	0.9		2.8	4.0	4.8	7.5	3.9	1.4	2.9	4.1
–2.0 – –1.6	0.7					1.6	2.4	5.6	0.8	0.7	2.9	0.7
–2.5 – –2.1	0.7					0.8	3.2	1.9	1.6		0.7	
–3.0 – –2.6	0.7						0.8		0.8			
–3.5 – –3.1								0.9				0.7
–4.0 – –3.6						0.8						
–4.5 – –4.1							0.8					
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	146	127	115	112	108	125	125	107	127	147	137	145

Tabel B.399: Dag til dag ændring i temperatur for station Vesterrenden dybde 18.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9							0.7					
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9						0.6	0.7					
4.0 – 4.4								0.7				
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4	0.9						2.1	3.7	1.3		0.6	
1.5 – 1.9	0.9	0.8				0.6	5.6	0.7	0.6	1.1	0.6	3.5
1.0 – 1.4	3.4	0.8		1.8	0.9	1.3	4.9	4.5	3.2	0.6	0.6	1.7
0.5 – 0.9	4.3	2.5	4.3	2.7	5.2	9.6	11.8	17.2	10.9	2.3	10.8	7.8
0 – 0.4	28.2	35.3	64.3	62.2	57.8	42.3	29.9	29.9	32.7	29.4	22.3	20.0
–0.5 – –0.1	48.7	53.8	26.1	28.8	30.2	32.7	22.2	22.4	39.7	56.5	47.8	53.0
–1.0 – –0.6	9.4	6.7	5.2	1.8	5.2	7.7	10.4	11.9	6.4	7.9	8.9	8.7
–1.5 – –1.1	3.4			2.7	0.9	3.8	8.3	3.7	3.2	2.3	4.5	4.3
–2.0 – –1.6	0.9					1.3	1.4	3.0	1.9		1.9	
–2.5 – –2.1							1.4	0.7			1.9	
–3.0 – –2.6								1.5				0.9
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6							0.7					
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	117	119	115	111	116	156	144	134	156	177	157	115

Tabel B.400: Dag til dag ændring i temperatur for station Østerrenden dybde 7.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9						2.3						
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4						4.5		1.9				
0.5 – 0.9	3.4				33.3	22.7	15.6	7.5				2.0
0 – 0.4	40.7	33.3			33.3	43.2	42.2	39.6	35.2	32.8	24.1	37.3
–0.5 – –0.1	52.5	66.7			16.7	15.9	28.9	39.6	59.3	67.2	70.4	58.8
–1.0 – –0.6	3.4				16.7	4.5	11.1	7.5	5.6		5.6	2.0
–1.5 – –1.1						2.3		3.8				
–2.0 – –1.6						2.3	2.2					
–2.5 – –2.1						2.3						
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	59	15	0	0	6	44	45	53	54	58	54	51

Tabel B.401: Dag til dag ændring i temperatur for station Østerrenden dybde 10.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4							2.1					
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9						2.3	2.1					
2.0 – 2.4						2.3						
1.5 – 1.9					3.3	2.3	2.1	3.8				
1.0 – 1.4					3.3	15.9	10.6	3.8				
0.5 – 0.9	5.1	5.0	13.3	6.9	16.7	9.1	10.6	15.1	5.6		3.7	3.7
0 – 0.4	39.0	40.0	53.3	62.1	43.3	27.3	27.7	30.2	20.4	32.8	25.9	38.9
–0.5 – –0.1	50.8	50.0	33.3	27.6	23.3	20.5	25.5	26.4	63.0	63.8	59.3	51.9
–1.0 – –0.6	5.1	2.5		3.4	6.7	4.5	6.4	11.3	11.1	3.4	9.3	5.6
–1.5 – –1.1		2.5				4.5	4.3	5.7			1.9	
–2.0 – –1.6						4.5	4.3					
–2.5 – –2.1					3.3	2.3		1.9				
–3.0 – –2.6						2.3	2.1	1.9				
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6						2.3						
–5.5 – –5.1												
< –5.6							2.1					
antal	59	40	30	29	30	44	47	53	54	58	54	54

Tabel B.402: Dag til dag ændring i temperatur for station Østerrenden dybde 12.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4							2.1					
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4							2.1					
2.5 – 2.9							2.1					
2.0 – 2.4						4.5						
1.5 – 1.9					6.7	4.5	4.3	9.4				
1.0 – 1.4	1.7					6.8	10.6	5.7	3.7		1.9	
0.5 – 0.9	3.4	7.5	16.7	6.9	13.3	18.2	14.9	18.9			1.9	1.9
0 – 0.4	35.6	32.5	56.7	55.2	46.7	15.9	25.5	22.6	33.3	31.0	31.5	38.9
–0.5 – –0.1	50.8	55.0	23.3	34.5	20.0	20.5	17.0	17.0	51.9	65.5	46.3	50.0
–1.0 – –0.6	8.5	2.5	3.3		10.0	6.8	8.5	15.1	9.3	3.4	16.7	9.3
–1.5 – –1.1		2.5		3.4		6.8	4.3	1.9			1.9	
–2.0 – –1.6						9.1		1.9	1.9			
–2.5 – –2.1						2.3	2.1	1.9				
–3.0 – –2.6							2.1	1.9				
–3.5 – –3.1							2.1	1.9				
–4.0 – –3.6					3.3	2.3						
–4.5 – –4.1								1.9				
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6							2.1					
antal	59	40	30	29	30	44	47	53	54	58	54	54

Tabel B.403: Dag til dag ændring i temperatur for station Østerrenden dybde 14.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9							2.1					
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9						2.3						
3.0 – 3.4							2.1					
2.5 – 2.9						2.3	2.1		1.9			
2.0 – 2.4						4.5	4.3	5.7				
1.5 – 1.9						4.5	4.3	3.8				
1.0 – 1.4	6.8	2.5			6.7	4.5	6.4	11.3	1.9		1.9	1.9
0.5 – 0.9	3.4	7.5	13.3	6.9	23.3	13.6	17.0	17.0	7.4		5.6	
0 – 0.4	28.8	32.5	50.0	44.8	30.0	15.9	25.5	28.3	31.5	38.3	29.6	38.9
–0.5 – –0.1	45.8	52.5	30.0	44.8	26.7	15.9	21.3	9.4	42.6	59.6	40.7	46.3
–1.0 – –0.6	13.6	2.5	3.3	3.4	6.7	15.9	6.4	5.7	9.3	2.1	16.7	13.0
–1.5 – –1.1	1.7		3.3					5.7	1.9		3.7	
–2.0 – –1.6		2.5				9.1	2.1	3.8	1.9		1.9	
–2.5 – –2.1						4.5		5.7				
–3.0 – –2.6						2.3			1.9			
–3.5 – –3.1					6.7		2.1					
–4.0 – –3.6						2.3	2.1	1.9				
–4.5 – –4.1						2.3						
–5.0 – –4.6								1.9				
–5.5 – –5.1												
< –5.6							2.1					
antal	59	40	30	29	30	44	47	53	54	47	54	54

Tabel B.404: Dag til dag ændring i temperatur for station Østerrenden dybde 16.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4							2.1					
2.5 – 2.9						2.3	2.1					
2.0 – 2.4						4.7	6.4	5.7	1.9			
1.5 – 1.9	3.4					4.7	4.3	5.7			1.9	
1.0 – 1.4	3.4	2.5	3.3		3.3	9.3	2.1	17.0	3.7		1.9	1.9
0.5 – 0.9	3.4	12.5	10.0	6.9	6.7	9.3	17.0	15.1	9.3		7.4	5.6
0 – 0.4	30.5	27.5	56.7	58.6	53.3	20.9	29.8	17.0	27.8	39.7	31.5	35.2
–0.5 – –0.1	40.7	50.0	26.7	31.0	33.3	25.6	23.4	13.2	40.7	58.6	27.8	38.9
–1.0 – –0.6	16.9	5.0	3.3	3.4		7.0	6.4	7.5	13.0	1.7	20.4	18.5
–1.5 – –1.1							2.1	3.8			7.4	
–2.0 – –1.6	1.7	2.5				4.7	2.1	3.8	1.9		1.9	
–2.5 – –2.1						4.7		1.9				
–3.0 – –2.6						2.3	2.1	3.8	1.9			
–3.5 – –3.1						2.3		3.8				
–4.0 – –3.6						2.3		1.9				
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6					3.3							
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	59	40	30	29	30	43	47	53	54	58	54	54

Tabel B.405: Dag til dag ændring i temperatur for station Østerrenden dybde 19.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9						2.3						
3.0 – 3.4							2.1					
2.5 – 2.9									1.9			
2.0 – 2.4						2.3		1.9				1.9
1.5 – 1.9							6.4	5.7	1.9		3.7	
1.0 – 1.4	8.5	2.5			6.7	4.5	6.4	13.2		1.7	3.7	
0.5 – 0.9	10.2	10.0	6.7		10.0	2.3	19.1	9.4	11.3		3.7	11.1
0 – 0.4	20.3	37.5	60.0	65.5	43.3	45.5	25.5	22.6	28.3	39.7	33.3	27.8
–0.5 – –0.1	37.3	40.0	33.3	34.5	33.3	29.5	23.4	17.0	39.6	56.9	27.8	37.0
–1.0 – –0.6	18.6	5.0			3.3	6.8	12.8	15.1	11.3	1.7	13.0	16.7
–1.5 – –1.1	5.1	2.5				2.3		11.3	3.8		11.1	5.6
–2.0 – –1.6		2.5				2.3	2.1	1.9	1.9		1.9	
–2.5 – –2.1							2.1				1.9	
–3.0 – –2.6					3.3							
–3.5 – –3.1								1.9				
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1						2.3						
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	59	40	30	29	30	44	47	53	53	58	54	54

Tabel B.406: Dag til dag ændring i temperatur for station Langelandsbælt dybde 7.6 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4						2.4						
3.5 – 3.9						2.4						
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9						2.4						
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9							2.6	2.0				
1.0 – 1.4					5.7	14.6	7.9	2.0				
0.5 – 0.9					22.9	14.6	18.4	12.0	3.8		7.1	
0 – 0.4	60.0	55.6	61.9	71.4	34.3	17.1	34.2	28.0	30.8	42.9	14.3	60.0
–0.5 – –0.1	35.0	44.4	38.1	28.6	17.1	29.3	18.4	38.0	61.5	46.4	71.4	30.0
–1.0 – –0.6	5.0				11.4	2.4	5.3	14.0	3.8	10.7		
–1.5 – –1.1					2.9	7.3	2.6	2.0				
–2.0 – –1.6					5.7	2.4	5.3	2.0				10.0
–2.5 – –2.1							2.6					
–3.0 – –2.6						4.9	2.6				7.1	
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	20	27	21	28	35	41	38	50	52	28	14	10

Tabel B.407: Dag til dag ændring i temperatur for station Langelandsbælt dybde 10.6 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4						2.4						
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4							2.6					
2.5 – 2.9						4.9	5.3	2.0				
2.0 – 2.4					2.9	2.4		2.0				
1.5 – 1.9					5.7	4.9	5.3	2.0				
1.0 – 1.4					11.4	7.3	5.3	6.0	1.9			
0.5 – 0.9				3.6	11.4	7.3	26.3	12.0	3.8		7.1	
0 – 0.4	60.0	63.0	66.7	64.3	20.0	22.0	18.4	22.0	26.9	46.4	21.4	60.0
–0.5 – –0.1	35.0	37.0	33.3	32.1	28.6	19.5	7.9	32.0	63.5	46.4	57.1	30.0
–1.0 – –0.6	5.0				11.4	12.2	15.8	6.0	1.9	7.1	7.1	
–1.5 – –1.1					2.9	7.3	5.3	12.0	1.9			
–2.0 – –1.6					5.7	7.3	2.6					10.0
–2.5 – –2.1								2.0				
–3.0 – –2.6											7.1	
–3.5 – –3.1						2.4	2.6					
–4.0 – –3.6								2.0				
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6							2.6					
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	20	27	21	28	35	41	38	50	52	28	14	10

Tabel B.408: Dag til dag ændring i temperatur for station Langelandsbælt dybde 12.6 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4							2.6	2.1				
2.5 – 2.9								2.1				
2.0 – 2.4					2.9		5.3					
1.5 – 1.9					8.6		13.2	6.4				
1.0 – 1.4					11.4	7.3	7.9	4.3				
0.5 – 0.9					11.4	14.6	2.6	8.5	11.5		7.1	
0 – 0.4	60.0	41.7	50.0	67.9	11.4	41.5	31.6	23.4	30.8	46.4	14.3	50.0
–0.5 – –0.1	35.0	58.3	50.0	32.1	34.3	14.6	21.1	29.8	51.9	46.4	64.3	40.0
–1.0 – –0.6	5.0				5.7	12.2	5.3	8.5	1.9	7.1	7.1	
–1.5 – –1.1					11.4	4.9		6.4	1.9			
–2.0 – –1.6					2.9	2.4	2.6	2.1	1.9			10.0
–2.5 – –2.1						2.4	5.3	2.1				
–3.0 – –2.6								4.3			7.1	
–3.5 – –3.1							2.6					
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	20	12	2	28	35	41	38	47	52	28	14	10

Tabel B.409: Dag til dag ændring i temperatur for station Langelandsbælt dybde 14.6 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4							2.6					
3.5 – 3.9							2.6					
3.0 – 3.4								2.0				
2.5 – 2.9					5.7		2.6	4.0				
2.0 – 2.4					2.9	4.9						
1.5 – 1.9					5.7		2.6	2.0	1.9			
1.0 – 1.4					5.7	9.8	10.5	6.0	1.9			
0.5 – 0.9					11.4	9.8	13.2	8.0	5.8		7.1	
0 – 0.4	60.0	51.9	71.4	67.9	17.1	19.5	31.6	26.0	32.7	42.9	28.6	50.0
–0.5 – –0.1	35.0	48.1	28.6	32.1	28.6	26.8	13.2	30.0	50.0	53.6	50.0	40.0
–1.0 – –0.6	5.0				17.1	14.6	13.2	6.0	3.8	3.6		
–1.5 – –1.1					2.9	4.9	5.3	8.0	1.9		7.1	
–2.0 – –1.6						4.9	2.6	4.0	1.9			10.0
–2.5 – –2.1						2.4		2.0				
–3.0 – –2.6						2.4		2.0				
–3.5 – –3.1					2.9						7.1	
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	20	27	21	28	35	41	38	50	52	28	14	10

Tabel B.410: Dag til dag ændring i temperatur for station Langelandsbælt dybde 16.6 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9							2.6					
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9							5.3					
2.0 – 2.4						2.4		4.0	1.9			
1.5 – 1.9					5.7		5.3	4.0				
1.0 – 1.4					11.4	4.9	2.6	8.0	1.9			
0.5 – 0.9	5.0			3.6	5.7	9.8	18.4	10.0	11.5			
0 – 0.4	50.0	55.6	71.4	64.3	42.9	31.7	26.3	26.0	28.8	42.9	35.7	40.0
–0.5 – –0.1	40.0	44.4	28.6	28.6	25.7	22.0	21.1	22.0	42.3	53.6	50.0	50.0
–1.0 – –0.6	5.0			3.6	2.9	19.5	10.5	14.0	5.8	3.6		
–1.5 – –1.1						7.3	5.3	8.0	5.8		7.1	
–2.0 – –1.6					5.7			2.0	1.9			10.0
–2.5 – –2.1						2.4						
–3.0 – –2.6							2.6					
–3.5 – –3.1								2.0			7.1	
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	20	27	21	28	35	41	38	50	52	28	14	10

Tabel B.411: Dag til dag ændring i temperatur for station Langelandsbælt dybde 19.6 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9							2.7					
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9							2.7					
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9								3.7				
2.0 – 2.4								3.7				
1.5 – 1.9								7.4	1.9			
1.0 – 1.4	5.0				8.6		5.4	7.4	1.9			
0.5 – 0.9	5.0	3.7		3.6	2.9	9.8	18.9	7.4	15.4	3.6	14.3	
0 – 0.4	40.0	48.1	66.7	57.1	34.3	48.8	35.1	14.8	26.9	28.6	28.6	40.0
–0.5 – –0.1	25.0	48.1	33.3	39.3	51.4	31.7	21.6	33.3	42.3	60.7	42.9	50.0
–1.0 – –0.6	20.0					7.3	13.5	11.1	7.7	7.1		
–1.5 – –1.1					2.9				3.8		7.1	
–2.0 – –1.6	5.0					2.4		3.7				10.0
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6								7.4				
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6											7.1	
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	20	27	21	28	35	41	37	27	52	28	14	10

Tabel B.412: Dag til dag ændring i temperatur for station Saltholm North dybde 3.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9	3.8			3.4								
1.0 – 1.4	3.8				5.9	5.3	2.9					
0.5 – 0.9	7.7	7.1	3.3	13.8	11.8	10.5	8.6	5.0	3.4			3.3
0 – 0.4	34.6	42.9	60.0	41.4	64.7	26.3	40.0	46.7	31.0	36.4	50.0	26.7
–0.5 – –0.1	34.6	35.7	36.7	37.9	11.8	42.1	37.1	41.7	58.6	45.5	37.5	66.7
–1.0 – –0.6	11.5	14.3		3.4	5.9	10.5	2.9	5.0	6.9	18.2	12.5	3.3
–1.5 – –1.1	3.8					5.3	5.7	1.7				
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1							2.9					
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	26	14	30	29	17	19	35	60	29	22	8	30

Tabel B.413: Dag til dag ændring i temperatur for station Saltholm North dybde 5.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9	11.5											
1.0 – 1.4						5.3	2.9					3.3
0.5 – 0.9	3.8	7.1	3.3	17.2	29.4	10.5	11.4	5.0				3.3
0 – 0.4	26.9	35.7	63.3	51.7	35.3	42.1	42.9	50.0	48.3	31.8	62.5	23.3
–0.5 – –0.1	42.3	50.0	33.3	31.0	29.4	26.3	28.6	41.7	44.8	50.0	25.0	63.3
–1.0 – –0.6	7.7				5.9	10.5	5.7	1.7	6.9	18.2	12.5	6.7
–1.5 – –1.1	7.7	7.1				5.3	5.7	1.7				
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1							2.9					
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	26	14	30	29	17	19	35	60	29	22	8	30

Tabel B.414: Dag til dag ændring i temperatur for station Saltholm North dybde 7.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9	3.8											
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9	3.8											
1.0 – 1.4	3.8		3.3			5.3		1.7				
0.5 – 0.9	3.8	7.1		24.1	29.4	15.8	11.4	8.3		4.5	25.0	6.7
0 – 0.4	34.6	42.9	53.3	41.4	35.3	36.8	42.9	33.3	41.4	22.7	37.5	40.0
–0.5 – –0.1	30.8	42.9	43.3	31.0	17.6	21.1	31.4	48.3	55.2	50.0		33.3
–1.0 – –0.6	7.7	7.1		3.4	11.8	15.8	11.4	5.0	3.4	22.7	37.5	16.7
–1.5 – –1.1	7.7				5.9	5.3		3.3				3.3
–2.0 – –1.6	3.8											
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6							2.9					
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	26	14	30	29	17	19	35	60	29	22	8	30

Tabel B.415: Dag til dag ændring i temperatur for station Saltholm North dybde 9.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9	3.8											
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9	3.8				5.9	5.3						
1.0 – 1.4					5.9	10.5		3.3				16.7
0.5 – 0.9	3.8		6.7	20.7	11.8	10.5	2.9	8.3	10.3	9.1	25.0	6.7
0 – 0.4	23.1	42.9	50.0	41.4	35.3	26.3	42.9	40.0	44.8	22.7	37.5	13.3
–0.5 – –0.1	46.2	50.0	43.3	37.9	11.8	21.1	40.0	28.3	37.9	45.5	12.5	30.0
–1.0 – –0.6	11.5	7.1			17.6	15.8	11.4	16.7	6.9	18.2		26.7
–1.5 – –1.1	7.7				5.9	10.5		3.3			12.5	6.7
–2.0 – –1.6					5.9					4.5	12.5	
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1							2.9					
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	26	14	30	29	17	19	35	60	29	22	8	30

Tabel B.416: Dag til dag ændring i temperatur for station Saltholm North dybde 11.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4						5.3						
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9						5.3		1.7				
2.0 – 2.4	3.8							1.7				
1.5 – 1.9	3.8				5.9			6.7	3.4			
1.0 – 1.4	3.8				5.9	15.8	2.9		3.4			20.0
0.5 – 0.9	11.5		3.3	6.9	17.6	5.3	11.8	11.7	13.8	9.1	37.5	6.7
0 – 0.4	19.2	42.9	63.3	62.1	23.5	42.1	32.4	26.7	31.0	22.7	25.0	20.0
–0.5 – –0.1	30.8	50.0	33.3	31.0	17.6	5.3	44.1	30.0	27.6	40.9	12.5	13.3
–1.0 – –0.6	15.4	7.1			11.8	5.3		11.7	6.9	22.7		33.3
–1.5 – –1.1	7.7				11.8	5.3	5.9	6.7	10.3	4.5	12.5	3.3
–2.0 – –1.6	3.8								3.4		12.5	3.3
–2.5 – –2.1					5.9	5.3		1.7				
–3.0 – –2.6							2.9					
–3.5 – –3.1								1.7				
–4.0 – –3.6						5.3						
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	26	14	30	29	17	19	34	60	29	22	8	30

Tabel B.417: Dag til dag ændring i temperatur for station Saltholm North dybde 13.5 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9							2.9					
5.0 – 5.4									3.4			
4.5 – 4.9						10.5						
4.0 – 4.4						5.3		1.7				
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4								1.7				
2.5 – 2.9						5.3	2.9	3.3				
2.0 – 2.4								1.7			12.5	
1.5 – 1.9	3.8				5.9	10.5		6.7	3.4	4.5		3.3
1.0 – 1.4						10.5	11.8	5.0	10.3	4.5	12.5	13.3
0.5 – 0.9	7.7	7.1	10.0	3.4	17.6	15.8	5.9	11.7	17.2	18.2	12.5	16.7
0 – 0.4	26.9	35.7	53.3	72.4	35.3	5.3	35.3	25.0	27.6	9.1	12.5	20.0
–0.5 – –0.1	38.5	50.0	36.7	24.1	23.5	5.3	14.7	10.0	17.2	54.5		13.3
–1.0 – –0.6	15.4	7.1				5.3	8.8	13.3	3.4		12.5	13.3
–1.5 – –1.1	3.8				11.8		14.7	6.7	3.4		25.0	13.3
–2.0 – –1.6	3.8				5.9	10.5		5.0	3.4			6.7
–2.5 – –2.1								3.3	3.4	9.1	12.5	
–3.0 – –2.6								1.7				
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6						5.3			3.4			
–4.5 – –4.1						10.5		3.3	3.4			
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1							2.9					
< –5.6												
antal	26	14	30	29	17	19	34	60	29	22	8	30

Tabel B.418: Dag til dag ændring i temperatur for station Saltholm North dybde 14.2 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4						5.6						
4.5 – 4.9							2.9		3.4			
4.0 – 4.4						5.6		1.7				
3.5 – 3.9						5.6						
3.0 – 3.4							2.9					
2.5 – 2.9						5.6		3.3				
2.0 – 2.4								3.3			12.5	
1.5 – 1.9	3.8				5.9	5.6	2.9	6.7				3.3
1.0 – 1.4						5.6	5.7	10.0	13.8	4.5	12.5	10.0
0.5 – 0.9	7.7	7.1	6.7		5.9	22.2	17.1	8.3	10.3	18.2	12.5	20.0
0 – 0.4	30.8	21.4	53.3	55.2	41.2	5.6	31.4	26.7	37.9	27.3	12.5	13.3
–0.5 – –0.1	38.5	64.3	40.0	44.8	35.3	5.6	20.0	5.0	10.3	40.9		23.3
–1.0 – –0.6	11.5	7.1				5.6	2.9	11.7	6.9		25.0	16.7
–1.5 – –1.1	3.8				5.9	5.6	2.9	11.7	6.9	4.5	12.5	3.3
–2.0 – –1.6	3.8				5.9		5.7	5.0				10.0
–2.5 – –2.1						5.6			3.4		12.5	
–3.0 – –2.6						5.6		1.7		4.5		
–3.5 – –3.1								1.7	6.9			
–4.0 – –3.6						11.1		1.7				
–4.5 – –4.1							2.9					
–5.0 – –4.6								1.7				
–5.5 – –5.1							2.9					
< –5.6												
antal	26	14	30	29	17	18	35	60	29	22	8	30

Tabel B.419: Dag til dag ændring i temperatur for station Svinbådan dybde 2.7 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9	2.6											
1.0 – 1.4					3.3						3.6	
0.5 – 0.9					6.7	6.9	23.3	3.3	6.9		7.1	3.3
0 – 0.4	42.1				63.3	69.0	53.3	30.0	27.6	29.5	30.4	46.7
–0.5 – –0.1	44.7				16.7	20.7	20.0	46.7	51.7	61.4	44.6	43.3
–1.0 – –0.6	7.9				6.7	3.4	3.3	13.3	13.8	9.1	10.7	1.7
–1.5 – –1.1	2.6				3.3			3.3			1.8	1.7
–2.0 – –1.6								3.3				3.3
–2.5 – –2.1											1.8	
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	38	0	0	0	30	29	30	30	29	44	56	60

Tabel B.420: Dag til dag ændring i temperatur for station Svinbådan dybde 6.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9												
1.0 – 1.4												
0.5 – 0.9												
0 – 0.4												
–0.5 – –0.1					100.0							
–1.0 – –0.6												
–1.5 – –1.1												
–2.0 – –1.6												
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabel B.421: Dag til dag ændring i temperatur for station Svinbådan dybde 7.7 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9					3.3							
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9								3.3				
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9								3.3				
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9					3.3		3.3	10.0	3.4			3.3
1.0 – 1.4	5.3						6.7	3.3	3.4		5.4	6.7
0.5 – 0.9	13.2				13.3	3.4	20.0	13.3	3.4	4.5	8.9	1.7
0 – 0.4	26.3				46.7	62.1	20.0	10.0	31.0	27.3	44.6	38.3
–0.5 – –0.1	31.6				10.0	34.5	40.0	23.3	41.4	52.3	23.2	36.7
–1.0 – –0.6	21.1				6.7			16.7	3.4	11.4	8.9	
–1.5 – –1.1	2.6				13.3		10.0		6.9	4.5	8.9	6.7
–2.0 – –1.6								6.7	6.9			1.7
–2.5 – –2.1					3.3			3.3				1.7
–3.0 – –2.6								3.3				3.3
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6								3.3				
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	38	0	0	0	30	29	30	30	29	44	56	60

Tabel B.422: Dag til dag ændring i temperatur for station Svinbådan dybde 12.9 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6								3.3				
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4								3.3				
4.5 – 4.9						3.4			5.9			
4.0 – 4.4						3.4						1.7
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4					6.7	3.4	3.3					
2.5 – 2.9						3.4		10.0				1.7
2.0 – 2.4					3.3	3.4		3.3			1.8	
1.5 – 1.9	7.9				3.3		3.3	6.7				1.7
1.0 – 1.4					3.3	13.8	10.0		11.8			3.3
0.5 – 0.9	7.9				3.3	3.4	16.7	13.3	17.6	2.4	3.6	11.7
0 – 0.4	31.6				30.0	13.8	26.7	16.7	17.6	45.2	48.2	28.3
–0.5 – –0.1	34.2				26.7	27.6	10.0	3.3	17.6	45.2	37.5	31.7
–1.0 – –0.6	5.3				13.3	13.8	10.0	10.0	11.8	4.8	3.6	6.7
–1.5 – –1.1	7.9				3.3	3.4	10.0	13.3		2.4	3.6	1.7
–2.0 – –1.6	2.6						3.3	3.3	5.9			1.7
–2.5 – –2.1					3.3		3.3					8.3
–3.0 – –2.6	2.6						3.3				1.8	
–3.5 – –3.1									5.9			
–4.0 – –3.6					3.3	3.4		6.7				
–4.5 – –4.1								3.3				1.7
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6						3.4		3.3	5.9			
antal	38	0	0	0	30	29	30	30	17	42	56	60

Tabel B.423: Dag til dag ændring i temperatur for station Svinbådan dybde 21.0 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9								4.2				
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9									3.4			
2.0 – 2.4												3.3
1.5 – 1.9	8.0								6.9			
1.0 – 1.4	4.0							12.5	3.4			6.7
0.5 – 0.9	16.0							4.2	3.4	6.9		
0 – 0.4	24.0				57.1			16.7	27.6	34.5	42.9	43.3
–0.5 – –0.1	20.0				42.9			29.2	48.3	51.7	50.0	33.3
–1.0 – –0.6	12.0							16.7	3.4	3.4	7.1	3.3
–1.5 – –1.1	8.0							8.3	3.4			
–2.0 – –1.6	4.0							4.2		3.4		10.0
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6	4.0											
–3.5 – –3.1												
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1								4.2				
< –5.6												
antal	25	0	0	0	28	0	0	24	29	29	28	30

Tabel B.424: Dag til dag ændring i temperatur for station Valgrundet dybde 2.7 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4												
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4												
1.5 – 1.9	2.2											
1.0 – 1.4					3.6	3.4	3.3				1.8	3.3
0.5 – 0.9			11.1	13.8	17.9	17.2	30.0	10.0		2.0	3.6	1.7
0 – 0.4	53.3	40.7	59.3	58.6	39.3	41.4	50.0	40.0	45.5	42.9	29.1	43.3
–0.5 – –0.1	31.1	55.6	25.9	27.6	28.6	37.9	6.7	30.0	54.5	42.9	54.5	46.7
–1.0 – –0.6	11.1	3.7	3.7		10.7		10.0	13.3		8.2	9.1	3.3
–1.5 – –1.1	2.2									2.0		1.7
–2.0 – –1.6								3.3		2.0	1.8	
–2.5 – –2.1												
–3.0 – –2.6												
–3.5 – –3.1								3.3				
–4.0 – –3.6												
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	45	27	27	29	28	29	30	30	22	49	55	60

Tabel B.425: Dag til dag ændring i temperatur for station Valgrundet dybde 4.7 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.

T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4												
3.5 – 3.9												
3.0 – 3.4											1.8	
2.5 – 2.9												
2.0 – 2.4	2.2		3.7					3.3				1.7
1.5 – 1.9								3.3			1.8	1.7
1.0 – 1.4					10.7	6.9	3.3					
0.5 – 0.9	4.4		7.4	17.2	10.7	13.8	30.0	13.3			7.3	5.0
0 – 0.4	48.9	48.1	63.0	51.7	35.7	51.7	40.0	33.3	50.0	46.9	32.7	41.7
–0.5 – –0.1	31.1	37.0	18.5	31.0	32.1	20.7	16.7	30.0	50.0	38.8	43.6	40.0
–1.0 – –0.6	8.9	14.8	3.7		3.6	6.9	10.0	6.7		8.2	9.1	5.0
–1.5 – –1.1	2.2									4.1		
–2.0 – –1.6	2.2		3.7		3.6					2.0	1.8	3.3
–2.5 – –2.1								6.7				
–3.0 – –2.6												1.7
–3.5 – –3.1											1.8	
–4.0 – –3.6					3.6			3.3				
–4.5 – –4.1												
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6												
antal	45	27	27	29	28	29	30	30	22	49	55	60

Tabel B.426: Dag til dag ændring i temperatur for station Valgrundet dybde 6.8 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.


T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4								3.3				
4.5 – 4.9												
4.0 – 4.4								6.7				1.7
3.5 – 3.9											1.8	1.7
3.0 – 3.4												1.7
2.5 – 2.9			3.7					3.3				
2.0 – 2.4	2.2					6.9		6.7				1.7
1.5 – 1.9	2.2	7.4	11.1		3.6		3.3				3.6	1.7
1.0 – 1.4	2.2				7.1	3.4	3.3				3.6	
0.5 – 0.9	4.4	3.7		13.8	3.6	17.2	16.7	6.7	9.1		5.5	5.0
0 – 0.4	37.8	25.9	44.4	65.5	35.7	37.9	43.3	26.7	27.3	46.9	36.4	21.7
–0.5 – –0.1	35.6	55.6	25.9	20.7	35.7	24.1	16.7	23.3	54.5	38.8	27.3	41.7
–1.0 – –0.6	8.9	3.7	3.7		7.1	10.3	6.7	10.0	9.1	12.2	14.5	11.7
–1.5 – –1.1	4.4		3.7				6.7			2.0	1.8	5.0
–2.0 – –1.6	2.2		3.7		3.6			3.3			1.8	
–2.5 – –2.1		3.7	3.7					3.3			1.8	3.3
–3.0 – –2.6											1.8	
–3.5 – –3.1					3.6							1.7
–4.0 – –3.6												1.7
–4.5 – –4.1							3.3					
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6								6.7				
antal	45	27	27	29	28	29	30	30	22	49	55	60

Tabel B.427: Dag til dag ændring i temperatur for station Valgrundet dybde 8.8 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.


T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6								6.7				
5.5 – 5.9								3.3				
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9									4.5			
4.0 – 4.4												6.7
3.5 – 3.9						3.4						3.3
3.0 – 3.4								3.3				3.3
2.5 – 2.9					3.6		3.3	6.7			2.9	3.3
2.0 – 2.4	6.7		7.4						9.1			
1.5 – 1.9	3.3	7.4	3.7		3.6		6.7	3.3	4.5			
1.0 – 1.4	3.3				3.6	6.9	10.0	3.3	4.5		2.9	
0.5 – 0.9	10.0	7.4	3.7	3.4	21.4	17.2	13.3	3.3	9.1		17.1	3.3
0 – 0.4	33.3	22.2	40.7	79.3	25.0	41.4	26.7	26.7	13.6	44.9	34.3	20.0
–0.5 – –0.1	26.7	48.1	33.3	13.8	21.4	20.7	16.7	16.7	31.8	38.8	17.1	23.3
–1.0 – –0.6	3.3	11.1	3.7	3.4	3.6	10.3	13.3	3.3	4.5	12.2	14.3	3.3
–1.5 – –1.1	3.3		3.7		3.6					4.1	5.7	6.7
–2.0 – –1.6	3.3	3.7			7.1		6.7	6.7	9.1		5.7	13.3
–2.5 – –2.1	3.3		3.7		3.6			3.3	4.5			3.3
–3.0 – –2.6	3.3				3.6				4.5			
–3.5 – –3.1								3.3				6.7
–4.0 – –3.6												3.3
–4.5 – –4.1								3.3				
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6							3.3	3.3				
antal	30	27	27	29	28	29	30	30	22	49	35	30

Tabel B.428: Dag til dag ændring i temperatur for station Valgrundet dybde 10.9 m. Tallene giver den del af dag til dag ændringen i % der den pågældende måned ligger i intervallet i første søjle. Antallet af observationer taget i de forskellige måneder er givet på nederste linie.


T (°C)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
> 6												
5.5 – 5.9												
5.0 – 5.4												
4.5 – 4.9							3.3					
4.0 – 4.4		3.7				3.4	6.7					
3.5 – 3.9		3.7										5.0
3.0 – 3.4	2.3				3.7	3.4					1.8	
2.5 – 2.9	4.5		3.7					100.0			1.8	1.7
2.0 – 2.4	2.3				3.7		3.3				1.8	1.7
1.5 – 1.9	4.5				7.4	3.4	6.7			2.1	1.8	1.7
1.0 – 1.4	4.5		3.7		3.7	20.7	3.3				3.6	5.0
0.5 – 0.9		3.7	11.1	15.8	11.1	10.3	10.0			2.1	5.5	5.0
0 – 0.4	25.0	25.9	33.3	63.2	25.9	20.7	16.7			52.1	23.6	15.0
–0.5 – –0.1	22.7	48.1	33.3	15.8	22.2	13.8	10.0			33.3	34.5	33.3
–1.0 – –0.6	13.6	3.7	7.4	5.3		6.9	13.3			6.2	12.7	11.7
–1.5 – –1.1	4.5	7.4	3.7		11.1	10.3	10.0			4.2	10.9	6.7
–2.0 – –1.6	9.1		3.7		3.7	3.4					1.8	8.3
–2.5 – –2.1	4.5						3.3					
–3.0 – –2.6							3.3					
–3.5 – –3.1	2.3	3.7				3.4						3.3
–4.0 – –3.6					7.4							1.7
–4.5 – –4.1							6.7					
–5.0 – –4.6												
–5.5 – –5.1												
< –5.6							3.3					
antal	44	27	27	19	27	29	30	1	0	48	55	60




Figur B.138: Spektralanalyse af temperaturen for station Århus Bugt .




Figur B.139: Spektralanalyse af temperaturen for station Deutsche Bucht . Forsætter på næste side.




Figur B.140: Spektralanalyse af temperaturer for station Deutsche Bucht .




(a) Dybde 6.7 m



(b) Dybde 10.2 m




(c) Dybde 15.4 m




(d) Dybde 21.5 m


Figur B.141: Spektralanalyse af temperaturen for station Hjelm Bugt .



Figur B.142: Spektralanalyse af temperaturen for station Kiel .



Figur B.143: Spektralanalyse af temperaturen for station Ndr. Røse .



Figur B.144: Spektralanalyse af temperaturen for station Vesterrenden .